

Herbicida

Stonic®

Herbicida residual e sistêmico

Tipo de produto: Herbicida

Composição: Suspensão de cápsulas (CS) com 360 g/L ou 34,29% (p/p) de clomazona

Família química: isoxazolidinona

Número de AV: 1581

Classificação ADR: 3082, 9, III

Embalagem: 1 L



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Herbicida para controle de infestantes dioxitiledóneas e gramíneas anuais em pré-emergência para as culturas de batateira e colza e pós-emergência precoce para a cultura do arroz.
- **STONIC®** é um herbicida com atividade sistêmica e residual. possui uma absorção predominantemente radicular.
- Largo espectro de ação sobre infestantes (folha larga e estreita).
- Elevada segurança para operadores e ambiente.
- Formulação líquida de elevada qualidade.

ASCENZA®

CULTURA	ALVO	DOSE	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
ARROZ	Infestantes anuais dicotiledóneas e gramíneas	0,7 L/ha	Aplicar em pós-emergência precoce da cultura, até ao máximo de 2 folhas da planta (BBCH 11-12).
BATATEIRA		0,3 L/ha	Aplicar em pré-emergência da cultura, até ao máximo de 7 dias antes da emergência.
COLZA		0,33 L/ha	Aplicar em pré-emergência da cultura, até ao máximo de 5 dias depois da sementeira.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Amor-de-Hortelão (*Gallium aparine*), Bolsa-de-pastor (*Capsella bursa-pastoris*).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS

Catassol (*Chenopodium album*), corriola (*Convolvulus arvensis*), milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), verónica-da-pérsia (*Veronica persica*).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Volume de calda: 200 a 400 L/ha.
- Recomenda-se proceder à rotação de culturas, sempre que possível.
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.