

Herbicida

Deflexo[®] Mix

Herbicida pré-emergente de amplo espectro

Tipo de produto: Herbicida

Composição: Suspo-emulsão (SE) com 312,5 g/L de S-metolaclo e 187,5 g/L de terbutilazina

Família química: cloroacetanilida e triazina

Número de AV: 1400

Classificação ADR: 3082, 9, III

Embalagem: 1 L, 5 L e 20L



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- DEFLEXO[®] MIX é um herbicida residual e sistêmico.
- Está indicado para o controle de infestantes gramíneas e de folha larga em milho.
- Apresenta absorção radicular e foliar inibindo a divisão celular e a fotossíntese.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

PRÉ-EMERGÊNCIA: moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*), catassol (*Chenopodium album*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), beldroega (*Portulaca oleracea*), erva-moira (*Solanum nigrum*), serralha-macia (*Sonchus oleraceus*), bardana-menor (*Xanthium strumarium*), Sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), milhã (*Setaria* sp.).

PÓS-EMERGÊNCIA: moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*), catassol (*Chenopodium album*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), milhã (*Digitaria* sp.), beldroega (*Portulaca oleracea*), erva-moira (*Solanum nigrum*), serralha-macia (*Sonchus oleraceus*), bardana-menor (*Xanthium strumarium*), Sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), milhã (*Setaria* sp.).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS

PRÉ-EMERGÊNCIA: malvão (*Abutilon theophrasti*), milhã (*Digitaria* sp.).

PÓS-EMERGÊNCIA: malvão (*Abutilon theophrasti*).

ASCENZA[®]

CULTURA	ALVO	DOSE	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	INTERVALO DE SEGURANÇA
MILHO	Infestantes gramíneas e dicotiledóneas	3,5 L/ha	<p>Pré-emergência da cultura - aplicar o produto sobre o terreno preparado para a sementeira. Aplicar o produto no intervalo de tempo que decorre entre a sementeira e a emergência da cultura, mas antes da emergência das infestantes. Regar para incorporar o produto no solo, a não ser que chova nos primeiros dias após o tratamento. Após aplicação do herbicida não se deve mexer a terra.</p>	não aplicável
		3,5 L/ha	<p>Pós-emergência precoce da cultura (no máximo até às 4 folhas) (máx. BBCH14). Aplicar o produto após a emergência da cultura (1-4 folhas), mas antes da emergência das infestantes. Regar para incorporar o produto no solo, a não ser que chova nos primeiros dias após o tratamento. Após aplicação do herbicida não se deve mexer a terra.</p>	não aplicável

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para diminuir o risco de arrastamento, evitar pressões superiores a 2 Kg/cm² e/ou usar bicos anti-arrastamento
- Volume de calda a utilizar: 200-400 L/ha
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura