

Fungicida

Maestro® F WG Advance

Fungicida sistêmico para vinha

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Grânulos dispersíveis em água (WG) com 25% (p/p) de folpete e 50% (p/p) de fosetil-alumínio

Família química: Ftalimidas (folpete) e Organometálico com alumínio

Número de AV: 0302

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 300 g e 12 kg



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **MAESTRO® F WG ADVANCE** é um fungicida sistêmico com mobilidade ascendente e descendente
- Tem ação essencialmente preventiva e uma ligeira ação curativa sobre o fungo do míldio da videira
- É um fungicida composto por 2 substâncias ativas:
- **Folpete** - Fungicida de contacto que atua sobre diversos mecanismos celulares dos fungos (ação "multi-site"). Além das excelentes características preventivas sobre as folhas, apresenta ainda um efeito estimulante sobre a vegetação, associado ao aumento da atividade fotossintética. O folpete tem também uma ação secundária sobre a podridão cinzenta e o oídio
- **Fosetil-alumínio** - Fungicida ativador das defesas da planta, dotado de sistemias completa, ascendente e descendente, protegendo eficazmente os tecidos formados entre dois tratamentos. É um fungicida essencialmente preventivo, mas apresenta uma ação curativa até 2 dias após o início da infeção

ASCENZA®

CULTURA	DOENÇA	CONC. (g/hL)	DOSE (kg/ha)	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	IS (dias)
VINHA (uvas para vinificação)	Míldio (<i>Plasmopara viticola</i>)	300	3	Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na ausência destes iniciar os tratamentos logo após o aparecimento dos primeiros focos na região ou ao estado de 7-8 folhas. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados enquanto as condições meteorológicas se mantiverem favoráveis ao desenvolvimento da doença. A persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias. Não realizar mais de 3 tratamentos com este produto, por ciclo cultural.	42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Recomenda-se a aplicação de MAESTRO® F WG ADVANCE preventivamente, no início do ciclo vegetativo da videira, por forma a promover um controlo eficaz do míldio e assegurar um bom estado fitossanitário durante o decorrer do ciclo vegetativo
- A concentração indicada refere-se a aplicações de alto volume; a dose de emprego em pleno desenvolvimento vegetativo é de 3 kg/ha
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura

Edição: FIME F WG ADV - 04/20 (MS) A.F. - Leia sempre o rótulo da embalagem, siga as instruções de uso e esteja atento às frases e símbolos constantes do mesmo.



Videira/míldio

