

Anbefalinger for hester som har vært på reise i utlandet i forbindelse med EHV-1 utbruddet

NRYF baserer sine anbefalinger på [Mattilsynets råd](#).

I tillegg følger det at FEI fortløpende og direkte informert alle FEI-utøvere som har deltatt ved internasjonale stevner i berørte land, både med direkte råd, anbefalinger og smittevernprotokoller som utøverne skal følge. NRYF har fulgt opp denne informasjonsformidlingen og bistått med råd og veiledning til den enkelte i tillegg.

Anbefalinger

- Hester som har vært ved utenlandske stevner eller ved transittstaller i land hvor det er smittemistanke i løpet februar-mars 2021, bør være isolert fra andre hester i minst tre uker. Isolasjonstiden løper fra hesten forlater stevneplassen og er rene, desinfiserte omgivelser, isolert fra andre hester.

[FEI gir oppdatert informasjon](#) om situasjonen, herunder om land med smittemistanke

- Dersom hesten ikke har vært i land hvor det er smittemistanke, er Mattilsynets anbefaling isolasjon i minst to uker.
- Isolasjon innebærer at hesten oppstalles i egen stall eller innhegning med minst 50 meter avstand til andre hester.
- Desinfiser hendene etter vask og bytt klær og skotøy etter stell av isolerte hester. Bruk eget utstyr til alle former for stell av den isolerte hesten (fôring, møkking etc).
- Temperaturen bør tas rektalt to ganger daglig i løpet av isolasjonsperioden. Noter ned og før oversikt over temperaturen. Hester som utvikler feber, bør undersøkes av veterinær. Normal temperatur for voksne hester i hvile er 37,2-38,2 grader.
- At hesten er i isolasjon betyr det også at den ikke bør delta i noen nasjonale stevner, treninger eller i noen form for avlsaktivitet i den perioden.
- Ta kontakt med veterinær dersom hesten har feber eller viser andre symptomer på smitte. Symptomer er feber, nedsatt appetitt, luftveissymptomer, ustøhet og trøtthet. Vær også oppmerksom på svakhet i halen eller bakparten og problemer med urinering.
- Hester som har vært syke med herpesvirus bør holdes isolert i karantene i fire uker etter at de har blitt symptomfrie.

Om vaksinerings

Det finnes vaksiner mot EHV-1 og EHV-4 som kan gi en viss beskyttelse mot abort og luftveissykdom, men den beskytter ikke mot den nevrologiske formen. Vaksinerings bør ikke gjennomføres under et pågående utbrudd.

Om EHV-1:

EHV-1 er en C-sykdom. Veterinærer som påviser sykdommen, skal gi Mattilsynet skriftlig melding, så snart som mulig og senest 7 dager etter påvisningen.