



L'équation gagnante

- Large spectre d'action sur dicotylédones et graminées
- Très bonne sélectivité
- Formulation OD



Picton® OD

FICHE TECHNIQUE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre technicien habituel ou à consulter le site www.ascenza.fr



ASCENZA®
— FARMING YOUR FUTURE —



Picton® OD

Composition : 150 g/l de sulcotrione + 20 g/l de nicosulfuron – HRAC : F2 et B
Suspension concentrée huileuse (OD)

PICTON® OD est un herbicide, contenant du nicosulfuron (sulfonylurée) et de la sulcotrione (tricétone), destiné au désherbage des dicotylédones annuelles et des graminées annuelles et vivaces. Il agit par voie systémique, foliaire et racinaire. Les adventices sont rapidement bloquées et ne concurrencent plus le maïs.

LES BÉNÉFICES

- ✓ **Spectre très large** sur de nombreuses dicotylédones dont l'ambrosie et sur graminées et régularité d'action
- ✓ Pénétration rapide dans les adventices
- ✓ **Excellente sélectivité sur maïs** quelle que soit la variété
- ✓ **Formulation haute qualité** – process ASCENZA certifié

USAGES AUTORISÉS

CULTURE	DOSE MAXIMUM D'EMPLOI	NOMBRE MAXIMUM D'APPLICATIONS	STADE LIMITE D'APPLICATION	ZNT AQUATIQUE / DVP	ZNT PLANTES NON CIBLES
Maïs	2 L/ha	1/an	BBCH 12-19	20 m	5 m
	1 L/ha	2/an			

Délai de rentrée : 48 h

PICTON® OD s'utilise selon deux stratégies possibles : soit 1 application en post-levée à partir du stade 2 feuilles du maïs en utilisant la dose de 2 l/ha maximum, soit 2 applications fractionnées en post-levée du maïs à 1 l/ha maximum à partir de 2-3 feuilles du maïs puis à 4-5 feuilles du maïs, avec un délai entre les applications d'environ 14 jours. En cas de forte pression graminées, un partenaire racinaire sera recommandé.

Essai (64)

2 applications à 1 l/ha pour un résultat optimal



Témoin : panics, digitaire sanguine, chénopode, morelle.

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

- ✓ Intervenir sur des adventices jeunes (max 4 F des dicots, 3 F des graminées)
- ✓ Traiter avec des conditions poussantes sur une **culture non stressée** en bon état végétatif (température entre 15 et 25 °C, hygrométrie > 70%, amplitudes thermiques < 15 °C)
- ✓ En cas de levées échelonnées et de flore complexe d'adventices, préférer une application fractionnée.
- ✓ Respecter un délai sans pluie de 2 heures
- ✓ Éviter toute dérive de la préparation PICTON® OD sur les cultures adjacentes autres que du maïs.

PICTON® OD : AMM 2150247 - Sulcotrione 150 g/l + nicosulfuron 20 g/l - Suspension concentrée huileuse (OD). © Marque déposée et détenteur d'homologation : ASCENZA. Distribué par ASCENZA - 2-12 rue du chemin des Femmes - Immeuble Odyssee - 91300 MASSY - T. 01 69 53 98 89 - www.ascenza.fr. Distributeur de produits phytosanitaires à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, restrictions d'emploi et contre-indications se référer à l'étiquette du produit ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Mai 2020.

SPECTRE

Post-levée des maïs

PICTON® OD 2L/ha

DICOTYLÉDONES	
Abutilon	
Amarantes	
Ambrosie	
Capselle bourse à pasteur	
Chénopode blanc	
Datura stramoine	
Fumeterre officinal	
Laiteron maraîcher	
Lamier	
Matricaire	
Mercuriale annuelle	
Morelle noire	
Mouron des champs	
Mouron des oiseaux	
Moutarde des champs	
Pensée des champs	
Ravenelle	
Renouée des oiseaux	
Renouée liseron	
Renouée persicaire	
Séneçon	
Véronique de Perse	

GRAMINÉES	
Digitaire sanguine*	
Panic faux millet	
Panic pied-de-coq*	
Pâturin annuel	
Ray-grass	
Sétaire* sp.	

* (2 - 3 feuilles max)

	Très sensible : > 95 % d'efficacité
	Sensible à très sensible : > 85 % d'efficacité
	Moyennement sensible : 70 à 84 % d'efficacité


ASCENZA®

H361d Susceptible nuire au fœtus. H373 Risque présumé d'effets graves pour les reins à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 Contient de la sulcotrione. Peut produire une réaction allergique.

ATTENTION



PRODUITS À USAGE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.