

Cap sur les dicots

- Efficacité reconnue : gaillet, coquelicot...
- Utilisable sur toutes céréales
- Souplesse de mélange



Rackam®

FICHE TECHNIQUE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher
de votre technicien habituel ou à consulter le site
www.ascenza.fr



ASCENZA®
— FARMING YOUR FUTURE —



Rackam®

Composition : florasulame 50 g/L – HRAC : B – Formulation : suspension concentrée (SC)

Le florasulame est un herbicide foliaire et racinaire appartenant à la famille chimique des sulfonylurées (groupe HRAC B). Il agit en inhibant l'enzyme ALS. RACKAM® est rapidement absorbé par les feuilles, lui permettant d'être à l'abri du lessivage en moins d'une heure.

NOMBREUX USAGES AUTORISÉS

| CULTURES | DOSES | NOMBRE MAX D'APPLI-CATIONS | ZNT AQUA / PLANTES NON CIBLES | DÉLAI AVANT RÉCOLTE |
|---|---|----------------------------|-------------------------------|---|
| Céréales d'hiver | 0,08 L/ha à l'automne 0,15 L/ha au printemps | 1/culture/an | 5 m | Automne : type F Sortie d'hiver : F (BBCH32) sauf orge et blé tendre d'hiver : F (BBCH39) |
| Céréales de printemps | 0,15 L/ha au printemps | | | |
| Ray-grass, fétuque, brome, fléole installée ou à l'implantation | 0,08 L/ha à l'automne 0,15 L/ha au printemps | 1/cycle de production | | Automne : type F Printemps / Sortie d'hiver : 15 jours |

Délai de rentrée : 6 h

POSITIONNEMENT SOUPLE

| | AUTOMNE 0,08 L/HA | PRINTEMPS 0,15 L/HA |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| CULTURES D'HIVER | | |
| Blé tendre et orge d'hiver | Dès le stade 3 feuilles 0,08 l/ha | Jusqu'au stade gonflement (BBCH 39) |
| Blé dur, seigle, avoine et triticale | Dès le stade 3 feuilles 0,08 l/ha | Jusqu'au stade 2 nœuds (BBCH 32) |
| CULTURES DE PRINTEMPS | | |
| Blé tendre, blé dur, seigle et avoine de printemps | | Jusqu'au stade 2 nœuds (BBCH 32) |
| Orge de printemps | | Jusqu'au stade gonflement (BBCH 39) |

Pour compléter son spectre, RACKAM® peut s'utiliser en complément d'un anti-graminées ou d'un autre anti-dicotylédones.

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

- ✓ Peu sensible aux températures, RACKAM® peut être appliqué dès 5°C.
- ✓ Pour une bonne pénétration du produit, respecter un délai sans pluie d'une heure.
- ✓ Ne pas appliquer RACKAM® pour désherber une céréale sous-ensemencée d'une légumineuse.
- ✓ RACKAM® n'est pas sélectif des trèfles dans les graminées fourragères.
- ✓ Appliquer sur une culture en bon état végétatif, non stressée par le froid ou un excès d'eau.

RACKAM® : AMM n°2150870 – Suspension concentrée – SC – 50 g/l de florasulame - © Marque déposée : ASCENZA - détenteur d'homologation : GLOBACHEM. Distribué par ASCENZA - 2-12 rue du chemin des Femmes – Immeuble Odyssee – 91300 MASSY - T. 01 69 53 98 89 - www.ascenza.fr. Distributeur de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, restrictions d'emploi et contre-indications se référer à l'étiquette du produit ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Mai 2020

LARGE SPECTRE

Le florasulame est actif contre de nombreuses dicotylédones. Il doit être appliqué sur des adventices jeunes de préférence.

| | Automne | Printemps |
|-------------------------------|---------|-----------|
| Alchémille | | |
| Ammi élevé | | |
| Anthémis des champs | | |
| Bleuet des champs (plantules) | | |
| Capselle bourse à pasteur | | |
| Céraiste agglomérée | | |
| Coquelicot* (< 5 cm) | | |
| Féveroles (repousses) | | |
| Gaillet gratteron | | |
| Laitue scariote | | |
| Lamier pourpre | | |
| Lampsrane | | |
| Matricaire camomille* | | |
| Pensée | | |
| Ravenelle | | |
| Renouée des oiseaux | | |
| Renouée faux-liseron | | |
| Repousses de Colza | | |
| Rumex | | |
| Sanve | | |
| Séneçon commun* | | |
| Stellaire* | | |
| Véronique | | |

* En présence d'adventices peu sensibles dans la parcelle, RACKAM® doit être intégré dans un programme de lutte permettant de maîtriser l'ensemble des adventices.

- Très sensible : > 95 % d'efficacité
- Sensible à très sensible : > 85 % d'efficacité
- Moyennement sensible : 70 à 84 % d'efficacité
- Peu sensible : < 70 % d'efficacité



ASCENZA®

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

ATTENTION



PRODUITS À USAGE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.