

	
Composición	Dimetomorf 9% + Propamocarb 50%
Formulación	Suspensión Concentrada SC
Control	Control de mildiu en patata y en lechuga y similares (incluyendo <i>brassicas</i> )
Dosis	2 L/Ha
Nº máximo de aplicaciones	3 en patata 1 en lechuga y similares
Intervalo entre aplicaciones	10 - 12 días
Volumen de caldo	500 - 1000 L/Ha
Plazo de seguridad	21 días en patata 7 días en lechuga y similares

Edición: Octubre 2018



**DIFFERENTIATION**  
 LEADING TRENDS  
 COMPETITIVE ADVANTAGE  
 ADAPTED SOLUTIONS  
 INDEPENDENCE  
 ECONOMIC DRIVING FORCE  
 INNOVATION  
 ADD VALUE  
 INTERNATIONAL PRESENCE



**IT MEANS**  
 Competitiveness, quality and  
 innovation by Sapec Agro Business



[www.ascenza.es](http://www.ascenza.es)

ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA, S.A.U. Parque Empresarial TÁCTICA C/ Botiguers, nº 3 - 4ª Planta. 46980 - Paterna (Valencia) Telf. 96 134 51 50 / Fax. 96 134 35 10

ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA. USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.  
 La información del folleto no exime de seguir las indicaciones de la etiqueta del producto.

INNOVACIÓN PARA EL CONTROL DE MILDIU

PATATA



LECHUGA Y  
 SIMILARES





## INNOVACIÓN PARA EL CONTROL DE MILDIU

### SPYRIT Pro

- Fungicida de amplio espectro innovador desarrollado para conseguir un completo control de **mildiu** en el cultivo de **patata y lechuga y similares**.
- Su **formulación exclusiva** se compone de dos materias activas con acción complementaria en el control de la enfermedad: Dimetomorf y Propamocarb.



### MÚLTIPLE ACCIÓN DURANTE TODO EL CICLO DEL HONGO

- Actúa en todas las fases del ciclo de vida del Mildiu mediante acción:

#### 1. Preventiva


Evita la germinación de esporas y la formación del micelio

#### 2. Curativa

Evita el desarrollo del micelio

#### 3. Antiesporulante


Impide la formación de nuevas esporas



### MOMENTOS DE APLICACIÓN


- **SPYRIT Pro** se aplica desde que aparecen las condiciones que propician un riesgo en la infección. La mayor efectividad de **SPYRIT Pro** se consigue aplicado en las fases iniciales de infección y hasta el final del desarrollo vegetativo del cultivo.

#### Calendario de Patata



**Spyrit Pro** Aplicar en patata desde la aparición de 9 o más hojas del tallo principal (BBCH 19) hasta la aparición de las bayas de la fructificación de 1<sup>er</sup> grado (BBCH 81).

#### Calendario de Lechuga y similares



**Spyrit Pro** Aplicar en lechuga desde la segunda hoja (BBCH 12) hasta que alcanza el 70% del tamaño y la masa foliar esperada (BBCH 47).

### VENTAJAS

1. **Formulación exclusiva**
2. **Actúa en todo el ciclo del hongo**
3. **Combina una rápida penetración con una duradera eficacia**
4. **Efecto secundario contra *Phytium spp.* en lechuga**
5. **Potente acción protectora sistémica y translaminar**
6. **Modos de acción complementarios que aumentan la eficacia**
7. **Excelente herramienta para el manejo de resistencias (Grupo H5+F4)**
8. **Resistencia al lavado tras dos horas después de la aplicación**

