

**TÚ
DECIDES
ASCENZA**
Porque eres
imparable.



**CATÁLOGO DE
PRODUCTOS**


ASCENZA®
— FARMING YOUR FUTURE —



ASCENZA. CULTIVANDO TU FUTURO

En 2019 nace ASCENZA, integrada dentro del gran grupo corporativo Rovensa. ASCENZA viene ya operando en el mercado español desde hace más de 20 años como Sapec Agro.

ASCENZA es una compañía que tiene como actividad principal el Desarrollo y la Innovación (D+i) de soluciones fitosanitarias, nutricionales y bioestimulantes para la protección y nutrición de cultivos. Somos líderes en la Península Ibérica en el segmento de soluciones agrícolas off patent.

La central operativa en España está ubicada en Paterna (Valencia). Disponemos de un moderno almacén regulador en el Parque Industrial de Chinchilla (Albacete) dotado de las últimas medidas en lo que a logística y seguridad se refiere. Nuestros productos fitosanitarios se fabrican en Setúbal (Portugal) y los fitonutrientes y bioestimulantes en Sanchidrián (Ávila) y Campollano (Albacete).

En ASCENZA entendemos la complejidad de la agricultura y queremos seguir creciendo para ofrecerte soluciones completas con las que conseguir una agricultura sostenible y de calidad. Apostamos por la agricultura y los agricultores.



ROVENSA. AGRICULTURA EQUILIBRADA

ROVENSA es el nuevo nombre que adquiere el grupo Sapec Agro Business. Nace de la necesidad de responder a las tendencias actuales del mercado: crecimiento de la población, estilos de vida más saludables, consumidores más informados, distribuidores que necesitan defender la transparencia y agricultores que precisan garantizar una producción segura y de alta calidad.

ROVENSA es un grupo internacional de empresas con soluciones complementarias, un mercado independiente y una meta: cambiar la agricultura. Vendemos productos a más de 70 países y tenemos oficinas en más de 25 países.

ROVENSA integra varias empresas y diferentes unidades de negocio con una cartera complementaria de productos y un objetivo común: cambiar hacia un modelo de Agricultura Equilibrada.

Ascenza, Tradecorp, Idai Nature, OGT, SDP, Microquímica y Agrichem, S.A. and Even Agro S.L son las empresas que a día de hoy conforman **ROVENSA**.

Las empresas que forman **ROVENSA** comparten sinergias y ofrecen un catálogo de productos complementarios con un objetivo común: la Agricultura Equilibrada. Este nuevo concepto combina el uso de distintas herramientas y estrategias para la protección de cultivos, nutrición especial y bioestimulación, y biocontrol para conseguir una agricultura equilibrada y que cumpla con los estándares más estrictos demandados por el consumidor.

ROVENSA busca transmitir a los agricultores que el futuro no es eco ni convencional, es lo mejor de cada uno de manera equilibrada, y sólo esta compañía es capaz de ofrecérselo de manera global.



Índice

SOLUCIONES ASCENZA POR CULTIVOS

8	Olivar
14	Viña
22	Maíz
28	Cereales de invierno
34	Cítricos
40	Frutales
46	Almendo
52	Hortícolas
58	Arroz

PRODUCTOS DESTACADOS POR FAMILIA

62 III FUNGICIDAS

64	Actlet C®
65	Actlet F®
66	Centinela 10 EC®
67	Covinex 35 WG®
70	Covinex Forte MZ®
71	Cimoxate 45 WG®
72	Flecha®
73	Flecha Suprem®
74	Pombal 80 WG®
75	Premier 50 WG®
76	Placaje 25 SC®
78	Trineo 25 EW®
80	Trunfo Max®
81	Spyrit 50 SG®
82	Spyrit Plus WG®
83	Spyrit Pro®
84	Melvar EC®

86 III HERBICIDAS

88	Button®
89	Circus 25 WG®
90	Deflexo MIX®
91	Deflexo Ultra®
92	Decano®
93	Estaca®
94	Mohican 50 SC®
95	Polarpec® 80
96	Register 25 WG®
98	Orbiter®
99	Voltage Flow®
100	Stonic®

102 III INSECTICIDAS

104	Aikido®
106	Delta EC®
108	Doctrin®
111	Expedient 10 EC®

112	Excentro® 0,5
113	Noscale®
114	Sondae®
115	Rikolto®
116	Superblock®

118 III NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

120	Algaegreen cítricos®
121	Suporter Plus AF®
122	Myssilk®
124	Fortan ECO®
125	ENR T-300®
126	ONASCENZA®
127	Nutrex Cuaje®
128	N-Release®
129	Resilient®

130 LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS

132	Fungicidas
136	Herbicidas
139	Insecticidas
140	Fitoreguladores, mojantes y otros
141	Nutricionales y Bioestimulantes

144 Consejos prácticos para una correcta aplicación de los productos fitosanitarios



ASCENZA en olivo

||||| Productos destacados

||||| Covinex Forte MZ®

||||| Flecha Suprem®

||||| Register 25 WG®

||||| Aikido®

||||| Delta EC®

||||| Nutrex Cuaje®

||||| Missylk®

||||| ON ASCENZA®



Lista de Productos para Olivo



FUNGICIDAS

Nombre de Producto / Composición		Número de registro
Covicampo 50® Oxicloruro de Cu 50% (WP) <i>Repilo y Antracnosis</i>		12965
Covicampo Bordeles® Sulfato cuprocálcico (expre. En Cu) 20% (WP) <i>Repilo</i>		20048
Covinex 35 WG® Oxicloruro de Cobre 35%. Certificado ecológico CAAE <i>Repilo y Negrilla</i>		NOVEDAD ES-00666
Covinex 700 Flow® Oxicloruro de Cu 70% (SC) <i>Repilo y Antracnosis</i>		24457
Covinex Forte MZ® Oxicloruro de Cu (expr. en Cu) 10%, Sulf. Cuprocálcico (expr. en Cu) 10%, Mancozeb 15% (WP) <i>Repilo</i>		19525
Flecha® Kresoxim-metil 50% (WG) <i>Repilo</i>		NOVEDAD ES-00853
Flecha Suprem® Kresoxim-metil 25% p/p (250 g/Kg); Difenconazol 12,5% p/p (87,5 g/Kg) (WG) <i>Repilo</i>		NOVEDAD ES-00260
Hidrocuper-50® Hidróxido cúprico 50% (WP) <i>Repilo</i>		23015
Hidrocuper Bio WG® Hidróxido cúprico 20% (WG) <i>Repilo y Antracnosis</i>		NOVEDAD ES-00716
Smash® Dodina 40% (SC) <i>Repilo y Antracnosis</i>		NOVEDAD 23392

Trineo 25 EW®

Tebuconazol 25% (EW) 24409

Repilo



HERBICIDAS

Nombre de Producto / Composición		Número de registro
Hercampo Green® Glifosato 36% (SL) <i>Gramíneas y dicotiledóneas en post-emergencia</i>		17118
Hercampo Ultra® Glifosato 45% (SL) <i>Malas hierbas Dicotiledóneas, vivaces y monocotiledóneas</i>		NOVEDAD ES-00309
Hereu Super® Oxifluorfen 24% (EC) <i>Controla Hoja ancha y gramíneas en pre y post-emergencia precoz</i>		23059
Herpan 50® MCPA 50% (SL) <i>Hoja ancha en post-emergencia</i>		22720
Mohican 50 SC® Di flufenican 50% (SC) <i>Dicotiledóneas anuales en pre-emergencia</i>		24085
Mohican Energy® Di flufenican 4% + Glifosato 16% (SC) <i>Malas hierbas anuales y perennes, en pre-emergencia o post-emergencia precoz</i>		25004
Register 25 WG® Flazasulfuron 25% (WG) <i>Gramíneas y hoja ancha. Controla lolium y conyza</i>		ES-00401

Lista de Productos para Olivo



INSECTICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Aikido® Lambda-cihalotrin 10% (CS) <i>Prays</i>	25640
Delta EC® Deltametrin 2,5% (EC) <i>Mosca, prays y barrenillo</i>	25706
Doctrin® Bacillus thuringiensis var. kurstaki (cepa PB-54) 32% (WP). Certificado de Insumos CERES en Agricultura Ecológica. <i>Prays Oleae</i>	NOVEDAD 22423



NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

Nombre de Producto / Composición
Algaegreen Olivo Plus® Ácido algínico: 1.5% p/p; Manitol: 1.09% p/p; Extracto de algas procedente de Ascophyllum nodosum: 100% p/p
Aton CA® Aminoácidos libres: 5,0% p/p, Nitrógeno (N) total: 5,24% p/p, Nitrógeno (N) orgánico: 1,17% p/p, Nitrógeno (N) nítrico: 3,62% p/p, Óxido de calcio (CaO) soluble en agua: 6,30% p/p, Glicina: 3,46% p/p
Delfan Pro 24® Aminoácidos libres: 24,0% p/p, Nitrógeno (N) total: 9,0% p/p, Nitrógeno orgánico: 5,3% p/p, Nitrógeno ureico: 3,7% p/p.
Delfan Pro Eco® Aminoácidos libres: 23,0% p/p, Nitrógeno (N) total: 4,6% p/p, Nitrógeno orgánico: 4,6% p/p.
ENR T-300® MCDHS 100 % (p/p)

Folur®

Nitrógeno (N) total: 20% p/p, Nitrógeno Ureico: 20% p/p y Pobre en Biuret

Fortan®

Aminoácidos libres 2,0% p/p, Nitrógeno total (N) 0,36% p/p, Nitrógeno orgánico 0,36% p/p, Óxido de potasio (K₂O) p/p, Óxido de magnesio (MgO) p/p, Hierro (Fe) quelado por EDTA 1,0% p/p, Manganeseo (Mn) soluble en agua 0,4% p/p, Zinc (Zn) soluble en agua 1,6% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA 1,6% p/p

Fortan ECO®

Óxido de potasio (K₂O) p/p, Óxido de magnesio (MgO) p/p, Hierro (Fe) quelado por EDTA 1,0% p/p, Manganeseo (Mn) quelado por EDTA 0,4% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA 1,5% p/p

Missylk®

Aminoácidos libres: 22,2% p/p, Nitrógeno (N) total: 3.0% p/p,
Pentóxido de fósforo (P₂O₅): 16.4% p/p, Óxido de potasio (K₂O): 18.0% p/p, Manganeseo (Mn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Molibdeno (Mo): 0.25% p/p,
Zinc (Zn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 0,10% p/p, Extracto húmico total: 29.1% p/p, Ácidos húmicos: 14.0% p/p, Ácidos fúlvicos: 15.1% p/p

Nutrex Cuaje®

Aminoácidos libres 5% p/p, Nitrógeno (N) total 0,65% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 0,65% p/p, Pentóxido de fósforo (P₂O₅) 9,5% p/p, Óxido de potasio (K₂O) 12,6% p/p, Boro (B) 8% p/p, Molibdeno (Mo) 10% p/p

Nutrex Olivo®

Nitrógeno (N) total 20% p/p, Nitrógeno (N) ureico 14,5% p/p, Nitrógeno (N) amoniacal 5,5% p/p, Pentóxido de fósforo (P₂O₅) 5% p/p, Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 10% p/p, Óxido de Magnesio (MgO) 2% p/p, Boro (B) 2% p/p

ON ASCENZA®

Aminoácidos libres 2% p/p, Nitrógeno (N) total 1,35% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p, Ácido algínico 1.5% p/p, Manitol 0.9% p/p, Prolina 2% p/p; Glicina Betaina: 10%,

NOVEDAD

Suporter Plus AF®

Nitrógeno (N) total: 3% p/p, Nitrógeno (N) ureico: 3% p/p,
Pentóxido de fósforo (P₂O₅) 17% p/p

Resilient®

Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 6% p/p Extracto de algas: Ascophyllum nodosum Manitol 0,10% p/p

ASCENZA en viña

||||| Productos destacados

||||| **Actlet F®**

||||| **Actlet EVO®**

||||| **Centinela 10 EC®**

||||| **Flecha®**

||||| **Spyrit Plus WG®**

||||| **Register 25 WG®**

||||| **Missylk®**

||||| **ON ASCENZA®**

Lista de Productos para Viña



FUNGICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Actlet F® M-Metalaxyl 5% + Folpet 40% (WG) <i>Mildiu</i>	ES-01124
Actlet EVO® M-Metalaxyl+ Cimoxanilo + Folpet	PRÓXIMAMENTE
Azupec Micro WG® Azufre 80% (WG) <i>Oídio</i>	24416
Centinela 10 EC® Penconazol 10% (EC) <i>Oídio</i>	24064
Cimoxate 45 WG® Cimoxanilo 45% (WG) <i>Mildiu</i>	NOVEDAD ES-00321
Cimoxate FP® Cimoxanilo 4%, Folpet 40% (WP) <i>Mildiu</i>	23248
Covinex 35 WG® Oxicloruro de Cobre 35%. Certificado ecológico CAAE <i>Mildiu, Excoriosis y Black-rot</i>	NOVEDAD ES-00666
Covinex Forte MZ® Oxicloruro de Cu (expr. en Cu) 10%, Sulf. Cuprocálcico (expr. en Cu) 10%, Mancozeb 15% (WP) <i>Mildiu</i>	19525
Flecha® Kresoxim-metil 50% (WG) <i>Oídio, Black rot</i>	ES-00853
Folpec 50® Folpet 50% (WP) <i>Mildiu, excoriosis</i>	21821

Grano de Oro 98,5®

Azufre 98,5% (DP) 13325
Oídio, eriofidos, araña roja

Manzivex 80 WP®

Mancozeb 80% (WP) 13789
Black rot y mildiu

Placaje FP®

Azoxistrobin 9,35% + Folpet 50% (SC) ES-00163
Excoriosis, oídio, mildiu

Pombal 80 WG®

Fosetil-Al 80% (WG) 25505
Mildiu

Pombal MZ WG®

Fosetil-Al 35%, Mancozeb 35% (WG) 22997
Mildiu, excoriosis

Spyrit 50 SC®

Dimetomorf 44% (SC) ES-00365
Mildiu

Spyrit Hidro SC®

Dimetomorf 6% + Hidróxido cúprico 20% (SC) ES-00370
Mildiu

Spyrit M WG®

Dimetomorf 7,5%, Mancozeb 66,7% (WG) ES-00295
Mildiu

Spyrit Plus WG®

Dimetomorf 6%, Folpet 25%, Fosetil-Al 50% (WG) ES-00240
Mildiu

Tasis 12,5 EC®

Miclobutanil 12,5% (EC) 24266
Oídio, Black rot

Trineo 25 WG®


Tebuconazol 25% (WG) 25092
Oídio

Lista de Productos para Viña



HERBICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Acasto® Pendimetalina 33% (EC) <i>Dicotiledóneas y gramíneas</i>	NOVEDAD	ES-00490
Hercampo Green® Glifosato 36% (SL) <i>Controla Gramíneas y dicotiledóneas en post-emergencia.</i>		17118
Hercampo Ultra® Glifosato 45% <i>Dicotiledóneas, malas hierbas vivaces y monocotiledóneas</i>	NOVEDAD	ES-00309
Hereu Super® Oxifluorfen 24% (EC) <i>Controla Hoja ancha y gramíneas en pre y post-emergencia precoz</i>		23059
Mohican 50 SC® Di flufenican 50% (SC) <i>Dicotiledóneas anuales en pre-emergencia.</i>		24085
Mohican Energy® Di flufenican 4% + Glifosato 16% (SC) <i>Malas hierbas anuales y perennes, en pre-emergencia o post-emergencia precoz</i>		25004
Register 25 WG® Flazasulfuron 25% (WG) <i>Gramíneas y hoja ancha. Controla lolium y conyza.</i>		ES-00401
Rusnet® Quizalofop-p-etil 5% p/v (50 g/l) (EC) <i>Malas hierbas anuales y vivaces en post-emergencia precoz</i>		24515



INSECTICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Acrux® Hexitiazox 10% (WP) <i>Ácaros</i>		23489
Boreal® Abamectina 1,8% (EC) <i>Ácaros</i>		21854
Delta EC® Deltametrin 2,5% (EC) <i>Polilla del racimo, cicadélidos, philaenus spumarius</i>		25706
Doctrin® Bacillus thuringiensis var. kurstaki (cepa PB-54) 32% (WP). Certificado de Insumos CERES en Agricultura Ecológica. <i>Lobesia Botrana y Eupoecilia Ambiguella</i>	NOVEDAD	22423
Superblock® Aceite de Parafina 80% (EC). Cetificado SHC para agricultura Ecológica. <i>Ácaros, Cochinilla y Eriofidos</i>	NOVEDAD	ES-00079

Lista de Productos para Viña



NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

Nombre de Producto / Composición

Fortan ECO®

Óxido de potasio (K₂O) p/p, Óxido de magnesio (MgO) p/p, Hierro (Fe) quelado por EDTA 1,0% p/p, Manganeso (Mn) quelado por EDTA 0,4% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA 1,5% p/p

Missyllk®

Aminoácidos libres: 22,2% p/p, Nitrógeno (N) total: 3.0% p/p, Pentóxido de fósforo (P₂O₅): 16.4% p/p, Óxido de potasio (K₂O): 18.0% p/p, Manganeso (Mn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Molibdeno (Mo): 0.25% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 0,10% p/p, Extracto húmico total: 29.1% p/p, Ácidos húmicos: 14.0% p/p, Ácidos fúlvicos: 15.1% p/p

Nutrex Cuaje®

Aminoácidos libres 5% p/p, Nitrógeno (N) total 0,65% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 0,65% p/p, Pentóxido de fósforo (P₂O₅) 9,5% p/p, Óxido de potasio (K₂O) 12,6% p/p, Boro (B) 8% p/p, Molibdeno (Mo) 10% p/p

ON ASCENZA®

Aminoácidos libres 2% p/p, Nitrógeno (N) total 1,35% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p, Ácido algínico 1.5% p/p, Manitol 0.9% p/p, Prolina 2% p/p; Glicina Betaina: 10%,

NOVEDAD

Ultraferro Complex®

Aminoácidos libres: 2% p/p, Nitrógeno (N): 5% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 4,5% p/p, Hierro (Fe) quelado por [o-o] EDDHA: 3,1% p/p, Manganeso (Mn) quelado por EDTA: 1,25% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 1,5% p/p



ASCENZA en maíz

||||| Productos destacados

||||| **Button®**

||||| **Decano®**

||||| **Deflexo Mix®**

||||| **Deflexo Ultra®**

||||| **Aikido®**

||||| **Missylk®**

||||| **ON ASCENZA®**

Lista de Productos para Maíz



HERBICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Acasto® Pendimetalina 33% (EC) <i>Dicotiledóneas y gramíneas</i>	NOVEDAD	ES-00490
Button® Mesotriona 10% (SC) <i>Dicotiledóneas y gramíneas</i>		ES-00528
Circus 25 WG® Rimsulfuron 25% (WG) <i>Gramíneas y dicotiledóneas en post-emergencia</i>		ES-00245
Cizalla OD® Nicosulfuron 2%, Sulcotriona 15% (OD) <i>Dicotiledóneas anuales, gramíneas anuales y vivaces</i>		ES-00110
Decano® Sulcotriona 30% (SC) <i>Juncia, malas hierbas de hoja ancha y hierbas monocotiledóneas en post-emergencia</i>		24798
Deflexo Mix® S-metolacoloro 312.5 g/L - Terbutilazina 187.5 g/L (SE) <i>Control de gramíneas y hoja ancha en cultivo de maíz en pre-emergencia</i>		ES-01095
Deflexo Ultra® S-metolacoloro 35% + Sulcotriona 10% (SE) <i>Control de gramíneas y hoja ancha en pre-emergencia</i>	NOVEDAD	ES-01108
Flurostar® 200 Fluroxipir 20% (EC) <i>Hoja ancha en post-emergencia</i>		25.462
Herpan 50® MCPA 50% (SL) <i>Hierbas de hoja ancha en post-emergencia</i>		22720

Kaos B®

Bentazona 48% (SL) 25575
Dicotiledóneas

Sabba®

Pendimetalina 33% (EC) 25767
Malas hierbas anuales y malas hierbas de hoja ancha en estado de pre-emergencia o post-emergencia precoz

Sajon OD®

Nicosulfuron 4% (OD) 24800
Dicotiledóneas, gramíneas y Sorghum halepense en post-emergencia precoz



INSECTICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Aikido® Lambda-cihalotrin 10% (CS) <i>Taladro, gusanos grises, delfácidos, cicadélido, y pulgones</i>		25640
Boreal® Abamectina 1,8% (EC) <i>Ácaros</i>		21854
Delta EC® Deltametrin 2,5% (EC) <i>Orugas y diabrótica</i>		25706
Excentro® 0,5 Teflutrin 0.5% (5 g/kg) <i>Gusanos de alambre y diabrótica</i>	NOVEDAD	ES-01191



NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

Nombre de Producto / Composición

ENR T-300®

MCDHS 100 % (p/p)

Folur®

Nitrógeno (N) total: 20% p/p, Nitrógeno Ureico: 20% p/p y Pobre en Biuret

Missylk®

Aminoácidos libres: 22,2% p/p, Nitrógeno (N) total: 3.0% p/p,
Pentóxido de fósforo (P₂O₅): 16.4% p/p, Óxido de potasio (K₂O): 18.0% p/p, Manganeseo (Mn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Molibdeno (Mo): 0.25% p/p,
Zinc (Zn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 0,10% p/p, Extracto húmico total: 29.1% p/p, Ácidos húmicos: 14.0% p/p, Ácidos fúlvicos: 15.1% p/p

ON ASCENZA®

Aminoácidos libres 2% p/p, Nitrógeno (N) total 1,35% p/p,
Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p, Ácido algínico 1.5% p/p,
Manitol 0.9% p/p, Prolina 2% p/p; Glicina Betaina: 10%,

NOVEDAD

Suporter Plus AF®

Nitrógeno (N) total: 3% p/p, Nitrógeno (N) ureico: 3% p/p,
Pentóxido de fósforo (P₂O₅) 17% p/p

N-Release®

Nitrógeno total (N): 20, Nitrógeno Amónico (N): 0,60, Nitrógeno Ureico (N): 19,40, Fósforo (P₂O₅): 3,17, Azufre (SO₃): 0,39, Molibdeno (Mo): 0,31, MCDHS/ N ureico: 1,34

NOVEDAD



ASCENZA en cereales

||||| Productos destacados

||||| Melvar EC®

||||| Trunfo Max®

||||| Aikido®

||||| Estaca®

||||| Mohican 50®

||||| Polarpec 80®

||||| Voltage Flo®

||||| Orbiter®

||||| Missylk®

||||| ON ASCENZA®

Lista de Productos para Cereales



FUNGICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Melvar EC® Protioconazol 25% (EC) <i>Fusarium y Roya</i>	NOVEDAD	ES-01135
Placaje 25 SC® Azoxistrobin 25% (SC) <i>Oídio, roya amarilla y parda, septoriosis y podredumbre radicular (Fusarium roseum)</i>		ES-00267
Trineo 25 EW® Tebuconazol 25% (EW) <i>Oídio, helmintosporiosis (Pyrenophora teres), rincosporium, roya y septoria</i>		24409
Trunfo Max® Azoxistrobin 20%, Tebuconazol 20% (SC) <i>Fusarium, septoria, roya, helmintosporiosis, rincosporium</i>	NOVEDAD	ES-01092



HERBICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Acasto® Pendimetalina 33% (EC) <i>Malas hierbas en pre o post-emergencia</i>		ES-00490
Estaca WG® Diflufenican 40% p/p (400 g/Kg), Florasulam 2% p/p (20 g/Kg) Iodosulfuron 5% p/p (50 g/Kg) (WG) <i>Malas hierbas dicotiledóneas y gramíneas en post-emergencia</i>		ES-00472
Flurostar® 200 Fluroxipir 20% (EC) <i>Post-emergencia de malas hierbas de hoja ancha</i>		25462
Herbastop Ultra® 2,4D 34,5%, MCPA 34,5% (SL) <i>Malas hierbas de hoja ancha en post-emergencia</i>		19436

Herbenuron®

Tribenuron-metil 75% (WG) 25395
Malas hierbas anuales de hoja ancha

Hercampo Green®

Glifosato 36% (SL) 17118
Malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas post-emergencia

Hercampo Ultra®

Glifosato 45% (SL) NOVEDAD ES-00309
Malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas en post-emergencia

Herpan 50®

MCPA 50% (SL) 22720
Hierbas de hoja ancha en post-emergencia

Mohican 50 SC®

Diflufenican 50% (SC) 24085
Dicotiledóneas anuales en pre-emergencia y post-emergencia

Orbiter®


Florasulan 5% (SC) NOVEDAD ES-01154
Control de malas hierbas de hoja ancha

Polarpec 80®

Prosulfocarb 80% (EC) NOVEDAD ES-00293
Gramíneas en pre o post-emergencia

Voltage Flow®

Flufenacet 40%, Diflufenican20% NOVEDAD ES-00293



INSECTICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Aikido® Lambda-cihalotrin 10% (CS) <i>Pulgones</i>		25640

Lista de Productos para Cereales

Delta EC®
Deltametrin 2,5% (EC)
Polillas y pulgones

25706



NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

Nombre de Producto / Composición

ENR T-300®
MCDHS 100 % (p/p)

Glusapec®
Cobre (Cu) soluble en agua: 5% p/p, Cobre (Cu) complejoado por ácido glucónico: 5% p/p

Folur®
Nitrógeno (N) total: 20% p/p, Nitrógeno Ureico: 20% p/p y Pobre en Biuret

Missylk®
Aminoácidos libres: 22,2% p/p, Nitrógeno (N) total: 3.0% p/p,
Pentóxido de fósforo (P₂O₅): 16.4% p/p, Óxido de potasio (K₂O): 18.0% p/p, Manganeseo (Mn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Molibdeno (Mo): 0.25% p/p,
Zinc (Zn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 0,10% p/p, Extracto húmico total: 29.1% p/p, Ácidos húmicos: 14.0% p/p, Ácidos fúlvicos: 15.1% p/p

ON ASCENZA®
Aminoácidos libres 2% p/p, Nitrógeno (N) total 1,35% p/p,
Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p, Ácido algínico 1.5% p/p,
Manitol 0.9% p/p, Prolina 2% p/p; Glicina Betaina: 10%

NOVEDAD

Suporter Plus AF®
Nitrógeno (N) total: 3% p/p, Nitrógeno (N) ureico: 3% p/p,
Pentóxido de fósforo (P₂O₅) 17% p/p

N-Release®
Solución NP (20-3) con molibdeno y con inhibidor de la ureasa (MCDHS)

NOVEDAD



ASCENZA en cítricos

||||| Productos destacados

||||| Covinex 35 WG®

||||| Pombal 80 WG®

||||| Mohican 50®

||||| Register 25 WG®

||||| Superblock®

||||| Expedient 10 EC®

||||| Noscale®

||||| Algaegreen Cítricos®

||||| Missylk®

||||| ON ASCENZA®

Lista de Productos para Cítricos



FUNGICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Covinex 35 WG® Oxicloruro de Cobre 35%. Certificado ecológico CAAE <i>Phytophthora, Negrilla, Colletotricum, Xanthomonas</i>	NOVEDAD	ES-00666
Covinex 700 Flow® Oxicloruro de Cu 70% (SC) <i>Aguado, Bacteriosis, Fomopsis, Hongos Endofitos</i>		24457
Hidrocuper-50® Hidróxido cúprico 50% (WP) <i>Aguado, Bacteriosis, Fomopsis y Hongos Endofitos</i>		23015
Manzivex 80 WP® Mancozeb 80% (WP) <i>Aguado y mal seco en cítricos</i>		13789
Pombal 80 WG® Fosetil-Al 80% (WG) <i>Phytophthora de los cítricos</i>		25505



HERBICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Hercampo Green® Glifosato 36% (SL) <i>Malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas en post-emergencia</i>		17118
Hercampo Ultra® Glifosato 45% (SL) <i>Malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas en post-emergencia</i>	NOVEDAD	ES-00309
Hereu Super® Oxifluorfen 24% (EC) <i>Malas hierbas anuales de hoja ancha y gramíneas en pre y post-emergencia precoz.</i>		23059

Herpan 50®

MCPA 50% (SL) 22720
Hierbas de hoja ancha en post-emergencia

Mohican 50 SC®

Diflufenican 50% (SC) 24085
Dicotiledóneas anuales en pre-emergencia.

Mohican Energy®

Diflufenican 4% + Glifosato 16% (SC) 25004
Malas hierbas anuales y perennes, en pre-emergencia o post-emergencia precoz

Register 25 WG®

Flazasulfuron 25% (WG) ES-00401
Gramíneas y hoja ancha. Controla lolium y conyza.

Rusnet®

Quizalofop-p-etil 5% p/v (50 g/l) (EC) 24515
Malas hierbas anuales y vivaces en post-emergencia precoz



INSECTICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Acrux® Hexitiazox 10% (WP) 23489 <i>Acaros Tetranychidos, Tetranychus urticae, Panonichus citri y Eotetranychus carpini</i>		
Boreal® Abamectina 1,8% (EC) 21854 <i>Ácaros</i>		
Doctrin® Bacillus thuringiensis var. kurstaki (cepa PB-54) 32% (WP). Certificado de Insumos CERES en Agricultura Ecológica. <i>Cacoecia Rosana, Prays Citris</i>	NOVEDAD	22423

Lista de Productos para Cítricos

Expedient 10 EC®
Piriproxifen 10% (EC)
Caparreta, piojo gris, piojo rojo, serpeto y piojo blanco.

24252

Noscale®
Rescalure 4%[VP] P/V
Piojo rojo de California

NOVEDAD

ES-00169

Superblock®
Aceite de Parafina 80% (EC). **Cetificado SHC para agricultura Ecológica.**
Acaros, Cochinillas y Eriofidos

NOVEDAD

ES-00079



NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

Nombre de Producto / Composición

Algaegreen Cítricos®
Ácido algínico 0,4%, Manitol 0,25%, Zinc-EDTA 2%, Manganeso EDTA: 2%

Carrier Mix®
Hierro-EDTA 7,5%, Manganeso-EDTA 3,5% Zinc-EDTA 0,7%,
Cobre-EDTA 0,28%, Molibdeno 0,3%, Boro 0,65%

ENR T-300®
MCDHS 100 % (p/p)

Fortan ECO®
Óxido de potasio (K₂O) p/p, Óxido de magnesio (MgO) p/p, Hierro (Fe) quelado por EDTA 1,0% p/p, Manganeso (Mn) quelado por EDTA 0,4% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA 1,5% p/p

Microsoil®
Enzimas, microorganismos beneficiosos, minerales, vitaminas, polisacáridos y polipéptidos.

Missylk®
Aminoácidos libres: 22,2% p/p, Nitrógeno (N) total: 3.0% p/p, Pentóxido de fósforo (P₂O₅): 16.4% p/p, Óxido de potasio (K₂O): 18.0% p/p, Manganeso (Mn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Molibdeno (Mo): 0.25% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 0,10% p/p, Extracto húmico total: 29.1% p/p, Ácidos húmicos: 14.0% p/p, Ácidos fúlvicos: 15.1% p/p

Nutrex Cuaje®
Aminoácidos libres 5% p/p, Nitrógeno (N) total 0,65% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 0,65% p/p, Pentóxido de fósforo (P₂O₅) 9,5% p/p, Óxido de potasio (K₂O) 12,6% p/p, Boro (B) 8% p/p, Molibdeno (Mo) 10% p/p

ON ASCENZA®
Aminoácidos libres 2% p/p, Nitrógeno (N) total 1,35% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p, Ácido algínico 1.5% p/p, Manitol 0.9% p/p, Prolina 2% p/p; Glicina Betaina: 10%,

NOVEDAD

Suporter Plus AF®
Nitrógeno (N) total: 3% p/p, Nitrógeno (N) ureico: 3% p/p, Pentóxido de fósforo (P₂O₅) 17% p/p

Ultraferro Complex®
Aminoácidos libres: 2% p/p, Nitrógeno (N): 5% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 4,5% p/p, Hierro (Fe) quelado por [o-o] EDDHA: 3,1% p/p, Manganeso (Mn) quelado por EDTA: 1,25% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 1,5% p/p

ASCENZA en frutales

||||| Productos destacados

||||| Centinela EC®

||||| Flecha Suprem®

||||| Premier 50 WG®

||||| Trineo 25 WG®

||||| Delta EC®

||||| Mohican 50®

||||| Missylk®

||||| ON ASCENZA®

Lista de Productos para Frutales



FUNGICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Centinela 10 EC® Penconazol 10% (EC) <i>Oídio</i>	24064
Covinex 35 WG® Oxicloruro de Cobre 35%. Certificado ecológico CAAE <i>Abolladura, Phytophthora y Moteado</i>	NOVEDAD ES-00666
Cuper 50® Oxicloruro de Cobre 50% (WP) <i>Abolladura, Monilia y Moteado</i>	22287
Flecha Suprem® Kresoxim-metil 25% p/p (250 g/Kg); Difenconazol 12,5% p/p (87,5 g/Kg) (WG) <i>Moteado y Stemfilium</i>	ES-00260
Pombal 80 WG® Fosetil-Al 80% (WG) <i>Phytophthora</i>	25505
Premier 50 WG® Ciprodinil 50% (WG) <i>Moteado</i>	ES-00312
Smash® Dodina 40% <i>Moteado y Abolladura</i>	23392
Trineo 25 WG® Tebuconazol 25% (WG) <i>Oídio, Moteado, Stemfilium y Monilia</i>	25092



HERBICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Acasto® Pendimetalina 33% (EC) <i>Malas hierbas en pre o post-emergencia</i>	ES-00490
Hereu Super® Oxifluorfen 24% (EC) <i>Malas hierbas anuales de hoja ancha y gramíneas en pre y post-emergencia precoz</i>	23059
Hercampo Ultra® Glifosato 45% (SL) <i>Malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas en post-emergencia</i>	NOVEDAD ES-00309
Herpan 50® MCPA 50% (SL) <i>Hierbas de hoja ancha en post-emergencia</i>	22720
Mohican 50 SC® Di flufenican 50% (SC) <i>Dicotiledóneas anuales en pre-emergencia.</i>	24085
Mohican Energy® Di flufenican 4% + Glifosato 16% (SC) <i>Malas hierbas anuales y perennes, en pre-emergencia o post-emergencia precoz</i>	25004
Rusnet® Quizalofop-p-etil 5% p/v (50 g/l) (EC) <i>Malas hierbas anuales y vivaces en post-emergencia precoz</i>	24515

Lista de Productos para Frutales



INSECTICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Acrux® Hexitiazox 10% (WP) Ácaros	23489	
Boreal® Abamectina 1,8% (EC) Ácaros y Psila	21854	
Delta EC® Deltametrin 2,5% (EC) Pulgonas, Psila, Carpocasa y Philaneus Spumarius	25706	
Doctrin® Bacillus thuringiensis var. kurstaki (cepa PB-54) 32% (WP). Certificado de Insumos CERES en Agricultura Ecológica. Lepidópteros	NOVEDAD	22423
Expedient 10 EC® Piriproxifen 10% (EC) Piojo de San José	24252	
Rikolto® Acetamiprid 20% (SG) Pulgonas	NOVEDAD	ES-00876
Superblock® Aceite de Parafina 80% (EC). Cetificado SHC para agricultura Ecológica. Ácaros, Cochinilla Harinosa, Eriofidos, Piojo De San Jose, Psila y Pulgonas	NOVEDAD	ES-00079



NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

Nombre de Producto / Composición		
Fortan ECO® Óxido de potasio (K ₂ O) p/p, Óxido de magnesio (MgO) p/p, Hierro (Fe) quelado por EDTA 1,0% p/p, Manganeseo (Mn) quelado por EDTA 0,4% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA 1,5% p/p		
Missylk® Aminoácidos libres: 22,2% p/p, Nitrógeno (N) total: 3.0% p/p, Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅): 16.4% p/p, Óxido de potasio (K ₂ O): 18.0% p/p, Manganeseo (Mn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Molibdeno (Mo): 0.25% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 0,10% p/p, Extracto húmico total: 29.1% p/p, Ácidos húmicos: 14.0% p/p, Ácidos fúlvicos: 15.1% p/p		
Nutrex Cuaje® Aminoácidos libres 5% p/p, Nitrógeno (N) total 0,65% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 0,65% p/p, Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) 9,5% p/p, Óxido de potasio (K ₂ O) 12,6% p/p, Boro (B) 8% p/p, Molibdeno (Mo) 10% p/p		
ON ASCENZA® Aminoácidos libres 2% p/p, Nitrógeno (N) total 1,35% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p, Ácido algínico 1.5% p/p, Manitol 0.9% p/p, Prolina 2% p/p; Glicina Betaina: 10%,	NOVEDAD	
Ultraferro Complex® Aminoácidos libres: 2% p/p, Nitrógeno (N): 5% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 4,5% p/p, Hierro (Fe) quelado por [o-o] EDDHA: 3,1% p/p, Manganeseo (Mn) quelado por EDTA: 1,25% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 1,5% p/p		

ASCENZA en almendro

||||| Productos destacados

||||| Covinex 35 WG®

||||| Flecha Suprem®

||||| Mohican 50 SC®

||||| Delta EC®

||||| Missylk®

||||| ON ASCENZA®

Lista de Productos para Almendro



FUNGICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Covinex 35 WG® Oxicloruro de Cobre 35%. Certificado ecológico CAAE Abolladura y Phytophthora	NOVEDAD ES-00666
Covinex 700 Flow® Oxicloruro de Cu 70% (SC) Abolladura y Monilia	24457
Covicampo 50® Oxicloruro de Cu 50% (WP) Abolladura, Fusicocum y Monilia	12965
Flecha Suprem® Kresoxim-metil 25% p/p (250 g/Kg) Difenoconazol 12,5% p/p (87,5 g/Kg) (WG) Moteado y Mancha Ocre	ES-00260
Hidrocuper 50® Hidróxido cúprico 50% (WP) Monilia, Abolladura y Bacteriosis	23015
Trineo 25 WG® Tebuconazol 25% (WG) Monilia, Moteado y Oidio	25092



HERBICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Hereu Super® Oxifluorfen 24% (EC) Hoja ancha y gramíneas pre y post-emergencia precoz, malas hierbas anuales	23059
Hercampo Green® Glifosato 36% (SL) Malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas post-emergencia	17118

Herpan 50®


MCPA 50% (SL) 22720
Hoja ancha en post-emergencia

Mohican 50 SC®

Di flufenican 50% (SC) 24085
Dicotiledóneas anuales en pre-emergencia

Rusnet®

Quizalofop-p-etil 5% p/v (50 g/l) (EC) 24515
Gramíneas Anuales y Gramíneas Vivaces



INSECTICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Boreal® Abamectina 1,8% (EC) Ácaros	21854
Delta EC® Deltametrin 2,5% (EC) Pulgones, Orugas Defoliadoras, Tigre, Anarsia, Empoasca y Orugueta	25706
Doctrin® Bacillus thuringiensis var. kurstaki (cepa PB-54) 32% (WP). Certificado de Insumos CERES en Agricultura Ecológica. Archips Podanus, Archips Rosanus y Arnasia Lineatella	NOVEDAD 22423

Expedient 10 EC®

Piriproxifen 10% (EC) 24252
Piojo de San José

Superblock®

Aceite de Parafina 80% (EC). **Cetificado SHC para agricultura Ecológica.**
Ácaros, Cochinillas y Eriofidos

NOVEDAD

 ES-00079

Lista de Productos para Almendro



NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

Nombre de Producto / Composición

Fortan®

Aminoácidos libres 2,0% p/p, Nitrógeno total (N) 0,36% p/p, Nitrógeno orgánico 0,36% p/p, Óxido de potasio (K₂O) p/p, Óxido de magnesio (MgO) p/p, Hierro (Fe) quelado por EDTA 1,0% p/p, Manganeseo (Mn) soluble en agua 0,4% p/p, Zinc (Zn) soluble en agua 1,6% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA 1,6% p/p

Missylk®

Aminoácidos libres: 22,2% p/p, Nitrógeno (N) total: 3.0% p/p, Pentóxido de fósforo (P₂O₅): 16.4% p/p, Óxido de potasio (K₂O): 18.0% p/p, Manganeseo (Mn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Molibdeno (Mo): 0.25% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 0,10% p/p, Extracto húmico total: 29.1% p/p, Ácidos húmicos: 14.0% p/p, Ácidos fúlvicos: 15.1% p/p

Nutrex Cuaje®

Aminoácidos libres 2% p/p, Nitrógeno (N) total 0,4% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 0,4% p/p, Óxido de potasio (K₂O) 30% p/p; Óxido de magnesio (MgO) 5% p/p; Manganeseo (Mn) 1% p/p; Zinc (Zn) 3% p/p; Aminograma: Glicina: 2% p/p; Aminoácidos.

ON ASCENZA®

Aminoácidos libres 2% p/p, Nitrógeno (N) total 1,35% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p, Ácido algínico 1.5% p/p, Manitol 0.9% p/p, Prolina 2% p/p; Glicina Betaina: 10%,

NOVEDAD

Resilient®

Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 6% p/p Extracto de algas: Ascophyllum nodosum Manitol 0,10% p/p



ASCENZA en hortícolas

||||| Productos destacados

||||| Actlet C®

||||| Centinela 10 EC®

||||| Covinex 35 WG®

||||| Spyrit Pro®

||||| Circus 25 WG®

||||| Aikido®

||||| Delta EC®

||||| Sondae®

||||| Missylk®

||||| ON ASCENZA®

Lista de Productos para Hortícolas



FUNGICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Actlet C® Metalaxil-M 28,5 g/l + Hidróxido de cobre 215 g/l (SC) <i>Phytophthora infestans</i>	ES-00713
Azupec Micro WG® Azufre 80% (WG) <i>Oídio</i>	24416
Centinela 10 EC® Penconazol 10% (EC) <i>Oídio</i>	24064
Ceremonia 25 EC® Difenoconazol 25% (EC) <i>Septoria y Alternaria.</i>	24410
Cimoxate CU® Cimoxanilo 3%, Sulf. Cuprocálcico 22,5% (WP) <i>Mildiu</i>	23563
Cimoxate Mz WG® Cimoxamilo 4%, Mancozeb 46,5% (WP) <i>Mildiu</i>	ES-00216
Covinex 35 WG® Oxicloruro de Cobre 35%. Certificado ecológico CAAE <i>Alternaria, Colletoricum y Mildiu</i>	NOVEDAD ES-00666
Cuper 50® Oxicloruro de Cobre 50% (WP) <i>Alternaria y Mildiu</i>	22287
Grano de Oro 98,5® Azufre 98,5% (DP) <i>Oídio, Oidiopsis y Ácaros</i>	13325

Manzivex 80 WP®

Mancozeb 80% (WP) 13789
Mildiu, Alternaria y Antracnosis

Placaje 25 SC®

Azoxistrobin 25% (SC) ES-00267
Oídio

Spyrit 50 SC®

Dimetomorf 44% (SC) ES-00365
Mildiu

Spyrit M WG®

Dimetomorf 7,5%, Mancozeb 66,7% (WG) ES-00295
Mildiu

Spyrit Pro®

Dimetomorf 9%, Propamocarb 50% (SC) ES-00151
Mildiu

Tasis 12,5 EC®

Miclobutanil 12,5% (EC) 24266
Oídio



HERBICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Acasto® Pendimetalina 33% (EC) <i>Malas hierbas en pre o post-emergencia</i>	NOVEDAD ES-00490
Athir Max® Fluazifop-p-butil 12,5% (EC) <i>Gramíneas anuales</i>	24692
Circus 25 WG® Rimsulfuron 25% (WG) <i>Dicotiédoneas y gramíneas en post-emergencia</i>	ES-00245

Lista de Productos para Hortícolas

Sabba® Pendimetalina 33% (EC) <i>Dicotiledoneas en pre-emergencia o post-emergencia precoz</i>	25767
Stonic® Clomazona 36% (CS) <i>Malas hierbas anuales</i>	NOVEDAD ES-00670
INSECTICIDAS Nombre de Producto / Composición Número de registro	
Aikido® Lambda-cihalotrin 10% (CS) <i>Orugas, Mosca Blanca, Gusanos Grises, Pulgones y Escarabajos</i>	25640
Boreal® Abamectina 1,8% (EC) <i>Ácaros</i>	21854
Delta EC® Deltametrin 2,5% (EC) <i>Orugas, Pulgones y Escarabajo de la patata.</i>	25706
Doctrin® Bacillus thuringiensis var. kurstaki (cepa PB-54) 32% (WP). Certificado de Insumos CERES en Agricultura Ecológica. <i>Plagas. Heliotis, Plusia, Spodoptera Spp y Tuta Absoluta.</i>	NOVEDAD 22423
Expedient 10 EC® Piriproxifen 10% (EC) <i>Mosca blanca</i>	24252
Sondae® Oxamilo 10% (SL) <i>Nemátodos</i>	ES-00131



NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

Nombre de Producto / Composición

Missylk® Aminoácidos libres: 22,2% p/p, Nitrógeno (N) total: 3.0% p/p, Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅): 16.4% p/p, Óxido de potasio (K ₂ O): 18.0% p/p, Manganeseo (Mn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Molibdeno (Mo): 0.25% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 0,10% p/p, Extracto húmico total: 29.1% p/p, Ácidos húmicos: 14.0% p/p, Ácidos fúlvicos: 15.1% p/p	
ON ASCENZA® Aminoácidos libres 2% p/p, Nitrógeno (N) total 1,35% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p, Ácido algínico 1.5% p/p, Manitol 0.9% p/p, Prolina 2% p/p; Glicina Betaina: 10%,	NOVEDAD

ASCENZA en arroz

||||| Productos destacados

||||| Placaje 25 SC®

||||| Stonic®

||||| ENR T-300®

Lista de Productos para Arroz



FUNGICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Placaje 25 SC® Azoxistrobin 25% (SC) <i>Helminthosporium y piricularia</i>	ES-00267



HERBICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Acasto® Pendimetalina 33% (EC) <i>Malas hierbas en pre o post-emergencia</i>	NOVEDAD ES-00490
Herpan 50® MCPA 50% (SL) <i>Hoja ancha en post-emergencia</i>	22720
Kaos B® Bentazona 48% (SL) <i>Dicotiledóneas y ciperáceas.</i>	25575
Stonic® Clomazona 36% (CS) <i>Malas hierbas anuales</i>	NOVEDAD ES-00670



NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

Nombre de Producto / Composición
ENR T-300® MCDHS 100 % (p/p)



Fungicidas destacados

Fungicida

Actlet C®

ACTLET C® es un fungicida que contiene Metalaxil-M e Hidróxido de cobre. Metalaxil-M es un fungicida sistémico que se absorbe muy rápidamente después de la aplicación foliar inhibiendo el crecimiento micelial y la formación de esporas.

El hidróxido de cobre es buen protector, de contacto y multisitio que complementa muy bien la acción de M-Metalaxil al usarlos en mezcla de proporciones adecuadas.

Número de registro
ES-00713

Formulación
Metalaxil-M
2,85% +
Hidróxido de
cobre 21,5% (SC)

Materia activa
Metalaxil-m +
Hidróxido De
Cobre

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Berenjena	Mildiu	3,5 L/ha	10 aire libre / 3 invernadero	Aire libre e invernadero. Autorizado contra Phythophthora infestans. Aplicar desde 9 o más brotes apicales laterales visibles (BBCH 29) hasta comienzo de la maduración de frutos y semillas (BBCH 81). Volumen 500-1000L/ha. N° máximo tratamientos:3 Intervalo entre aplicaciones: 7-10 días
Patata	Mildiu	3,5 L/ha	21	Autorizado contra Phythophthora infestans. Uso al aire libre. Aplicar desde 60% de las plantas se tocan entre hileras (BBCH 36) hasta comienzo de la maduración de frutos y semillas (BBCH 81). Volumen 500-1000L/ha. N° máximo tratamientos:3 Intervalo entre aplicaciones: 7-10 días
Tomate	Mildiu	3,5 L/ha	10 aire libre / 3 invernadero	Aire libre e invernadero. Autorizado contra Phythophthora infestans. Aplicar desde 9 o más brotes apicales laterales visibles (BBCH 29) hasta comienzo de la maduración de frutos y semillas (BBCH 81). Volumen 500-1000L/ha. N° máximo tratamientos:3 Intervalo entre aplicaciones: 7-10 días

Envases



Fungicida

Actlet F®

ACTLET F® es una combinación de Metalaxil-M y Folpet diseñada para una protección temprana del cultivo de la viña contra el mildiu.

Presenta una excelente eficacia contra la Plasmopara vitícola de la vid, asegurando una completa protección tanto en hojas como en racimos. Con Tres modos de acción: curativa, preventiva y antiesporulante confiere una protección completa de las hojas, nuevos brotes y racimos.

Número de registro
ES-01124

Formulación
Folpet 40% +
Metalaxil-M 5%
P/P (WG)

Materia activa
Folpet +
Metalaxil-M

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Vid de mesa	Mildiu	2 kg/ha	No Procede	Eficaz frente a Plasmopara vitícola. Tratamiento permitido solo hasta la floración, BBCH 18-69
Vid de vinificación	Mildiu	2 kg/ha	28 días	Eficaz frente a Plasmopara vitícola. BBCH 18-85



Envases



Fungicida

Centinela 10 EC®

CENTINELA 10 EC® es un fungicida sistémico, con acción preventiva y curativa. Su notable persistencia, evita y detiene los ataques de Oídio y su sistemía protege las nuevas brotaciones. La sustancia activa Penconazol, penetra rápidamente en la planta por lo que es resistente al lavado por lluvias posteriores al tratamiento.

Número de registro
24064

Formulación
Penconazol 10% (EC)

Materia activa
Penconazol

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Albaricoquero	Oídio	0,03-0,04%	14	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días entre las mismas. En frutales de hueso (melocotón, nectarino y albaricoquero) aplicar desde BBCH 01 (comienzo del hinchado de las yemas foliares) hasta BBCH 71 (crecimiento del ovario; los frutos no cuajados se caen).
Cucurbitaceas	Oídio	0,03-0,04%	3	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días entre las mismas. En cucurbitáceas (aire libre e invernadero) aplicar desde BBCH 14 (3ª hoja verdadera del tallo principal desplegada) hasta BBCH 79 (el 90% de los frutos sobre el tallo principal ha alcanzado el tamaño y la forma típicas).
Frutales de pepita	Oídio	0,03-0,04%	14	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días entre las mismas. En frutales de pepita, aplicar desde BBCH 01 (comienzo del hinchado de las yemas foliares) hasta BBCH 71 (crecimiento del ovario; los frutos no cuajados se caen).
Melocotonero	Oídio	0,03-0,04%	14	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días entre las mismas. En frutales de hueso (melocotón, nectarino y albaricoquero) aplicar desde BBCH 01 (comienzo del hinchado de las yemas foliares) hasta BBCH 71 (crecimiento del ovario; los frutos no cuajados se caen).
Nectarino	Oídio	0,03-0,04%	14	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días entre las mismas. En frutales de hueso (melocotón, nectarino y albaricoquero) aplicar desde BBCH 01 (comienzo del hinchado de las yemas foliares) hasta BBCH 71 (crecimiento del ovario; los frutos no cuajados se caen).
Tomate de invernadero	Oídio	0,03-0,04%	3	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días entre las mismas. En tomate (invernadero) aplicar desde BBCH 61 (flor abierta) hasta BBCH 81 (el 10% de los frutos muestra el color típico de madurez).
Vid	Oídio	0,03-0,04%	14	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días entre las mismas. desde BBCH 13 (3 hojas desplegadas) hasta BBCH 79 (todas las bayas de un racimo se tocan).

Envases



Fungicida

Covinex 35 WG®

COVINEX 35 WG® es un fungicida y bactericida de contacto con acción preventiva, recomendado en el control de oomicosis (mildius), repilo y otras enfermedades causadas por hongos endoparásitos y bacterias.

De forma general, para todos los usos autorizados no superar la dosis máxima de 4 kg Cu/ha y año.

Número de registro
ES-00666

Formulación
Oxícloruro de Cobre 35%

Certificado ecológico
CAAE

Gránulo Dispersable en Agua (WG)

Materia activa
Oxícloruro De Cobre

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Almendro	Abolladura	1,6-1,7 kg/ha	No procede	Otras enfermedades: Xanthomonas, Cribado, Monilia, Cladosporiosis, Antracnosis y Pseudomona. Realizar 1-2 aplicaciones por campaña en Abolladura, Xanthomonas, Cribado, Monilia, Cladosporiosis, Antracnosis y Pseudomonas mediante pulverización normal con un intervalo de 7-10 días; y, 1 aplicación por campaña.
	Phytophthora	1,7 kg/ha	No Procede	Phytophthora mediante pulverización localizada al cuello. Aplicar en otoño, invierno y primavera, desde el letargo: yemas foliares y florales, cerradas y cubiertas de escamas marrón-oscuro hasta fin del hinchado de las yemas foliares (BBCH 00-03).
Berenjena Al Aire Libre	Colletoricum	1,1-1,5 kg/ha	3 días	Realizar 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera, desde la aparición de 9 o más hojas del tallo principal, desplegadas hasta la formación de 9 o más brotes apicales laterales visibles (BBCH 19-29).
Brecol	Alternaria	0,66 -1,5 kg/ha	14 días	También con registro en Peronospora, Mycosphaerella y Chancro. Realizar 1-5 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera en todos los estadios de desarrollo del cultivo.
Bulbos Y Tuberculos	Mildiu	0,66 kg/ha 0,66-1,5 kg/ha	3 días	Ajo, Cebolla, Cebolleta, Chalote Realizar 3-5 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera en todos los estadios de desarrollo del cultivo.
Cítricos	Phytophthora	1,4-2,1 kg/ha	No Procede	También para Negrilla, Colletotricum, Xanthomonas. Realizar 2-3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar desde el reposo: yemas vegetativas y de inflorescencias indiferenciadas, cerradas y cubiertas de escamas hasta que los brotes alcanzan alrededor del 90% de su tamaño final (BBCH 00-39) y desde que las yemas se hinchan: están cerradas y se hacen visibles las escamas, ligeramente verdes hasta que los sépalos se abren: se hacen visibles los extremos de los pétalos, todavía cerrados, de color blanco o amoratado (BBCH 51-57).
Coliflor	Alternaria	0,66 -1,5 kg/ha	14 días	También con registro en Peronospora, Mycosphaerella y Chancro. Realizar 1-5 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera en todos los estadios de desarrollo del cultivo.
Cucurbitáceas De Piel Comestible En Invernadero	Mildiu	0,88-1,5 kg/ha	3 días	También contra Colletotricum y Pseudomonas. Realizar 1-2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera, desde que la 3ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta la formación de 9 o más brotes laterales primarios visibles (BBCH 13-29).
Cucurbitaceas De Piel No Comestible	Mildiu	0,88-1,5 kg/ha	7 días	También contra Colletotricum y Pseudomonas. Realizar 1-2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera, desde que la 3ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta la formación de 9 o más brotes laterales primarios visibles (BBCH 13-29).
Frutales De Hueso	Abolladura	1,6-2,04 kg/ha	No Procede	También contra Xanthomonas, Cribado, Monilia, Cladosporiosis, Antracnosis y Pseudomonas Realizar 1-2 aplicaciones por campaña en Abolladura, Xanthomonas, Cribado, Monilia, Cladosporiosis, Antracnosis y Pseudomonas mediante pulverización normal con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera, desde el letargo: yemas foliares y florales, cerradas y cubiertas de escamas marrón-oscuro hasta fin del hinchado de las yemas foliares; escamas separadas; secciones de las yemas, verde claro, visibles (BBCH 00-03).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Frutales De Hueso	Phytophthora	1,7 kg/ha	No procede	1 aplicación por campaña en Phytophthora mediante pulverización localizada al cuello. Aplicar en otoño, invierno y primavera, desde el letargo: yemas foliares y florales, cerradas y cubiertas de escamas marrón-oscuro hasta fin del hinchado de las yemas foliares; escamas separadas; secciones de las yemas, verde claro, visibles (BBCH 00-03).
Frutales De Pepita	Moteado	0,48-2,175 kg/ha	No procede	También contra Monilia, Septoria, Chancro, Fuego Bacteriano. Realizar 1-4 aplicaciones por campaña en Moteado, Monilia, Septoria y Chancro, 2-3 aplicaciones por campaña en Fuego Bacteriano mediante pulverización normal con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño e invierno desde el letargo: yemas foliares y florales, cerradas y cubiertas de escamas marrón-oscuro hasta fin del hinchado de las yemas vegetativas; escamas de las yemas ligeramente coloreadas, con algunas zonas cubiertas densamente de pelos (BBCH 00-03); y en primavera desde el comienzo de la abertura de las yemas; primeros ápices foliares verdes, visibles hasta estadio oreja de ratón: ápices foliares verdes 10 mm por encima de las escamas de las yemas; primeras hojas, separándose (BBCH 07-54)
	Phytophthora	2,1 kg/ha	No procede	1 aplicación por campaña en Phytophthora mediante pulverización localizada al cuello. La aplicación se realizará en otoño e invierno
Frutos Rojos	Micosphaerella	1,28-1,7 kg/ha	No procede	Arándano, Grosellero, Frambueso, Mora y Grosellero espinoso (aire libre) Realizar 1-2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera, desde el letargo: yemas foliares y florales, cerradas y cubiertas de escamas marrón-oscuro; hasta que las primeras hojas han alcanzado el tamaño varietal típico (BBCH 00-19).
Frutos Secos	Oidio	1,6-1,7 kg/ha	No Procede	Avellano, Castaño, Nogal contra a Micosphaerella, Mal del desgarro, Oidio
Kiwi	Alternaria	2,1 kg/ha	No Procede	Registro en Pseudomonas, Alternaria, Phytophthora. Realizar 1 aplicación por campaña mediante pulverización normal. Aplicar en otoño e invierno desde el letargo hasta comienzo de brotación (BBCH 00-08).
	Podredumbre De Cuello Y Raiz	0,008-0,01 kg/ha	No Procede	1 aplicación por campaña mediante pulverización localizada al cuello. Aplicar en otoño e invierno desde el letargo hasta comienzo de brotación (BBCH 00-08).
Lechuga Y Similares	Alternaria	0,6 kg/ha	7 días	Lechuga, Escarola, Endivia, Achicoria, Rúcula y Espinaca (aire libre) Registro en Bremia spp, Cercospora, Alternaria, Marsonina, Peronospora, Colletorichum, Xanthomonas, Pseudomonas. Realizar 1-5 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera en todos los estadios de desarrollo del cultivo.
Leguminosas	Colletorichum	0,66 kg/ha o 0,66-1,5 kg/ha	3 días	Leguminosas de grano, excepto judía verde (aire libre) Registro para Colletorichum, Peronospora, Phytophthora, Antracnosis Realizar 3-5 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera en todos los estadios de desarrollo del cultivo.
Nispero	Cribado	1,4 - 2,28 kg/ha	No Procede	Realizar 1-3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño e invierno desde el letargo: yemas foliares y florales, cerradas y cubiertas de escamas marrón-oscuro hasta que las yemas florales se hinchan: escamas alargadas, con manchas ligeramente coloreadas (BBCH 00-51).
Olivo	Negrilla	1,6 - 2,2 kg/ha	No Procede	Tambien registro contra Pseudomonas y Cladosporiosis Realizar 1-3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar desde que las yemas foliares, situadas normalmente en el ápice de los brotes del año anterior, están completamente cerradas y son puntiagudas, sin pedúnculo y de color ocre hasta que las hojas alcanzan el tamaño y forma característicos de la variedad (BBCH 00-19), y desde tamaño de los frutos alrededor del 10% de su tamaño final hasta 90% de su tamaño final, fruto apto para verdeo (BBCH 71-79).
	Repilo	1,6 - 2,1 kg/ha	No Procede	Realizar 1-3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar desde que las yemas foliares, situadas normalmente en el ápice de los brotes del año anterior, están completamente cerradas y son puntiagudas, sin pedúnculo y de color ocre hasta que las hojas alcanzan el tamaño y forma característicos de la variedad (BBCH 00-19), y desde tamaño de los frutos alrededor del 10% de su tamaño final hasta 90% de su tamaño final, fruto apto para verdeo (BBCH 71-79).
Ornamentales	Alternaria	0,66 -1,5 kg/ha	No Procede	Ornamentales florales o de flor (aire libre) Peronospora, Marsonina, Alternaria, Chancro Realizar 1-2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera en todos los estadios de desarrollo del cultivo.
Patata	Phytophthora	1,7 -2,1 kg/ha	14 días	Registro para Phytophthora infestans, Alternaria, Xanthomonas. Realizar 1-4 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar desde que la 2º hoja del tallo principal está desplegada (> 4 cm) hasta bayas de la fructificación de 1er grado aún verdes, semilla ligeramente coloreada (tallo principal) (BBCH 12-81).
Tabaco	Phytophthora	1,4 -1,8 kg/ha		Realizar 1-2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar durante el desarrollo de las hojas (BBCH 11-19).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Tomate Al Aire Libre	Phytophthora	1,4-1,6 kg/ha	10 días (Industrial) y 3 días (Fresco)	Phytophthora, Pseudomonas, Xanthomonas. Realizar 1-4 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días. Aplicar en otoño, invierno y primavera, desde la aparición de 9 o más hojas del tallo principal, desplegadas hasta la formación de 9 o más brotes apicales laterales visibles (BBCH 19-29).
Vid	Black Rot	1,7-1,9 kg/ha	21 días para los tratamientos en BBCH 71-83.	Realizar 1 aplicación por campaña. Aplicar desde 3 hojas desplegadas hasta que los primeros capuchones florales, separados del receptáculo (BBCH 13-60); desde el cuajado de frutos; los frutos jóvenes comienzan a hincharse; los restos florales perdidos hasta que las bayas están brillantes (BBCH 71-83); y desde partes cosechadas hasta 2 hojas desplegadas (BBCH 99-12).
	Excoriosis	1,7-1,9 kg/ha	21 días para los tratamientos en BBCH 71-83	Realizar 1 aplicación por campaña. Aplicar desde 3 hojas desplegadas hasta que los primeros capuchones florales, separados del receptáculo (BBCH 13-60); desde el cuajado de frutos; los frutos jóvenes comienzan a hincharse; los restos florales perdidos hasta que las bayas están brillantes (BBCH 71-83); y desde partes cosechadas hasta 2 hojas desplegadas (BBCH 99-12).
	Mildiu	1,7-1,9 kg/ha	21 días para los tratamientos en BBCH 71-83	Realizar 1 aplicación por campaña. Aplicar desde 3 hojas desplegadas hasta que los primeros capuchones florales, separados del receptáculo (BBCH 13-60); desde el cuajado de frutos; los frutos jóvenes comienzan a hincharse; los restos florales perdidos hasta que las bayas están brillantes (BBCH 71-83); y desde partes cosechadas hasta 2 hojas desplegadas (BBCH 99-12).



Envases



1KG
5KG

Fungicida

Covinex Forte MZ®

COVINEX FORTE MZ® es un fungicida organocúprico caracterizado por aportar Cobre bajo forma de sales diferentes (Sulfato Cuprocálcico 37%, Oxicloruro de Cobre 18%) y Mancozeb 15%. Su contenido en sulfato cuprocálcico asegura la superior fijación del producto, proporcionando un buen efecto residual. El oxicloruro de cobre permite obtener un efecto inmediato, por la rápida liberación de iones cúpricos. El Mancozeb es un fungicida orgánico que actúa por inhibición de las enzimas sulfhidríticas. La combinación de estas materias confiere al formulado una sobresaliente acción preventiva sobre las enfermedades criptogámicas.

Número de registro
19525

Formulación
Oxicloruro de Cobre (expresado en Cobre) 10,0% + Sulfato Cuprocálcico (expresado en Cobre) 10,0% +Mancozeb 15,0% (WP)

Materia activa
Oxicloruro De Cobre + Sulfato Cuprocalcico + Mancozeb

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Olivo	Repilo	0,25-0,30%	15	Realizar una aplicación en primavera y otra en otoño, evitando el periodo de floración. Máximo 2 aplicaciones con un intervalo entre las mismas de 90 días.
Patata	Mildiu	0,25-0,30%	15	Aplicar durante todos los estadios. Máximo 3 aplicaciones con un intervalo entre las mismas de 7-10 días.
	Alternaria	0,25-0,30%	15	Aplicar durante todos los estadios. Máximo 3 aplicaciones con un intervalo entre las mismas de 7-10 días.
Vid	Mildiu	0,25-0,30%	28	Aplicar desde 3 hojas desplegadas (BBCH 13) hasta antes del principio de la floración (BBCH 60) y desde fin de la floración (BBCH 68) hasta ablandamiento de las bayas (BBCH 85). Se debe evitar el periodo de floración. Máximo 2 aplicaciones con un intervalo entre las mismas de 7-10 días.



TÚ DECIDES ASCENZA

Envases

1 Kg
3 Kg
5 Kg

Fungicida

Cimoxate 45 WG®

CIMOXATE 45 WG® es un fungicida penetrante de contacto, con acción translaminar. Con efecto preventivo y curativo.

Número de registro
ES-00321

Formulación
Cimoxanilo 45% (WG)

Materia activa
Cimoxanilo

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Patata	Mildiu	0.27 kg/ha	7 días	Aplicaciones en pulverización foliar mecánica y manual.
Tomate	Mildiu	0.27 kg/ha	3 (consumo fresco) 7 (industrial)	Aplicaciones en pulverización foliar mecánica y manual.
Vid	Mildiu	0.27 kg/ha	28 días	Aplicaciones en pulverización foliar mecánica y manual.



TÚ DECIDES ASCENZA

Envases

500 G

Fungicida

Flecha®

FLECHA® es un fungicida sistémico con movimiento traslaminar. Pertenece a la familia química de estrobilurinas y está clasificado en el grupo 11 en el Comité de Actuación de Resistencia a Fungicidas (FRAC).

Número de registro
ES-00853

Formulación
Kresoxim-metil
50% (WG)

Materia activa
Kresoxim-metil

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Manzano	Moteado	0.2 kg/ha	8-14 días	3 tratamientos. 1ª aplicación BBCH 57. Intervalo entre aplicaciones 8-14 días.
	Stemfilium	0.2 kg/ha	8-14 días	3 tratamientos. 1ª aplicación BBCH 57. Intervalo entre aplicaciones 8-14 días.
Olivo	Repilo	0.2 kg/ha	14 días	2 tratamientos. Aplicar durante BBCH 50-55. Intervalos entre aplicaciones 14 días.
Peral	Moteado	0.2 kg/ha	8-14 días	3 tratamientos. 1ª aplicación BBCH 57. Intervalo entre aplicaciones 8-14 días.
	Stemfilium	0.2 kg/ha	8-14 días	Mancha negra (Stemphylium vesicarium)
Vid	Oídio	0.3 kg/ha	10-14 días	Aplicar durante BBCH 19-81. Primera aplicación con la aparición de los primeros síntomas
	Black rot	0.3 kg/ha	10-14 días	Aplicar durante BBCH 19-81. Primera aplicación con la aparición de los primeros síntomas

Envases



600 g

Fungicida

Flecha Suprem®

FLECHA SUPREM® es un fungicida sistémico con movimiento translaminar que contiene las sustancias activas Kresoxim-metil y Difenoconazol.

Fungicida de aplicación foliar con actividad preventiva, curativa y erradicante que se aplica para el control de moteado: *Venturia inaequalis* en manzano, *Venturia pyrina* en peral y repilo en olivar. Autorizado para moteado y mancha ocre en almendro.


Número de registro
ES-00260

Formulación
Kresoxim-metil 25% +
Difenoconazol
12,5% (WG)

Materia activa
Kresoxim-metil +
Difenoconazol

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Almendro	Moteado	0,25-0,3 kg/ha	N.P	USO MENOR - Aplicar desde la apertura de las yemas hasta que los frutos alcanzan el 90% del tamaño varietal final BBCH 53-79
	Mancha ocre	0,25-0,3 kg/ha	N.P	USO MENOR - Aplicar desde la apertura de las yemas hasta que los frutos alcanzan el 90% del tamaño varietal final BBCH 53-79
Manzano	Moteado	0,25-0,3 kg/ha	35 Días	Aplicar desde la apertura de las yemas hasta que los frutos alcanzan el 90% del tamaño varietal final BBCH 53-79. Intervalo entre aplicaciones 14 días. Volumen:500-1000
Olivo	Repilo	0,25-0,3 kg/ha	N.P	Aplicar en primavera BBCH 50-59, durante el desarrollo de la inflorescencia y antes de la aparición de las primeras flores
Peral	Moteado	0,25-0,3 kg/ha	35 Días	Aplicar desde la apertura de las yemas hasta que los frutos alcanzan el 90% del tamaño varietal final BBCH 53-79. Intervalo entre aplicaciones 14 días. Volumen:500-1000
	Stemfilium	0,25-0,3 kg/ha	35 Días	Aplicar desde BBCH 65 a 79.



Envases



600 g

Fungicida

Pombal 80 WG®

POMBAL 80 WG® es un formulado a base de Fosetil-Al en forma de granulado dispersable en agua que presenta una traslocación ascendente y descendente. La sistemía descendente le hace especialmente indicado para combatir las enfermedades del cuello, tronco y raíces, como la *Phytophthora* de los cítricos. Además, Fosetil-Al, al metabolizarse en la planta, desarrolla mecanismos fisiológicos de autodefensa, aumentando las defensas naturales de la planta frente a futuras infecciones.

Número de registro
25505

Formulación
Fosetil aluminio
80% (WG)

Materia activa
Fosetil Aluminio

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Cítricos	Phytophthora	0,25-0,30 Kg/Hl	15	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, la 1ª en floración, la 2ª en julio y la última en octubre-noviembre, sin superar los 4,5 Kg producto/Ha. por aplicación y un volumen de caldo de 1.000-1.500 l de caldo/Ha.
Frutales de pepita	Phytophthora	0,25-0,30 Kg/Hl	15	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, la 1ª en abril, la 2ª en julio y la última en septiembre-octubre, sin superar los 3,6 Kg producto/Ha. por aplicación y un volumen de caldo de 800-1.200 l de caldo/Ha.
Vid	Mildiu	0,25-0,30 Kg/Hl	28	Efectuar un máximo de 4 aplicaciones por campaña, en floración y post-floración con un intervalo de 10-14 días, sin superar los 2,5 Kg/Ha. por aplicación y un volumen de caldo de 300-1.100 l/Ha.



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases



1 Kg
5 Kg

Fungicida

Premier 50 WG®

PREMIER 50 WG® es un fungicida foliar sistémico de amplio espectro. El ciprodinil pertenece al grupo de las anilino pirimidinas, actúa como un inhibidor de la biosíntesis de metionina e interfiere en el ciclo de vida del hongo mediante la inhibición de la penetración y por la interrupción del crecimiento de micelios en la planta.

Número de registro
ES-00312

Formulación
Ciprodinil 50%
(WG)

Materia activa
Ciprodinil

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Frutales de pepita	Moteado	0,5 kg/ha	60	Estado de desarrollo: BBCH 10-59. Volumen de caldo 500-1000 l/ha. Nº tratamientos 1-2. Intervalo entre aplicaciones 10-14.



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases



1 Kg



Placaje 25 SC®

PLACAJE 25 SC® es un fungicida con gran efectividad y un espectro de acción polivalente.

El azoxistrobin es un fungicida translaminar y sistémico. La azoxistrobina pertenece a la familia química de las estrobirulinas, grupo químico de metoxiacrilatos pertenecientes al grupo de Inhibidores de la Quinona (QoI), clasificado dentro del grupo C3 según su Modo de Acción (MoA) por el FRAC (Comité de Acción contra la Resistencia Fungicida). Se absorbe a través de las raíces y se transloca en el xilema a los tallos y hojas, o a través de las superficies de las hojas hasta las puntas de las hojas y los bordes de crecimiento. El modo de acción es mediante la inhibición de la respiración mitocondrial en hongos. Inhibe la germinación de esporas, el crecimiento micelial y la producción de esporas de hongos. El azoxistrobin tiene actividad sistémica, con acción preventiva y curativa contra una amplia gama de enfermedades de las plantas causadas por hongos.

Número de registro
ES-00267

Formulación
Azoxistrobin 25%
(SC)

Materia activa
Azoxistrobin

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Arroz	Helminthosporium	1 l/Ha	28	Aplicar desde el estado de hinchado medio (BBCH43) hasta el estado de grano pastoso duro (BBCH87).Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400 l/ha
	Piricularia	1 l/Ha	28	Aplicar desde el estado de hinchado medio (BBCH43) hasta el estado de grano pastoso duro (BBCH87).Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400 l/ha
Calabacín	Oídio	0,075-0,08%	1	Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha
Calabaza	Oídio	0,08-1%	3	Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha
Cebada	Helminthosporium	1 l/Ha	35	Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha
	Oídio	1 l/Ha	35	Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 2. Volumen de caldo: 200-400l/Ha
	Roya parda	1 l/Ha	35	Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 2. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Cebada	Escaldado de los cereales	1 l/Ha	35	Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 2. Volumen de caldo: 200-400l/Ha
Melón	Oídio	0,075-0,08%	3	Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha
Pepinillo	Oídio	0,075-0,08%	1	Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha
Pepino de invernadero	Oídio	0,075-0,08%	1	Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha
Sandía	Oídio	0,075-0,08%	3	Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha
Tomate de invernadero	Oídiopsis	0,08-1%	1	Aplicación en invernadero. Pulverización manual, con un máximo de 1 L/ha. desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del fruto (BBCH89). Nº máximo tratamientos: 2. Intervalos: 10. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha
Trigo	Podredumbre radicular	1 l/Ha	35	Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha
	Roya amarilla	1 l/Ha	35	Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha
	Oídio	1 l/Ha	35	Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha
	Septoriosis	1 l/Ha	35	Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha
	Roya parda	1 l/Ha	35	Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases



5 L

Fungicida

Trineo 25 EW®

TRINEO 25 EW® es un fungicida de fácil y rápida absorción por la planta con sistemía ascendente. Posee actividad penetrante, curativa y erradicante sobre un amplio grupo de hongos.

Número de registro

24409

Formulación

Tebuconazol 25% (EW)

Materia activa

Tebuconazol

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Ajo	Stemfilium	1 l/ha	21/NP	En aplicación foliar. Realizar 2 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con tractor a dosis de 1 l/Ha y volumen de caldo: 400 l/ha. Establecer un un intervalo mínimo de 21 días entre ellas, la primera en la etapa del cultivo de desarrollo de las hojas y la siguiente a partir del desarrollo vegetativo de la parte cosechable (cuando la base de la hoja empieza a engrosar). No aplicar el producto en otoño/ invierno. No se podrán realizar estas dos aplicaciones si se ha llevado a cabo una aplicación previa del producto con el agua de riego para las otras enfermedades.
	Botritis	1 l/ha	21/NP	Aplicación en riego por goteo: Dosis máxima 1,6 l/Ha; una única aplicación por campaña después de la siembra. Aplicación en pulverización foliar.: Máximo 2 aplicaciones por campaña separadas entre sí 21 días a dosis de 1 l/Ha y un intervalo mínimo de 21 días entre ellas. Volumen de caldo: 400 l/ha
	Cladosporiosis	1 l/ha	21/NP	Aplicación en riego por goteo: Dosis máxima 1,6 l/Ha; una única aplicación por campaña después de la siembra. Aplicación en pulverización foliar.: Máximo 2 aplicaciones por campaña separadas entre sí 21 días a dosis de 1 l/Ha y un intervalo mínimo de 21 días entre ellas. Volumen de caldo: 400 l/ha
	Esclerotinia	1 l/ha	21	Aplicación en riego por goteo: Dosis máxima 1,6 l/Ha; una única aplicación por campaña después de la siembra. Aplicación en pulverización foliar.: Máximo 2 aplicaciones por campaña separadas entre sí 21 días a dosis de 1 l/Ha y un intervalo mínimo de 21 días entre ellas. Volumen de caldo: 400 l/ha
	Roya	1 l/ha	21/NP	Aplicación en riego por goteo: Dosis máxima 1,6 l/Ha; una única aplicación por campaña después de la siembra. Aplicación en pulverización foliar.: Máximo 2 aplicaciones por campaña separadas entre sí 21 días a dosis de 1 l/Ha y un intervalo mínimo de 21 días entre ellas. Volumen de caldo: 400 l/ha
Cebada	Rincosporium	1 l/ha	35	Máximo 2 aplicaciones por campaña a dosis de 1 l/Ha, separadas entre sí 14 días. Aplicar desde BBCH 30 (comienzo del encañado) hasta plazo de seguridad. Volumen de caldo: 200-400 l/ha.
	Helmintosporium	1 l/ha	35	Máximo 2 aplicaciones por campaña a dosis de 1 l/Ha, separadas entre sí 14-21 días. Volumen de caldo: 200-400 l/ha
	Oídio	1 l/ha	35	Máximo 2 aplicaciones por campaña a dosis de 1 l/Ha, separadas entre sí 14-21 días. Volumen de caldo: 200-400 l/ha
	Roya	1 l/ha	35	Máximo 2 aplicaciones por campaña a dosis de 1 l/Ha, separadas entre sí 14-21 días. Volumen de caldo: 200-400 l/ha
	Septoria	1 l/ha	35	Máximo 2 aplicaciones por campaña a dosis de 1 l/Ha, separadas entre sí 14-21 días. Volumen de caldo: 200-400 l/ha
Cebolla	Stemfilium	1 l/ha	21/NP	En aplicación foliar. Realizar 2 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con tractor a dosis de 1 l/Ha y volumen de caldo: 400 l/ha. Establecer un un intervalo mínimo de 21 días entre ellas, la primera en la etapa del cultivo de desarrollo de las hojas y la siguiente a partir del desarrollo vegetativo de la parte cosechable (cuando la base de la hoja empieza a engrosar). No aplicar el producto en otoño/ invierno. No se podrán realizar estas dos aplicaciones si se ha llevado a cabo una aplicación previa del producto con el agua de riego para las otras enfermedades.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Cebolla	Botritis	1 l/ha	21/NP	Aplicación en riego por goteo: Dosis máxima 1,6 l/Ha; una única aplicación por campaña después de la siembra. Aplicación en pulverización foliar.: Máximo 2 aplicaciones por campaña separadas entre sí 21 días a dosis de 1 l/Ha y un intervalo mínimo de 21 días entre ellas. Volumen de caldo: 400 l/ha
	Cladosporiosis	1 l/ha	21/NP	Aplicación en riego por goteo: Dosis máxima 1,6 l/Ha; una única aplicación por campaña después de la siembra. Aplicación en pulverización foliar.: Máximo 2 aplicaciones por campaña separadas entre sí 21 días a dosis de 1 l/Ha y un intervalo mínimo de 21 días entre ellas. Volumen de caldo: 400 l/ha
	Esclerotinia	1 l/ha	21/NP	Aplicación en riego por goteo: Dosis máxima 1,6 l/Ha; una única aplicación por campaña después de la siembra. Aplicación en pulverización foliar.: Máximo 2 aplicaciones por campaña separadas entre sí 21 días a dosis de 1 l/Ha y un intervalo mínimo de 21 días entre ellas. Volumen de caldo: 400 l/ha
	Roya	1 l/ha	21/NP	Aplicación en riego por goteo: Dosis máxima 1,6 l/Ha; una única aplicación por campaña después de la siembra. Aplicación en pulverización foliar.: Máximo 2 aplicaciones por campaña separadas entre sí 21 días a dosis de 1 l/Ha y un intervalo mínimo de 21 días entre ellas. Volumen de caldo: 400 l/ha
Olivo	Repilo	0,6 l/ha	NP	Máximo 1 aplicación por campaña a dosis de 0,6 l/Ha. Volumen de caldo 1000 l/ha. Incluye aceituna de mesa y aceituna para producción de aceite. Aplicar desde las yemas florales, situadas normalmente en las axilas de las hojas, están completamente cerradas y son puntiagudas, sin pedúnculo y con brácteas de color ocre, hasta que la corola cambia del color verde al blanco (BBCH 50-59).
Trigo	Helmintosporium	1 l/ha	35	Máximo 2 aplicaciones por campaña a dosis de 1 l/Ha, separadas entre sí 14-21 días. Volumen de caldo: 200-400 l/ha
	Oídio	1 l/ha	35	Máximo 2 aplicaciones por campaña a dosis de 1 l/Ha, separadas entre sí 14-21 días. Volumen de caldo: 200-400 l/ha
	Roya	1 l/ha	35	Máximo 2 aplicaciones por campaña a dosis de 1 l/Ha, separadas entre sí 14-21 días. Volumen de caldo: 200-400 l/ha
	Septoria	1 l/ha	35	Máximo 2 aplicaciones por campaña a dosis de 1 l/Ha, separadas entre sí 14-21 días. Volumen de caldo: 200-400 l/ha







TÚ DECIDES ASCENZA

Envases



1 L

5 L

Fungicida

Trunfo Max®

TRUNFO MAX® es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción preventiva y curativa, contiene azoxistrobin y tebuconazol. El azoxistrobin es un fungicida translaminar y sistémico. Se absorbe a través de las raíces y se transloca en el xilema a los tallos y hojas, o a través de las superficies de las hojas hasta las puntas de las hojas y los bordes de crecimiento. El modo de acción es mediante la inhibición de la respiración mitocondrial en hongos. Inhibe la germinación de esporas, el crecimiento micelial y la producción de esporas de hongos.

El tebuconazol pertenece a la clase química de los fungicidas triazoles. Se ha demostrado que su modo de acción se basa en la inhibición de la desmetilación en la posición C14 en la biosíntesis de esteroides de hongos. Tiene translocación acropetal, por lo tanto es absorbida por la planta y llevada hasta los meristemas terminales donde tiende a acumularse.

Número de registro
ES-01092

Formulación
Azoxistrobin
18.52%,
Tebuconazol
18.52%

Materia activa
Azoxistrobin
Tebuconazol

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Cereales	Fusarium	1 l/ha	35 días	Trigo y Cebada. Aplicar entre BBCH 31-69.
	Helmintosporium	1 l/ha	35 días	Trigo y Cebada. Aplicar entre BBCH 31-69.
	Rincosporium	1 l/ha	35 días	Trigo y Cebada. Aplicar entre BBCH 31-69.
	Roya Parda	1 l/ha	35 días	Trigo y Cebada. Aplicar entre BBCH 31-69.
	Septoria	1 l/ha	35 días	Trigo y Cebada. Aplicar entre BBCH 31-69.
Remolacha Azucarera	Cercospora	0,8 l/ha	28 días	Para infestaciones moderadas. Aplicar entre BBCH 39-49.
	Oidio	0,8 l/ha	28 días	Eficaz contra Erysiphe betae. Aplicar entre BBCH 39-49.
	Roya	0,8 l/ha	28 días	Eficaz contra Uromyces betae. Aplicar entre BBCH 39-49.

Envases



Fungicida

Spyrit 50 SG®

SPYRIT 50 SG® se aplica en pulverización foliar sobre las hojas de los cultivos y tiene actividad preventiva, curativa y erradicante. Se aplica para el control de *Plasmopara viticola* (mildiu) en vid, *Phytophthora infestans* (mildiu) en patata y *Bremia lactucae* (Mildiu en lechuga).

Número de registro
ES-00370

Formulación
Dimetomorf 50%
SC

Materia activa
Dimetomorf 50%

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Lechuga y similares	Mildiu	0.4 L/ha	7-10	Aplicar al Aire libre Estado del cultivo BBCH 12-49 Volumen de caldo 500-1000
Patata	Mildiu	0.4-0.5 L/ha	7-10	Estado del cultivo BBCH 12-81 Volumen de caldo 500-1000
Vid de mesa	Mildiu	0.5 L/ha	13	Estado del cultivo BBCH 18-77 Volumen de caldo 200-1000
Vid de vinificación	Mildiu	0.5 L/ha	13	Estado del cultivo BBCH 18-77 Volumen de caldo 200-1000



Envases



Fungicida

Spyrit Plus WG®

SPYRIT PLUS WG® está constituido por 3 sustancias activas: Dimetomorf es un fungicida penetrante con actividad preventiva, curativa y antiesporulante frente a Oomicetos (Mildius).

Folpet es un fungicida protector foliar con acción preventiva perteneciente al grupo químico de las Phtalimidas, con modo de acción multisitio. Fosetil-Al es un fungicida sistémico con acción protectora. Se absorbe a través de las hojas con translocación ascendente y descendente.

La combinación de estos fungicidas hace de SPYRIT PLUS WG® un fungicida foliar con triple modo de acción, altamente resistente al lavado que presenta larga persistencia de acción y una muy elevada eficacia en el control del mildiu de la vid (*Plasmopara vitícola*).

Número de registro
ES-00240

Formulación
Dimetomorf 6%
+ Fosetil 50% +
Folpet 25% (WG)

Materia activa
Dimetomorf +
Fosetil +Folpet

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Vid de vinificacion	Mildiu	3 Kg/ha	28	Aplicar desde 8 hojas desplegadas hasta que las bayas comienzan a tocarse (BBCH018-77). 1 Aplicación. Volumen de 200-1000 l/ha



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases

3 kg

Fungicida

Spyrit Pro®

SPYRIT PRO® está constituido por 2 sustancias activas: dimetomorf, fungicida sistémico, con acción preventiva, curativa y anti-esporulante y propamocarb, fungicida sistémico, con acción principalmente preventiva. El dimetomorf pertenece al grupo CAA (Carboxylic Acid Amides) clasificado dentro del grupo H5 por FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) de acuerdo con su modo de acción. Propamocarb pertenece al grupo de los carbamatos, clasificado dentro del grupo F4 por FRAC de acuerdo con su modo de acción.

La combinación de ambas sustancias activas hace de SPYRIT PRO® un fungicida de amplio espectro (actuando principalmente contra hongos Oomicetos), con acción preventiva, curativa y antiesporulante, características de las sustancias que lo componen, indicado para el control de mildiu en patata, lechuga y similares.

Número de registro
ES-00151

Formulación
Dimetomorf 9%+
Propamocarb
50% (SC)

Materia activa
Dimetomorf +
Propamocarb

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Lechuga y similares	Mildiu	2 L/ ha	7	Número aplicaciones: 1. Volumen de caldo 500-1000 L/ha. Aplicar entre BBCH 12-47
Patata	Mildiu	2 L/ ha	21	Número aplicaciones: 3. Intervalo 10-12 días Volumen de caldo 500-1000 L/ha. Aplicar entre BBCH 12-47.



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases

5 L

Fungicida

Melvar EC®

MELVAR EC® es un fungicida sistémico a base de Protioconazol para su aplicación en cereales, con efectos preventivos, curativos, erradicantes y prolongada actividad residual. Protioconazol pertenece al grupo de las triazolintionas, fungicidas que inhiben la desmetilación (DMI) en la biosíntesis de ergosterol.

Número de registro
ES-01135

Formulación
Protioconazol
25% (EC)

Materia activa
Protioconazol

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Trigo	Fusarium	0.8 (L/ha)	35	Aplicar durante BBCH 39-43 y BBCH 53-65.
	Roya	0.8 (L/ha)	35	Eficaz frente a Puccinia sp. Aplicar durante BBCH 31-33 y BBCH 39-49.
Cebada	Fusarium	0.8 (L/ha)	35	Aplicar durante BBCH 39-43 y BBCH 53-65.



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases



5L



Herbicidas

Herbicida

Button®

BUTTON® es un herbicida de post-emergencia que contiene mesotriona. La absorción es principalmente vía foliar y en alguna medida a través del suelo, con translocación acrópeta, basípeta y distribución por toda la planta.

Número de registro
ES-00528

Formulación
Mesotriona 10%
(SC)

Materia activa
Mesotriona

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Maíz de grano y forrajero	Malas hierbas anuales	0,75-1,5 L/Ha	No Procede	Malas hierbas de hoja ancha: Abutilon theophrastis, Amaranthus sp, Chenopodium álbium, Convolvulus sp, Datura stramonium, Solanum sp, Sonchus sp, Xanthium sp. Aplicar desde el estadio de 2 hojas desplegadas hasta 9 o más hojas desplegadas (BBCH 12-19).



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases

1 L
5 L
20 L

Herbicida

Circus 25 WG®

CIRCUS 25 WG® es un herbicida sistémico selectivo, que es absorbido por las raíces y las hojas, con rápida traslocación a los tejidos meristemáticos. Rimsulfuron es una sulfonilurea para tratamientos herbicidas contra malas hierbas, gramíneas y dicotiledóneas en post-emergencia de las mismas en tomate, patata y maíz al aire libre.

Es necesaria la adición de un coadyuvante humectante a fin de mejorar la absorción del producto por las hojas de las malas hierbas.

Número de registro
ES-00245

Formulación
Rimsulfuron 25%
(WG)

Materia activa
Rimsulfurom

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Época	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Maíz	Post-emergencia	Gramíneas	50 gr/ha	No Procede	Tratar en todos los casos en post-emergencia del maíz durante el estado de BBCH 12-14 (desarrollo del tallo principal, desde 2 hasta 4 hojas desplegadas). Para conseguir los mejores resultados siga las instrucciones de la etiqueta.
	Post-emergencia	Dicotiledóneas	50 gr/ha	No Procede	Tratar en todos los casos en post-emergencia del maíz durante el estado de BBCH 12-14 (desarrollo del tallo principal, desde 2 hasta 4 hojas desplegadas). Para conseguir los mejores resultados siga las instrucciones de la etiqueta.
Patata	Post-emergencia	Dicotiledóneas	60 gr/ha	No Procede	Tratar cuando la patata se encuentre en la fase de formación de brotes laterales (BBCH 20-30). Para conseguir los mejores resultados siga las instrucciones de la etiqueta.
	Post-emergencia	Gramíneas	0,3-0,4%	No Procede	Tratar cuando la patata se encuentre en la fase de formación de brotes laterales (BBCH 20-30). Para conseguir los mejores resultados siga las instrucciones de la etiqueta.
Tomate	Post-emergencia	Dicotiledóneas	60 gr/ha	No Procede	Tratar desde la tercera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta 8 hojas del tallo principal desplegadas (BBCH 13-18). Para conseguir los mejores resultados siga las instrucciones de la etiqueta.
	Post-emergencia	Gramíneas	60 gr/ha	No Procede	Tratar desde la tercera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta 8 hojas del tallo principal desplegadas (BBCH 13-18). Para conseguir los mejores resultados siga las instrucciones de la etiqueta.

Envases

100 g

Herbicida



Deflexo MIX®

Herbicida selectivo para el control de gramíneas y malas hierbas de hoja ancha en cultivo de maíz. Combinación de dos sustancias activas: S-metolacoloro, que inhibe la división celular y el crecimiento de los tallos y las raíces, y terbutilazina, una triazina sistémica con actividad herbicida, de absorción radical y muy débilmente foliar que se trasloca a través del xilema hacia los puntos de acción e interfiere la función clorofílica.

Número de registro
ES-01095

Formulación
S-metolacoloro
312.5 g/L -
Terbutilazina
187.5 g/L (SE)

Materia activa
S-metolacoloro +
Terbutilazina

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Época	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Maíz	Pre-emergencia	Malas hierbas	3,5 L/ha	No Procede	



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases



5 L

Herbicida



Deflexo Ultra®

DEFLEXO ULTRA es un herbicida que contiene s-metolacoloro, sulcotriona y el protector benoxacor. S-metolacoloro inhibe ácidos grasos de cadena muy larga (VLCFAs) deteriorando la división celular y el desarrollo de brotes en las plantas susceptibles. En gramíneas anuales, S-metolacoloro se absorbe por los tejidos apicales mientras crecen a través del suelo tratado y los síntomas generales se caracterizan por plántulas con malformaciones y enrolladas donde las hojas están muy enrolladas y no pueden desenrollarse adecuadamente. En las malas hierbas de hoja ancha, la absorción radicular es una ruta importante de entrada del herbicida y los síntomas son típicamente hojas arrugadas con apariencia en forma de corazón.

Número de registro
ES-01108

Formulación
S-metolacoloro (=300
g/l), Sulcotriona
(=100 g/l), Protector
Benoxacor (=17.5 g/l)

Materia activa
S-metolacoloro +
Sulcotriona

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Época	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Maíz	Pre-emergencia	Gramíneas	3,5 - 3,9 L/ha	No Procede	Volumen de caldo: 200-400 L/ha. Aplicar en pre-emergencia. Una aplicación por campaña.
		Malas Hierbas De Hoja Ancha	3,5 - 3,9 L/ha	No Procede	Volumen de caldo: 200-400 L/ha. Aplicar en pre-emergencia. Una aplicación por campaña.



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases



20L
5L

Herbicida

Decano®

DECANO® es un herbicida selectivo en maíz. No tiene efecto residual. Las plantas afectadas exhiben un blanqueamiento general antes de marchitarse y desaparecer. La vía principal de penetración es la foliar, complementada por la radicular.

Número de registro
24798

Formulación
Sulcotriona 30% (SC)

Materia activa
Sulcotriona

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Época	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Maíz de grano y forrajero	Post-emergencia	Juncia	1,-1,5 l/ha	No Procede	En maíz de grano y forrajero: aplicar a una dosis de 1 a 1,5 l/ha de producto, con un volumen de caldo de 150-400 l/ha.
	Post-emergencia	Monocotiledóneas	1,-1,5 l/ha	No Procede	En maíz de grano y forrajero: aplicar a una dosis de 1 a 1,5 l/ha de producto, con un volumen de caldo de 150-400 l/ha.
	Post-emergencia	Malas hierbas de hoja ancha	1,-1,5 l/ha	No Procede	En maíz de grano y forrajero: aplicar a una dosis de 1 a 1,5 l/ha de producto, con un volumen de caldo de 150-400 l/ha.
Maíz dulce	Post-emergencia	Malas hierbas de hoja ancha	1 l/ha	No Procede	En maíz dulce: aplicar a una dosis de 1 l/ha de producto con un volumen de caldo de 150-400 l/ha.
Sorgo	Post-emergencia	Monocotiledóneas	0,5 l/ha	No Procede	Aplicar a una dosis de 0.5 l/ha de producto con un volumen de caldo de 150-400 l/ha.
	Post-emergencia	Malas hierbas de hoja ancha	0,5 l/ha	No Procede	Aplicar a una dosis de 0.5 l/ha de producto con un volumen de caldo de 150-400 l/ha.
	Post-emergencia	Juncia	0,5 l/ha	No Procede	Aplicar a una dosis de 0.5 l/ha de producto con un volumen de caldo de 150-400 l/ha.



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases



250 cc
1 L
5 L

Herbicida

Estaca®

ESTACA WG® es un herbicida de post-emergencia, con efecto remanente, para cereales de invierno que contiene diflufenican, florasulam y iodosulfuron. La combinación de las tres materias activas con modos de acción diferentes produce un incremento del espectro de actividad en comparación con las sustancias activas por separado.

Número de registro
ES-00472

Formulación
Diflufenican 40% + Florasulam 2% + Iodosulfuron 5% (WG)

Materia activa
Diflufenican + florasulam + Iodosulfuron

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Época	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Cebada	Post-emergencia	Gramíneas	0,15-0,2 Kg/ha	2 días	Volumen de caldo 200-400l/ha. Momento de aplicación: Desde 3 hojas desplegadas hasta el fin del macollamiento (BBCH 13-29)
	Post-emergencia	Malas hierbas de hoja ancha	0,15-0,2 Kg/ha	2 días	Volumen de caldo 200-400l/ha. Momento de aplicación: Desde 3 hojas desplegadas hasta el fin del macollamiento (BBCH 13-29)
Centeno	Post-emergencia	Gramíneas	0,15-0,2 Kg/ha	2 días	Volumen de caldo 200-400l/ha. Momento de aplicación: Desde 3 hojas desplegadas hasta el fin del macollamiento (BBCH 13-29)
	Post-emergencia	Malas hierbas de hoja ancha	0,15-0,2 Kg/ha	2 días	Volumen de caldo 200-400l/ha. Momento de aplicación: Desde 3 hojas desplegadas hasta el fin del macollamiento (BBCH 13-29)
Cereales	Post-emergencia	Gramíneas	0,15-0,2 Kg/ha	2 días	Cereales de invierno (trigo blando y duro, cebada, triticale y centeno) Momento de aplicación: Desde 3 hojas desplegadas hasta el fin del macollamiento (BBCH 13-29) Volumen de caldo 200-400l/ha.
	Post-emergencia	Malas hierbas de hoja ancha	0,15-0,2 Kg/ha	2 días	Cereales de invierno (trigo blando y duro, cebada, triticale y centeno) Volumen de caldo 200-400l/ha. Momento de aplicación: Desde 3 hojas desplegadas hasta el fin del macollamiento (BBCH 13-29)
Trigo blando	Post-emergencia	Gramíneas	0,15-0,2 Kg/ha	2 días	Volumen de caldo 200-400l/ha. Momento de aplicación: Desde 3 hojas desplegadas hasta el fin del macollamiento (BBCH 13-29)
	Post-emergencia	Malas hierbas de hoja ancha	0,15-0,2 Kg/ha	2 días	Volumen de caldo 200-400l/ha. Momento de aplicación: Desde 3 hojas desplegadas hasta el fin del macollamiento (BBCH 13-29)
Trigo duro	Post-emergencia	Gramíneas	0,15-0,2 Kg/ha	2 días	Volumen de caldo 200-400l/ha. Momento de aplicación: Desde 3 hojas desplegadas hasta el fin del macollamiento (BBCH 13-29)
	Post-emergencia	Malas hierbas de hoja ancha	0,15-0,2 Kg/ha	2 días	Volumen de caldo 200-400l/ha. Momento de aplicación: Desde 3 hojas desplegadas hasta el fin del macollamiento (BBCH 13-29)
Triticale	Post-emergencia	Gramíneas	0,15-0,2 Kg/ha	2 días	Volumen de caldo 200-400l/ha. Momento de aplicación: Desde 3 hojas desplegadas hasta el fin del macollamiento (BBCH 13-29)
	Post-emergencia	Malas hierbas de hoja ancha	0,15-0,2 Kg/ha	2 días	Volumen de caldo 200-400l/ha. Momento de aplicación: Desde 3 hojas desplegadas hasta el fin del macollamiento (BBCH 13-29)

Envases



1Kg

Herbicida

Mohican 50 SC®

MOHICAN 50 SC® es un herbicida en forma de suspensión concentrada para el control de malas hierbas dicotiledóneas anuales en pre-emergencia. Su sustancia activa, diflufenican, actúa inhibiendo la producción de carotenoides en el interior de las células de la planta dando lugar al blanqueamiento y destrucción de las células.

Número de registro
24085

Formulación
Diflufenican 50% (SC)

Materia activa
Diflufenican

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Época	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Almendro	Pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malas hierbas	Dicotiledóneas	500-700 ml/ha	No Procede	Volumen de caldo 200-600l/ha.Aplicar sin mojar las partes verdes del cultivo. Nosuperar la dosis de 0,7l/ha
Caqui	Cualquier época	Dicotiledóneas	350-700 ml/ha	No Procede	Volumen de caldo 200-600l/ha.Aplicar sin mojar las partes verdes del cultivo. Nosuperar la dosis de 0,7l/ha
Cebada	Pre-emergencia	Dicotiledóneas	0,15-0,25 l/ha	No Procede	Aplicar hasta el final del ahijado (macollamiento). Volumen del caldo 300-600l/ha
Centeno	Pre-emergencia	Dicotiledóneas	0,15-0,25 l/ha	No Procede	Aplicar hasta el final del ahijado (macollamiento). Volumen del caldo 300-600l/ha
Cítricos	Pre-emergencia	Dicotiledóneas	0,5-0,7 l/ha	No Procede	Volumen del caldo 200-600l/ha
Frutales de hueso	Pre-emergencia	Dicotiledóneas	0,5-0,7 l/ha	No Procede	Volumen del caldo 200-600l/ha
Frutales de pepita	Pre-emergencia	Dicotiledóneas	0,5-0,7 l/ha	No Procede	Volumen del caldo 200-600l/ha
Olivo	Pre-emergencia	Dicotiledóneas	0,3-0,75 l/ha	21	Aceituna para la producción de aceite. Volumen del caldo 200-600l/ha. En olivo de almazara no aplicar si hay aceituna caída. Después de la aplicación y cuando el suelo esté seco, se podrá tirar la aceituna para posterior recolección
Olivo de verdeo	Pre-emergencia	Dicotiledóneas	0,3-0,75 l/ha	21	Volumen del caldo 200-600l/ha. En olivo de almazara no aplicar si hay aceituna caída. Después de la aplicación y cuando el suelo esté seco, se podrá tirar la aceituna para posterior recolección.
Trigo	Pre-emergencia	Dicotiledóneas	0,15-0,25 l/ha	No Procede	Aplicar hasta el final del ahijado (macollamiento). Volumen del caldo 300-600l/ha
Triticale	Pre-emergencia	Dicotiledóneas	0,15-0,25 l/ha	No Procede	Aplicar hasta el final del ahijado (macollamiento). Volumen del caldo 300-600l/ha
Vid	Pre-emergencia	Dicotiledóneas	0,5-0,6 l/ha	No Procede	Aplicar únicamente durante el periodo de parada vegetativa o letargo. Volumen del caldo 200-600l/ha

Envases



Herbicida

Polapec 80®

Es un herbicida de aplicación en pre o post-emergencia temprana en trigo y cebada de invierno. Está formulado a base de prosulfocarb, que es absorbido por la raíces, hojas y semillas cuando éstas germinan y se trasloca a las zonas meristemáticas.

Número de registro
ES-00293

Formulación
Prosulfocarb 80%

Materia activa
Prosulfocarb

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Mala Hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Cebada De Invierno	Malas Hierbas Anuales	4-5 l/ha	No Procede	Aplicar en pre-emergencia de las malas hierbas o cuando éstas tienen menos de 2 hojas y cuando el cultivo tiene un máximo de 2 hojas (BBCH 12). En aplicaciones en post-emergencia temprana, utilizar una dosis máxima de 4 l/ha
Trigo De Invierno	Malas Hierbas Anuales	4-5 l/ha	No Procede	Aplicar en pre-emergencia de las malas hierbas o cuando éstas tienen menos de 2 hojas y cuando el cultivo tiene un máximo de 2 hojas (BBCH 12). En aplicaciones en post-emergencia temprana, utilizar una dosis máxima de 4 l/ha



Envases





Register 25 WG®

REGISTER 25 WG® es un herbicida residual y de contacto para el control de un amplio rango de malas hierbas tanto gramíneas (anuales y perennes) como dicotiledóneas y ciperáceas en cítricos olivo, viña y áreas no cultivadas.

REGISTER 25 WG® es rápidamente absorbido por las raíces y las hojas, siendo traslocado vía floema y xilema.

Flazasulfuron es una sulfonilurea, familia química incluida en el grupo B de HRAC.

Número de registro
ES-00401

Formulación
Flazasulfuron 25%
(WG)

Materia activa
Flazasulfuron

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Caminos	Dicotiledóneas	60-200 g/Ha	No Procede	Nº Tratamientos: 1 (*) Redes de servicios: Áreas no urbanas, comprendidos caminos y redes viarias, tendidos eléctricos, cortafuegos u otras, de dominio público o privado, cuya característica es consistir en espacios lineales o redes de espacios lineales, particularmente para mantener controlada la vegetación espontánea.
	Gramíneas	60-200 g/Ha	No Procede	Nº Tratamientos: 1 (*) Redes de servicios: Áreas no urbanas, comprendidos caminos y redes viarias, tendidos eléctricos, cortafuegos u otras, de dominio público o privado, cuya característica es consistir en espacios lineales o redes de espacios lineales, particularmente para mantener controlada la vegetación espontánea.
	Cyperus spp	60-200 g/Ha	No Procede	Nº Tratamientos: 1 (*) Redes de servicios: Áreas no urbanas, comprendidos caminos y redes viarias, tendidos eléctricos, cortafuegos u otras, de dominio público o privado, cuya característica es consistir en espacios lineales o redes de espacios lineales, particularmente para mantener controlada la vegetación espontánea.
Cítricos	Dicotiledóneas	60-200 g/Ha	No Procede	Aplicación en primavera. Nº Tratamientos: 1. Localizar el producto debajo de las filas, tratando como máximo 1/3 de la superficie a tratar, equivalente a 66.6 g de REGISTER 25 WG por hectárea (0,017 kg s.a./ha).
	Gramíneas	60-200 g/Ha	No Procede	Aplicación en primavera. Nº Tratamientos: 1. Localizar el producto debajo de las filas, tratando como máximo 1/3 de la superficie a tratar, equivalente a 66.6 g de REGISTER 25 WG por hectárea (0,017 kg s.a./ha).
	Cyperus spp	60-200 g/Ha	No Procede	Aplicación en primavera. Nº Tratamientos: 1. Localizar el producto debajo de las filas, tratando como máximo 1/3 de la superficie a tratar, equivalente a 66.6 g de REGISTER 25 WG por hectárea (0,017 kg s.a./ha).
Olivo	Dicotiledóneas	60-100 g/Ha (otoño) / 60-200 g/Ha (primavera)	45 días en otoño / No Procede en Primavera	Aplicación en otoño o primavera. Nº Tratamientos: 1. Localizar el producto debajo de las filas, tratando como máximo 1/3 de la superficie a tratar, equivalente a 66.6 g de REGISTER 25 WG por hectárea (0,017 kg s.a./ha). Utilice un volumen de aplicación de 250-400 L/ha para aplicaciones con tractor y de 600 L/ha para aplicaciones manuales.
	Gramíneas	60-100 g/Ha (otoño) / 60-200 g/Ha (primavera)	45 días en otoño / No Procede en Primavera	Aplicación en otoño o primavera. Nº Tratamientos: 1. Localizar el producto debajo de las filas, tratando como máximo 1/3 de la superficie a tratar, equivalente a 66.6 g de REGISTER 25 WG por hectárea (0,017 kg s.a./ha). Utilice un volumen de aplicación de 250-400 L/ha para aplicaciones con tractor y de 600 L/ha para aplicaciones manuales.
	Cyperus spp	60-100 g/Ha (otoño) / 60-200 g/Ha (primavera)	45 días en otoño / No Procede en Primavera	Aplicación en otoño o primavera. Nº Tratamientos: 1. Localizar el producto debajo de las filas, tratando como máximo 1/3 de la superficie a tratar, equivalente a 66.6 g de REGISTER 25 WG por hectárea (0,017 kg s.a./ha). Utilice un volumen de aplicación de 250-400 L/ha para aplicaciones con tractor y de 600 L/ha para aplicaciones manuales.

Cultivo	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Recintos industriales	Gramíneas	60-200 g/Ha	No Procede	Nº Tratamientos: 1 (*) Zonas industriales: Áreas de acceso restringido, de dominio público o privado, tales como centrales eléctricas, instalaciones industriales u otras en las que, principalmente, se requiere mantener el terreno sin vegetación.
	Dicotiledóneas	60-200 g/Ha	No Procede	Nº Tratamientos: 1 (*) Zonas industriales: Áreas de acceso restringido, de dominio público o privado, tales como centrales eléctricas, instalaciones industriales u otras en las que, principalmente, se requiere mantener el terreno sin vegetación.
	Cyperus spp	60-200 g/Ha	No Procede	Nº Tratamientos: 1 (*) Zonas industriales: Áreas de acceso restringido, de dominio público o privado, tales como centrales eléctricas, instalaciones industriales u otras en las que, principalmente, se requiere mantener el terreno sin vegetación.
Vid	Gramíneas	60-200 g/Ha	No Procede	Aplicación en invierno-primavera. Nº Tratamientos: 1. Localizar el producto debajo de las filas, tratando como máximo 1/3 de la superficie a tratar, equivalente a 66.6 g de REGISTER 25 WG por hectárea (0,017 kg s.a./ha).
	Dicotiledóneas	60-200 g/Ha	No Procede	Aplicación en invierno-primavera. Nº Tratamientos: 1. Localizar el producto debajo de las filas, tratando como máximo 1/3 de la superficie a tratar, equivalente a 66.6 g de REGISTER 25 WG por hectárea (0,017 kg s.a./ha).
	Cyperus spp	60-200 g/Ha	No Procede	Aplicación en invierno-primavera. Nº Tratamientos: 1. Localizar el producto debajo de las filas, tratando como máximo 1/3 de la superficie a tratar, equivalente a 66.6 g de REGISTER 25 WG por hectárea (0,017 kg s.a./ha).



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases



500 g
100 g

Herbicida



Orbiter® es un herbicida postemergente contra dicotiledóneas.

Número de registro
ES-01154

Formulación
Florasulan 5%
(SC)

Materia activa
Florasulan

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Vol. Caldo	Observaciones
Cebada	Malas hierbas de hoja ancha	0,08 - 0,15 l/ha	1	200 - 400 l/ha	Aplicar entre BBCH 13-39. Para cebada de invierno aplicar una dosis máxima de 0,08 l/ha en aplicaciones en otoño y 0,15 l/ha en aplicaciones en primavera. Para cebada de primavera aplicar una dosis de 0,15 l/ha. BBCH 13-39
Trigo	Malas hierbas de hoja ancha	0,08 - 0,15 l/ha	1	200 - 400 l/ha	Tanto para trigo duro como blando. Aplicar entre BBCH 13-32. Para trigo de invierno aplicar una dosis máxima de 0,08 l/ha en aplicaciones en otoño y 0,15 l/ha en aplicaciones en primavera. Para trigo de primavera aplicar una dosis de 0,15 l/ha. BBCH 13-32
Triticale	Malas hierbas de hoja ancha	0,08 - 0,15 l/ha	1	200 - 400 l/ha	Aplicar entre BBCH 13-32. Dosis máxima de 0,08 l/ha en aplicaciones de otoño y 0,15 l/ha en aplicaciones de primavera. BBCH 13-32



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases

1L
5L

Herbicida



Herbicida sistémico a base de flufenacet y diflufenican para el control de malas hierbas en cereales en post-emergencia temprana del cultivo. Flufenacet pertenece al grupo de las oxiacetamidas y actúa como un inhibidor de la división celular (grupo HRAC 15). Diflufenican pertenece al grupo de las piridinecarboxamidas (grupo HRAC 12) y actúa bloqueando la biosíntesis de carotenoides mediante inhibición de la fitoene desaturasa.

Número de registro
ES-00293

Formulación
Flufenacet 40%,
Diflufenican 20%

Materia activa
Flufenacet
Diflufenican

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Mala Hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Trigo (incluye espelta)	Malas hierbas dicotiledóneas y monocotiledóneas.	0,6 l/ha	No Procede	Aplicar en pulverización normal al suelo uniformemente sobre toda la superficie, en post-emergencia temprana del cultivo (BBCH 10-13) con las malas hierbas en post-emergencia temprana, utilizando un volumen de caldo de 200-400 l/ha. El suelo debe estar suficientemente húmedo para que se active el herbicida y la eficacia del producto sea óptima.
Cebada	Malas hierbas dicotiledóneas y monocotiledóneas.	0,6 l/ha	No Procede	Aplicar en pulverización normal al suelo uniformemente sobre toda la superficie, en post-emergencia temprana del cultivo (BBCH 10-13) con las malas hierbas en post-emergencia temprana, utilizando un volumen de caldo de 200-400 l/ha. El suelo debe estar suficientemente húmedo para que se active el herbicida y la eficacia del producto sea óptima.
Centeno	Malas hierbas dicotiledóneas y monocotiledóneas.	0,6 l/ha	No Procede	Aplicar en pulverización normal al suelo uniformemente sobre toda la superficie, en post-emergencia temprana del cultivo (BBCH 10-13) con las malas hierbas en post-emergencia temprana, utilizando un volumen de caldo de 200-400 l/ha. El suelo debe estar suficientemente húmedo para que se active el herbicida y la eficacia del producto sea óptima.
Triticale	Malas hierbas dicotiledóneas y monocotiledóneas.	0,6 l/ha	No Procede	Aplicar en pulverización normal al suelo uniformemente sobre toda la superficie, en post-emergencia temprana del cultivo (BBCH 10-13) con las malas hierbas en post-emergencia temprana, utilizando un volumen de caldo de 200-400 l/ha. El suelo debe estar suficientemente húmedo para que se active el herbicida y la eficacia del producto sea óptima.



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases

5L

Herbicida

STONIC®

STONIC® es un herbicida que contiene clomazona. La Clomazona interfiere con el desarrollo de los cloroplastos y reduce o previene la acumulación de pigmentos plastídicos en las especies susceptibles. El tratamiento con clomazona produce blanqueamiento (de apariencia blanco, amarillo o verde pálido) en las plántulas, dependiendo de las especies y/o método y dosis de tratamiento. Clomazona inhibe la formación de isoprenoides del cloroplasto que incluye los pigmentos fotosintéticos (phytol cadena lateral de la clorofila) carotenoides, transportadores de electrones (plastoquinona), tocoferol y hormonas (giberelinas) en plantas superiores. Es absorbida por las raíces y meristemos apicales con traslocación acrópeta.

STONIC® se utiliza en el control de mono y dicotiledóneas anuales y se puede aplicar en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malas hierbas y especies de cultivo tolerantes.

Número de registro
ES-01154

Formulación
Florasulan 5%
(SC)

Materia activa
Florasulan

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Vol. Caldo	Observaciones
Arroz	Malas hierbas anuales	0,5 - 0,7 l/ha	1	200 - 400 l/ha	Aplicar en post-emergencia (en agua), entre BBCH 11-12.
Colza	Malas hierbas anuales	0,33 l/ha	1	200 - 400 l/ha	Aplicar en pre-emergencia, máximo 5 días después de la siembra.
Patata	Malas hierbas anuales	0,25 - 0,3 l/ha	1	200 - 400 l/ha	Aplicar en pre-emergencia, máximo 7 días antes de la emergencia. Reducir la dosis a 0,2 l/ha en el caso de terrenos ligeros y sin materia orgánica y en las variedades precoces Agata y Seglinde.

Envases



5L



Insecticidas

Insecticida

Aikido®

AIKIDO® es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión en diversas plantaciones y cultivos. Se presenta en forma de suspensión microencapsulada, confiriendo mayor seguridad al aplicador y una alta persistencia.

Número de registro
25640

Formulación
Lambda-cihalotrin
10% (CS)

Materia activa
Lambda-cihalotrin

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Avena	Pulgon	0,075 l/ha	28	
Brécol	Gusanos grises	0,075-0,2%	7	Dosis máxima 0,2l/ha
	Mosca blanca	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,2l/ha
	Orugas	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,2l/ha
Cebada	Pulgon	0,075 l/ha	28	
Coliflor	Gusanos grises	0,075-0,2%	7	Dosis máxima 0,2l/ha
	Mosca blanca	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,2l/ha
	Orugas	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,2l/ha
Colirábano	Orugas	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,2l/ha.Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días.
	Gusanos grises	0,075-0,2%	7	Dosis máxima 0,2l/ha.Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días.
	Mosca blanca	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,2l/ha.Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días.
Judías para grano	Mosca blanca	0,015-0,02%	7	Dosis máxima 0,2l/ha
Judías verdes	Mosca blanca	0,015%	7	Dosis máxima 0,15l/ha
Lechuga	Pulgon	0,0075%	7	Sólo aire libre.Máximo 1 aplicación. Dosis máxima 0,75l/ha
Maíz	Taladro	0,0075-0,02%	60	Dosis máxima 0,2l/ha
	Gusanos grises	0,075-0,2 l/ha	60	Dosis máxima 0,2l/ha
	Delfacidos	0,125-0,2 l/ha	60	Dosis máxima 0,2l/ha

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Maíz	Cicadelidos	0,125-0,2 l/ha	60	Dosis máxima 0,2l/ha
	Pulgon	0,125-0,2 l/ha	60	Dosis máxima 0,2l/ha
Manzano	Carpocapsa	0,0075-0,0125%	7	Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Pulgon	0,0075-0,0125%	7	Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Mosca de la fruta	0,0075-0,0125%	7	Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Philaneus spumarius	0,0075-0,0125%	7	Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
Olivo	Prays	0,0075%	No Procede	Iniciar el tratamiento antes de la apertura de las flores. Dosis máxima 0,075l/ha
	Philaneus spumarius	0,075 l/ha	No Procede	Contra Philaenus Spumarius
Patata	Escarabajo	0,0075-0,02%	14	Dosis máxima 0,2l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Gusanos grises	0,075-0,2 l/ha	14	Dosis máxima 0,2l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
Peral	Carpocapsa	0,0075-0,015%	7	Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Pulgon	0,0125%	7	Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Mosca de la fruta	0,0075-0,015%	7	Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Psila	0,0075-0,015%	7	Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Philaneus spumarius	0,0075-0,015%	7	Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
Pimiento	Mosca blanca	0,015-0,02%	3	Dosis máxima 0,2l/ha
Remolacha Azucarera	Pulgon	0,015%	7	Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
Tomate	Orugas	0,0075-0,025% (0,0075-0,015% en parral o espaldera)	3	Solo aire libre. Realizar 2 aplicaciones separadas al menos 10 días. Dosis máxima 0,25l/ha (0,15 l/ha en parral o espaldera)
	Gusanos grises	0,075-0,2 l/ha	3	Efectuar un tratamiento generalizado al suelo a la aparición de la plaga. Dosis máxima 0,25l/ha.
	Mosca blanca	0,0075-0,025% (0,0075-0,015% en parral o espaldera)	3	Solo aire libre. Realizar 2 aplicaciones separadas al menos 10 días. Dosis máxima 0,25l/ha (0,15 l/ha en parral o espaldera)
Trigo	Pulgon	0,075 l/ha	28	

Envases



250 cc
1 L
5 L

Insecticida

Delta EC®

DELTA EC® es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, con amplio espectro de actividad contra los insectos nocivos. Dotado de una rápida acción inicial permite una protección de las plantas suficientemente duradera con una gran seguridad de uso.

Número de registro
25706

Formulación
Deltametrina 2,5% (EC)

Materia activa
Deltametrina

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Adormidera	Pulgones	0,2 l/ha	45	Realizar 4 tratamientos en total, mediante pulverización foliar, con un intervalo de 14 días entre las aplicaciones, a una dosis de 0,2 l/ha, con un volumen de caldo de 500 l/ha.
	Orugas defoliadoras	0,2 l/ha	45	Realizar 4 tratamientos en total, mediante pulverización foliar, con un intervalo de 14 días entre las aplicaciones, a una dosis de 0,2 l/ha, con un volumen de caldo de 500 l/ha.
Albaricoquero	Pulgones	0,03-0,06%	3	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Almendro	Barrenillo	0,5 l/ha	3	Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.
	Pulgones	0,5 l/ha	3	Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.
	Orugas defoliadoras	0,5 l/ha	3	Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.
	Tigre	0,5 l/ha	3	Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.
	Anarsia	0,5 l/ha	3	Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.
	Empoasca	0,5 l/ha	3	Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.
	Orugueta (aglaope infausta)	0,5 l/ha	3	Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.
Avellano	Pulgones	0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.
Brassica	Orugas	0,03-0,05%	7	Brócoli, Coliflor, Coles de Bruselas, coles acogolladas y otras coles, excepto col china, berza y colirrábano Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
Calabacín	Orugas	0,3-0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.
	Pulgones	0,3-0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.
Cereales	Polilla	0,3-0,5 l/ha	30	Número máximo de aplicaciones 1.
	Pulgones	0,3-0,5 l/ha	30	Número máximo de aplicaciones 1.
Cerezo	Pulgones	0,03-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Ciruelo	Pulgones	0,03-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Frutales de pepita	Pulgones	0,03-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3 Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Frutales de pepita	Psila	0,03-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
	Carpocapsa	0,03-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
	Philaneus spumarius	0,03-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3 Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Lechuga y similares	Pulgones	0,03-0,05%	14	Excepto escarola. Número máximo de aplicaciones 3, Intervalo mínimo entre aplicaciones 7 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
	Orugas	0,03-0,05%	14	Excepto escarola. Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 7 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
Maíz	Orugas	0,3-0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.
	Diabrotica	0,3-0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.
Melocotonero	Pulgones	0,03-0,06%	3	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Nectarino	Pulgones	0,03-0,06%	3	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Olivo	Mosca	0,04-0,06%	7	Bractocera oleae. Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones: 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
	Prays	0,04-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
	Barrenillo	0,04-0,06%	7	Phloeotribus scarabaeoides. Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
	Philaneus spumarius	0,04-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Ornamentales herbáceas	Pulgones	0,5 l/ha	No procede	Número máximo de aplicaciones 1.
	Philaneus spumarius	0,5 l/ha	No Procede	Número máximo de aplicaciones 1.
Ornamentales leñosas	Pulgones	0,5 l/ha	No procede	Número máximo de aplicaciones 1.
Patata	Orugas	0,03-0,05%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
	Escarabajo	0,03-0,05%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
	Pulgones	0,03-0,05%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
Tomate	Pulgones	0,03-0,05%	3	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
	Orugas	0,03-0,05%	3	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
Vid	Polilla	0,4-0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.
	Cicadelidos	0,4-0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.
	Philaneus spumarius	0,4-0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.

Envases

106

ASCENZA

Catálogo de productos

107

Insecticida

Doctrin®

DOCTRIN® es un insecticida selectivo contra lepidópteros en una amplia variedad de cultivos.

Número de registro
22423

Formulación
Bacillus thuringiensis
var. kurstaki (cepa
PB-54) 32% (WG)

Materia activa
Bacillus thuringiensis
var. kurstaki

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Alcachofa	Heliotis	0,5-1 kg/ha	No Procede	3 tratamientos máximo.
	Plusia	0,5-1 kg/ha	No Procede	3 tratamientos máximo.
	Spodoptera Spp	0,5-1 kg/ha	No Procede	3 tratamientos máximo.
Algodonero	Helicoverpa Armígera	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.
	Plusia	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.
	Spodoptera Spp	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.
Arandano	Heliotis	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.
	Plusia	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.
	Spodoptera Spp	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.
Cítricos	Cacoecia Rosana	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.
	Prays Citris	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.
Cucurbitáceas De Piel Comestible	Heliotis	0,5-1 kg/ha	No Procede	3 tratamientos máximo.
	Plusia	0,5-1 kg/ha	No Procede	3 tratamientos máximo.
	Spodoptera Spp	0,5-1 kg/ha	No Procede	3 tratamientos máximo.
Espinaca	Heliotis	0,5-1 kg/ha	No Procede	(Espinaca y similar) 3 tratamientos máximo.
	Plusia	0,5-1 kg/ha	No Procede	(Espinaca y similar) 3 tratamientos máximo.
	Spodoptera Spp	0,5-1 kg/ha	No Procede	(Espinaca y similar) 3 tratamientos máximo.
Frambueso	Heliotis	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.
	Plusia	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.
	Spodoptera Spp	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Fresales	Heliotis	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso al aire libre y en invernadero 2 tratamientos máximo.
	Plusia	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso al aire libre y en invernadero 2 tratamientos máximo.
	Spodoptera Spp	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso al aire libre y en invernadero 2 tratamientos máximo.
Frutales De Hueso	Archips Rosanus	0,5-1 kg/ha	No Procede	Arañuelo, Oruga librea, Viejecita, Orugas, Cydia, Anarsia 2 tratamientos máximo.
	Arnasia Lineatella	0,5-1 kg/ha	No Procede	Arañuelo, Oruga librea, Viejecita, Orugas, Cydia, Anarsia 2 tratamientos máximo.
	Cydia Molesta	0,5-1 kg/ha	No Procede	Arañuelo, Oruga librea, Viejecita, Orugas, Cydia, Anarsia 2 tratamientos máximo.
	Malacosoma Neustria	0,5-1 kg/ha	No Procede	Arañuelo, Oruga librea, Viejecita, Orugas, Cydia, Anarsia 2 tratamientos máximo.
	Orgya Spp	0,5-1 kg/ha	No Procede	Arañuelo, Oruga librea, Viejecita, Orugas, Cydia, Anarsia 2 tratamientos máximo.
Frutales De Pepita	Archips Podanus	0,5-1 kg/ha	No Procede	Cydia Pomonella, Viejecita, Orugas arrolladoras, Arañuelo, Oruga librea 2 tratamientos máximo.
	Archips Rosanus	0,5-1 kg/ha	No Procede	Cydia Pomonella, Viejecita, Orugas arrolladoras, Arañuelo, Oruga librea 2 tratamientos máximo.
	Malacosoma Neustria	0,5-1 kg/ha	No Procede	Cydia Pomonella, Viejecita, Orugas arrolladoras, Arañuelo, Oruga librea 2 tratamientos máximo.
	Orgya Spp	0,5-1 kg/ha	No Procede	Cydia Pomonella, Viejecita, Orugas arrolladoras, Arañuelo, Oruga librea 2 tratamientos máximo.
Frutos Secos	Archips Podanus	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso en almendro, avellano, nogal y otros. Orugas arrolladoras, Orugueta, Anarsia 2 tratamientos máximo
	Archips Rosanus	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso en almendro, avellano, nogal y otros. Orugas arrolladoras, Orugueta, Anarsia 2 tratamientos máximo
	Arnasia Lineatella	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso en almendro, avellano, nogal y otros. Orugas arrolladoras, Orugueta, Anarsia 2 tratamientos máximo
Hortalizas Del Género Brassica	Pieris Brassicae	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso en inflorescencias. 3 tratamientos máximo Pieris sp, Plutella, Plusia, Spodoptera spp, Heliotis.
	Plutella Xylostella	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso en inflorescencias. 3 tratamientos máximo Pieris sp, Plutella, Plusia, Spodoptera spp, Heliotis.
Kiwi	Argyrotaenia Pluchellana	0,5-1 kg/ha	No Procede	Polilla de la vid 2 tratamientos máximo.
Lechuga Y Similares	Heliotis	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso en lechuga y otras ensaladas incluida Brassicacea. 3 tratamientos máximo.
	Plusia	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso en lechuga y otras ensaladas incluida Brassicacea. 3 tratamientos máximo.
	Spodoptera Spp	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso en lechuga y otras ensaladas incluida Brassicacea. 3 tratamientos máximo.
Olivo	Prays Oleae	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.
Pimiento	Heliotis	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso al aire libre y en invernadero 3 tratamientos máximo.
	Plusia	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso al aire libre y en invernadero 3 tratamientos máximo.
	Spodoptera Spp	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso al aire libre y en invernadero 3 tratamientos máximo.

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Platanera	Orugas	0,5-1 kg/ha	No Procede	3 tratamientos máximo.
Tomate	Heliotis	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso al aire libre y en invernadero. 3 tratamientos máximo.
	Plusia	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso al aire libre y en invernadero 3 tratamientos máximo.
	Spodoptera Spp	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso al aire libre y en invernadero 3 tratamientos máximo.
	Tuta Absoluta	0,5-1 kg/ha	No Procede	Uso al aire libre y en invernadero 3 tratamientos máximo.
Vid	Eupoecilia Ambigua	0,5-1 kg/ha	No Procede	3 tratamientos máximo.
	Lobesia Botrana	0,5-1 kg/ha	No Procede	3 tratamientos máximo.
Zarzamora	Heliotis	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.
	Plusia	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.
	Spodoptera Spp	0,5-1 kg/ha	No Procede	2 tratamientos máximo.

Envases



Insecticida

|||||

Expedient 10 EC®

EXPEDIENT 10 EC® es un insecticida regulador del crecimiento de los insectos, con actividad por ingestión y contacto. Actúa sobre el desarrollo de los insectos, inhibiendo sus procesos evolutivos naturales, como: metamorfosis, embriogénesis y reproducción, causando la eliminación de la plaga. Posee elevada persistencia lo que aumenta la posibilidad de que el insecto entre en contacto con el producto y sea ingerido por éste.

Número de registro
24252

Formulación
Piriproxifen 10%
(EC)

Materia activa
Piriproxifen

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Almendro	Piojo de San José	0,04-0,05%	No Procede	Efectuar un solo tratamiento en prefloración con un volumen de caldo de 700-1000 l/ha, sin sobrepasar los 0,5 l de producto/ha.
Caqui	Caparreta	0,04-0,05%	No Procede	Efectuar un solo tratamiento en prefloración con un volumen de caldo de 700-1000 l/ha, sin sobrepasar los 0,5 l de producto/ha.
	Cochinilla	0,04-0,05%	No Procede	Incluye cochinilla blanda y cochinilla diaspina. Efectuar un solo tratamiento en prefloración con un volumen de caldo de 700-1000 l/ha, sin sobrepasar los 1,25 l de producto/ha.
Cítricos	Caparreta	0,05-0,075%	30	Efectuar un solo tratamiento por campaña, coincidiendo con el máximo de formas sensibles, a una dosis de 0,05-0,075%, con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha, sin sobrepasar los 1,25 l de producto/ha.
	Piojo gris	0,05-0,075%	30	Efectuar un solo tratamiento por campaña, coincidiendo con el máximo de formas sensibles, a una dosis de 0,05-0,075%, con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha, sin sobrepasar los 1,25 l de producto/ha.
	Piojo rojo	0,05-0,075%	30	Efectuar un solo tratamiento por campaña, coincidiendo con el máximo de formas sensibles, a una dosis de 0,05-0,075%, con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha, sin sobrepasar los 1,25 l de producto/ha.
	Serpeta	0,05-0,075%	30	Efectuar un solo tratamiento por campaña, coincidiendo con el máximo de formas sensibles, a una dosis de 0,05-0,075%, con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha, sin sobrepasar los 1,25 l de producto/ha.
	Piojo blanco	0,05-0,075%	30	Efectuar un solo tratamiento por campaña, coincidiendo con el máximo de formas sensibles, a una dosis de 0,05-0,075%, con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha, sin sobrepasar los 1,25 l de producto/ha.
Frutales de hueso	Piojo de San José	0,04-0,05%	No procede	Efectuar un solo tratamiento en prefloración, a una dosis de 0,04-0,05%, con un volumen de caldo de 700-1000 l/ha, sin sobrepasar los 0,5 l de producto/ha.
Frutales de pepita	Piojo de San José	0,04-0,05%	No procede	Efectuar un solo tratamiento en prefloración, a una dosis de 0,04-0,05%, con un volumen de caldo de 700-1000 l/ha, sin sobrepasar los 0,5 l de producto/ha.
Granado	Caparreta	0,04-0,05%	No procede	Caparreta blanca (Ceroplastes sinensis). Efectuar un solo tratamiento en prefloración, a una dosis de 0,04-0,05%, con un volumen de caldo de 700-1000l/ha, sin sobrepasar los 0,5 l de producto/ha.
Tomate de invernadero	Mosca blanca	0,05-0,075%	3	Efectuar hasta dos aplicaciones por campaña a la aparición de la plaga, con un intervalo entre tratamientos de 10 días, a una dosis de 0,05-0,075%, con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha, sin sobrepasar los 0,8l de producto/ha por aplicación.

Envases





|||||

Excentro® 0,5

EXCENTRO® 0,5 es un insecticida en forma de gránulos a base de teflutrin para su aplicación al suelo para el control de insectos del suelo. Teflutrin es un piretroide sintético con actividad por contacto, que actúa a bajas dosis sobre el sistema nervioso de los insectos.

Número de registro
ES-01191

Formulación
Teflutrin 0.5% GR
Granulado

Materia activa
Teflutrin

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)
Algodonero	Gusanos de Alambre	15 kg/ha	No Procede
Maíz	Gusanos de Alambre	15 kg/ha	No Procede
	Diabrotica	15 kg/ha	No Procede
Patata	Gusanos de Alambre	15 kg/ha	No procede
Remolacha Azucarera	Gusanos de Alambre	15 kg/ha	No procede
Tabaco	Gusanos de Alambre	15 kg/ha	No procede
Tomate de Industria	Gusanos de Alambre	15 kg/ha	No procede

Envases



20 Kg



|||||

Noscale®

NOSCALE® es un insecticida presentado en cápsula difusora de feromona para el control del piojo rojo de California (Aonidiella aurantii Maskell) en frutos cítricos mediante la técnica de confusión sexual mitigando los daños en los frutos al prevenir el incremento de las poblaciones de esta plaga. NOSCALE® consiste en un difusor mesoporoso de la feromona sexual del insecto en forma de comprimido cilíndrico en el interior de un dispositivo plástico que se cuelga en las ramas de los árboles mediante un gancho incorporado desde que comienzan a hincharse las yemas hasta que el fruto está maduro y apto para consumo.

Número de registro
ES-00169

Formulación
Rescalure 4%
[VP] P/V

Materia activa
Rescalure

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Cítricos	Piojo rojo de California	400 a 600 difusores/ Ha = 28-42 g/ha.	No procede	Abrir el envase de aluminio conteniendo los difusores mesoporosos solamente en el momento de su utilización. Cortar por la línea de pre-corte y separar cada uno de los dispositivos de plástico unitarios conteniendo las cápsulas difusoras NOSCALE®.
				Colgar manualmente mediante el gancho incorporado al dispositivo plástico un difusor por árbol a una altura de 1,5 metros, cuando se detecta el vuelo de la generación de la plaga objetivo mediante trampas de monitoreo. Instalar de 400 a 600 difusores por hectárea, equivalentes a una dosis de 28-42 g de sustancia activa ha.
				Almacenar la cápsula en su envase cerrado y precintado en un lugar fresco hasta su uso. La vida útil de los difusores mesoporosos se cifra en unos 150 días tras su primera colocación, finalizados los cuales deberán destruirse de acuerdo con la legislación vigente.

Envases



estuche con
120 uds.



|||||
Sondae®

SONDAE® es un potente nematicida que actúa por contacto e ingestión produciendo la parálisis y muerte de los organismos afectados. Tiene un efecto de inhibición de la eclosión así como de la alimentación y el movimiento, provocando finalmente la muerte.

Número de registro
ES-00131

Formulación
Oxamilo 10% (SL)

Materia activa
Oxamilo

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Berenjena de invernadero	Nemátodos	10l/ha. Máx. 30 l/ha	21	Aplicar mediante riego por goteo en siembra/trasplante a dosis de 10 L/ha por aplicación, pudiendo darse una primera aplicación a 20 L/ha. Con un máximo de 30 L/ha por campaña, con un intervalo entre aplicaciones de 20 días.
Cucurbitáceas de piel comestible en invernadero	Nemátodos	10l/ha. Máx. 30 l/ha	21	Aplicar mediante riego por goteo en siembra/trasplante a dosis de 10 L/ha por aplicación, pudiendo darse una primera aplicación a 20 L/ha. Con un máximo de 30 L/ha por campaña, con un intervalo entre aplicaciones de 20 días.
Pimiento de invernadero	Nemátodos	10l/ha. Máx. 30 l/ha	21	Aplicar mediante riego por goteo en siembra/trasplante a dosis de 10 L/ha por aplicación, pudiendo darse una primera aplicación a 20 L/ha. Con un máximo de 30 L/ha por campaña, con un intervalo entre aplicaciones de 20 días.
Platanera	Nemátodos	10l/ha. Máx. 30 l/ha	7	Sólo en invernadero. Realizar 3 aplicaciones en total, mediante riego por goteo, al inicio de la infestación, con un intervalo de 20 días entre las aplicaciones, a una dosis de 10 l/ha. No superar la dosis máxima por campaña de 30 l/ha.
Tomate de invernadero	Nemátodos	10l/ha. Máx. 30 l/ha	21	Aplicar mediante riego por goteo en siembra/trasplante a dosis de 10 L/ha por aplicación, pudiendo darse una primera aplicación a 20 L/ha. Con un máximo de 30 L/ha por campaña, con un intervalo entre aplicaciones de 20 días.

Envases



5 L



|||||
Rikolto®

RIKOLTO® es un insecticida sistémico a base de acetamiprid con acción translaminar y actividad por contacto e ingestión para su uso en colza, frutales de pepita y hueso. Acetamiprid es un insecticida neonicotinoide que actúa sobre el sistema nervioso del insecto causando parálisis.

Número de registro
ES-00876

Formulación
Acetamiprid 20%

Materia activa
Acetamiprid

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Colza	Meligethes Aeneus	0.2 kg/ha	42 días	Realizar una única aplicación en presencia de la plaga, antes del final de la floración (BBCH 69), utilizando un volumen de caldo de 400-600 l/ha.
Manzano	Pulgones	0.25 kg/ha	14 días	Excepto contra las especies E. lanigerum y A. spiraecola. Aplicar en presencia de la plaga antes del BBCH 59 y desde el BBCH 69, utilizando un volumen de caldo de 1000 l/ha. No aplicar durante la floración. Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días.
Melocotonero	Pulgones	0.25 kg/ha	14 días	Excepto contra las especies E. lanigerum y A. spiraecola. Aplicar en presencia de la plaga antes del BBCH 59 y desde el BBCH 69, utilizando un volumen de caldo de 1000 l/ha. No aplicar durante la floración. Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días.
Peral	Pulgones	0.25 kg/ha	14 días	Excepto contra las especies E. lanigerum y A. spiraecola. Aplicar en presencia de la plaga antes del BBCH 59 y desde el BBCH 69, utilizando un volumen de caldo de 1000 l/ha. No aplicar durante la floración. Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días.

Envases



100 gr

Insecticida

Superblock®

SUPERBLOCK® es un acaricida e insecticida de amplio espectro que se aplica mediante pulverización. El producto actúa principalmente mediante asfixia, cubriendo el cuerpo de los insectos con una capa fina impermeable de gas que bloquea los canales traqueales, impidiendo su respiración y provocando su muerte.

Número de registro

ES-00079

Formulación

Aceite de Parafina 80% (EC)

Materia activa

Piriproxifen

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Almendro	Acaros	10-20 L/ha	20	Uso menor. Realizar entre 2 y 4 aplicaciones con intervalo de 7 días entre ellas. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5 - 2,5 l/hl. Eficaz frente a P.ulmi.
	Cochinilla	10-20 L/ha	20	Uso menor. Realizar entre 2 y 4 aplicaciones con intervalo de 7 días entre ellas. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5 - 2,5 l/hl. Eficaz frente a P.ulmi.
	Eriofidos	10-20 L/ha	20	Uso menor. Realizar entre 2 y 4 aplicaciones con intervalo de 7 días entre ellas. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5 - 2,5 l/hl. Eficaz frente a P.ulmi.
Caqui	Cochinilla	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente a Cercoplastes spp.
Citricos	Acaros	20-30 L/ha	20	Pulverización foliar en presencia de plaga.
	Cochinilla	20-30 L/ha	20	Pulverización foliar en presencia de plaga.
	Eriofidos	20-30 L/ha	20	Pulverización foliar en presencia de plaga.
Frutales De Hueso	Acaros	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Melocotonero,nectario, albaricoquero, cerezo, ciruelo. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente a P.ulmi
	Cochinilla	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Melocotonero,nectario, albaricoquero, cerezo, ciruelo. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente a P.ulmi
	Eriofidos	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Melocotonero,nectario, albaricoquero, cerezo, ciruelo. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente a P.ulmi
	Piojo De San Jose	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Melocotonero,nectario, albaricoquero, cerezo, ciruelo. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente a P.ulmi

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Frutales De Pepita	Acaros	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Manzano y peral. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente a P.ulmi
	Eriofidos	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Manzano y peral. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente a P.ulmi
	Piojo De San Jose	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Manzano y peral. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente a P.ulmi
	Psila	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Manzano y peral. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente a P.ulmi
	Pulgones	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Manzano y peral. (Pulgón lanigero) Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente a P.ulmi
Frutos Rojos	Cochinilla	10 -20 L/ha	20	Frambuesa, arándano, grosella y mora Pulverización foliar en presencia de plaga.
	Eriofidos	10 -20 L/ha	20	Frambuesa, arándano, grosella y mora Pulverización foliar en presencia de plaga.
Kiwi	Cochinilla	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente a Pseudaulacapsis pentagona
Otros Frutales	Acaros	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Avellano, Castaño y Nogal Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente P.ulmi
	Cochinilla	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Avellano, Castaño y Nogal Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente P.ulmi
	Eriofidos	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Avellano, Castaño y Nogal Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente P.ulmi
Platanera	Cochinilla	10-20 l/ha	20	Aplicar en pulverización foliar. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal: dosis de 15 – 37,5 l/ha.
	Pulgones	10-20 l/ha	20	Aplicar en pulverización foliar. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal: dosis de 15 – 37,5 l/ha.
Vid	Acaros	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Uva de mesa y de vinificación. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente a P.ulmi, Targiona vitis, Parthelonecanium corni, Planococus spp, Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis.
	Cochinilla	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Uva de mesa y de vinificación. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente a P.ulmi, Targiona vitis, Parthelonecanium corni, Planococus spp, Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis.
	Eriofidos	Aplicación invernal: 1,5 l/hl. Aplicación estival: 10-20 l/ha	20	Uva de mesa y de vinificación. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal. Eficaz frente a P.ulmi, Targiona vitis, Parthelonecanium corni, Planococus spp, Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis.

Nutricionales y Bioestimulantes

Nutricionales y Bioestimulantes

Algaegreen cítricos®

ALGAEGREEN CÍTRICOS® es a su vez un bioestimulante y corrector de carencias cuya formulación a base de *Ascophyllum nodosum* permite una mejora de los procesos fisiológicos del cítrico y el alcance de una mejor producción.

El exclusivo proceso de extracción en frío utilizado en la fabricación de ALGAEGREEN CÍTRICOS® permite que mantenga intactas todas las características beneficiosas procedentes de las algas.

Formulación
Extracto de algas
Ascophyllum nodosum

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Acción Correctora	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Cítricos	Estimular actividad vegetativa	5-10 L/ha	No Procede	Aplicación radicular:Dosis general indicada repitiendo según necesidad y desarrollo del cultivo.
	Estimular actividad vegetativa	250-300 cc/hL	No Procede	Aplicación foliar: Aplicar durante todo el ciclo de cultivo, preferiblemente coincidiendo con las brotaciones de primavera y verano.



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases



5 L
20 L

Nutricionales y Bioestimulantes

Suporter Plus AF®

SUPORTER PLUS AF® es una solución nutricional NP con efecto acidificante, cuya adición a los caldos de pulverización aporta múltiples ventajas:

- Aporte nutricional de nitrógeno y fósforo.
- Acidifica las aguas alcalinas. Reduce el pH del agua.
- Evita la degradación por hidrólisis alcalina de las materias activas susceptibles.
- Neutraliza los carbonatos y bicarbonatos.
- Mejora la absorción de los productos por parte de las plantas.
- Aumenta la eficacia de los tratamientos nutricionales y fitosanitarios.

SUPORTER PLUS AF® contiene un indicador colorimétrico de viraje de pH que pasa de amarillo a rosado según vaya acidificándose el caldo de pulverización.

Formulación
Solución NP3-17

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Dosis	Plazo de Seguridad (días)
Algodonero	50-100 cc/hL	No Procede
Cereales	50-100 cc/hL	No Procede
Cítricos	50-100 cc/hL	No Procede
Fresales	50-100 cc/hL	No Procede
Frutales	50-100 cc/hL	No Procede
Hortícolas	50-100 cc/hL	No Procede
Leguminosas	50-100 cc/hL	No Procede
Maíz	50-100 cc/hL	No Procede
Olivo	50-100 cc/hL	No Procede
Ornamentales	50-100 cc/hL	No Procede
Vid	50-100 cc/hL	No Procede

Envases



1 L
5 L
20 L

MISSYLK®

MISSYLK®, con tecnología HBE, posee una exclusiva formulación a base de sustancias bio-regeneradoras, anti estresantes y activadoras de los procesos fisiológicos de las plantas. MISSYLK® actúa:

- Activando procesos fisiológicos de resistencia a condiciones adversas.
- Produciendo un potente efecto bioestimulante.
- Mejorando la capacidad fotosintética y el estado nutricional de la planta.
- Estimulando la formación de raíces.

Así mismo, su empleo permite mejorar y transformar el medio en el que se desarrollan los cultivos al incrementar la disponibilidad y asimilación de los nutrientes por parte de estos y mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo.

MISSYLK® está formulado en forma de microgránulos de alta solubilidad.

Formulación
Abono con ácidos
húmicos NPK
3-16,4-18 con
Micronutrientes



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases



1 Kg
5 Kg

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Acción Correctora	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Alfalfa	Estimular actividad vegetativa	3 - 5 Kg/ha	No Procede	
Cereales	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No procede	
Céspedes	Estimular actividad vegetativa	3 - 5 Kg/ha	No procede	
Cítricos	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha
Fresales	Estimular actividad vegetativa	2-4 Kg/ha	No procede	FERTIRRIGACIÓN: 2-4 Kg/ha.Realizar 2-4 aplicaciones en función de las condiciones de estrés y de las demandas del cultivo.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
Frutales	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No procede	5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
Hortícolas	Estimular actividad vegetativa	2-4 Kg/ha	No procede	FERTIRRIGACIÓN: 2-4 Kg/ha.Realizar 2-4 aplicaciones en función de las condiciones de estrés y de las demandas del cultivo.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
Maíz	Estimular actividad vegetativa	3-5 Kg/ha	No procede	
	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
Olivo	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No Procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
Ornamentales	Estimular actividad vegetativa	2-4 Kg/ha	No Procede	FERTIRRIGACIÓN: 2-4 Kg/ha.Realizar 2-4 aplicaciones en función de las condiciones de estrés y de las demandas del cultivo
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
Patata	Estimular actividad vegetativ	3- 5 Kg/ha	No Procede	
Platanera	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No Procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
Remolacha	Estimular actividad vegetativa	3- 5 Kg/ha	No Procede	
Vid	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No Procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.

Nutricionales y Bioestimulantes

Fortan ECO®

FORTAN ECO® es un complejo nutritivo utilizable en agricultura ecológica, que fortalece y vitaliza la planta en todos sus estados de desarrollo: brotación, floración, cuajado, engorde y maduración.

Sus características de formulación y pH ácido garantizan una alta asimilación por las plantas y su compatibilidad con los productos fitosanitarios.

Formulación Potasa sólida quelada con magnesio y oligoelementos

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Carencia nutricional	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Algodonero	Potasio	200-300 g/hL	No Procede	Aplicar desde el inicio del cuajado y hasta el final de llenado de las cápsulas.
Arroz	Potasio	200-300 g/hL	No Procede	APLICACIÓN FOLIAR: Aplicar desde el inicio del espigado hasta final del estado lechoso
Cítricos	Potasio	4-8 kg/ha y aplicación	No procede	FERTIRRIGACIÓN: Recomendado en los momentos fundamentales para el cultivo.
Fresales	Potasio	30-60 kg/ha repartidos en 4-6 aplicaciones	No Procede	
Frutales	Potasio	150-200 g/hL	No procede	APLICACIÓN FOLIAR: Aplicar en cualquier momento del cultivo y en especial a partir del cuajado hasta final del engorde.
	Potasio	4-8 kg/ha y aplicación	No procede	FERTIRRIGACIÓN: Recomendado en los momentos fundamentales para el cultivo.
Fresales	Potasio	1-2 Kg/ha	No procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
Hortícolas	Potasio	100-250 g/hL	No procede	APLICACIÓN FOLIAR:Aplicar en cualquier momento del cultivo y en especial a partir de cuajado hasta final del engorde.
	Potasio	30-60 kg/ha repartidos en 4-6 aplicaciones	No procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
Olivo	Potasio	250-500 g/hL	No procede	APLICACIÓN FOLIAR: Aplicar en cualquier momento del cultivo y en especial en las fases de engorde y maduración.
	Potasio	4-8 kg/ha y aplicación	No procede	FERTIRRIGACIÓN: Recomendado en los momentos fundamentales para el cultivo.
Platanera	Potasio	200-300 g/hL	--	APLICACIÓN FOLIAR
	Potasio	4-8 Kg/ha	..	FERTIRRIGACIÓN
Remolacha	Potasio	200-300 g/hL	No Procede	Aplicar durante el periodo de engrosamiento y acumulación de azúcares.
Vid	Potasio	4-8 kg/ha y aplicación	No Procede	APLICACIÓN FOLIAR: Aplicar en cualquier momento del cultivo y en especial a partir del cuajado hasta final del engorde.
	Potasio	2-4 Kg/ha	No Procede	FERTIRRIGACIÓN: Recomendado en los momentos fundamentales para el cultivo.

Envases



Nutricionales y Bioestimulantes

ENR T-300®

ENR T-300® es un formulado que aumenta la eficiencia del nitrógeno aportado por cualquier tipo de fertilizante que contenga nitrógeno ureico. Está basado en la actividad inhibidora de la ureasa que presenta el compuesto químico MCDHS.

ENR T-300® reduce la velocidad a la que la urea se hidroliza en el suelo. Al reducir la velocidad de conversión de la urea en amonio, se minimizan las pérdidas por volatilización de amoniaco NH3 a la atmósfera, así como las pérdidas por lixiviación de nitrato en el suelo. Por lo tanto, se aumenta la eficiencia del nitrógeno en forma uréica, se reducen los efectos fitotóxicos producidos en el cultivo por volatilización de amoniaco y se reduce cualquier impacto ambiental derivado de su uso.

Formulación MCDHS

Aplicación por cultivo autorizado

- Fertilizantes con contenido inferior al 15 % de nitrógeno ureico: 1 L de ENR T-300 por cada 1.000 Kg fertilizante.
- Fertilizantes con contenido superior al 15 % de nitrógeno ureico: 1,5 L de ENR T-300 por cada 1.000 Kg fertilizante.
- En caso de mezcla con diluciones de urea pura, aplicar 3 cc de ENR T-300 por cada Kg de urea.
- En el caso de mezcla con purín, aplicar 0,25 L de ENR T-300 por cada 1.000 L de purín, con un máximo de 5 L/ha.



Envases



Nutricionales y Bioestimulantes

ON ASCENZA®

ON ASCENZA® (con tecnología GB) es un activador epigenético de última generación, desarrollado para inducir y maximizar las respuestas celulares y fisiológicas endógenas de las plantas implicadas en la superación de situaciones de estrés y el mantenimiento de una tasa metabólica óptima.

Con la aplicación de ON ASCENZA® se consigue:

- Mayor cantidad y calidad de cosecha.
- Desarrollo vegetativo vigoroso y equilibrado.
- Defensa frente a estrés abiótico.
- Mejora de la floración y fertilidad del polen.
- Osmoregulación. Equilibra el balance hídrico celular.
- Protección enzimática frente a compuestos biológicamente tóxicos.

Formulación
Aminoácidos libres 2% p/p
Nitrógeno (N) total 1,35% p/p;
Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p;
Ácido algínico 1.5% p/p;
Manitol 0.9% p/p;
Prolina 2% p/p;
Glicina Betaina: 10%

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Dosis	Observaciones
Hortícolas de fruto	200-300 cc/hL y aplicación	Realizar aplicaciones a intervalos de 10-15 día durante prefloración, engorde y maduración.
Hortícolas de hoja o flor	150 – 200 cc/hl	Aplicar desde 4-6 hojas. Realizar 2-3 aplicaciones a intervalos de 10-15 días o en cualquier momento de estrés.
Cítricos	200 cc/lh.	Realizar 2-3 aplicaciones en prefloración, desarrollo y engorde de fruto.
Frutales de hueso y pepita	200-300 cc/hl	2-3 aplicaciones desde caída de pétalos, durante el desarrollo y engorde de frutos
Uva de mesa	300 cc/hl	2-3 aplicaciones durante el engorde y maduración de fruto.
Otros frutales y vid	200-300 cc	En prefloración, cuajado y desarrollo del fruto.
Fresón y berries	150-200 cc/hL y aplicación	Realizar 3 ó 4 aplicaciones, con intervalos de 10-14 días, comenzando una semana después del trasplante.
Olivar	200-300 cc/hL y aplicación	En prefloración, cuajado y desarrollo del fruto o en cualquier momento de estrés.
Platanera	200 cc/hL y aplicación	En prefloración, cuajado y desarrollo del fruto o en cualquier momento de estrés.
Maíz	100 cc/hL y aplicación	Realizar 1 aplicación con plantas entre 25 ó 50 cm. de altura.
Patata, remolacha	250-300 cc/hL	Inicio vegetación y desarrollo del cultivo.
Alfalfa y praderas	250 cc/hL	Al inicio de la vegetación y después de cada corte.
Cereales	100-250 cc/hL y aplicación	Realizar 1-2 aplicaciones entre encañado e inicio espigado.
Otros cultivos	200 cc/hL	

Envases



1 L
5 L

Nutricionales y Bioestimulantes

Nutrex Cuaje®

NUTREX CUAJE® es una formulación altamente concentrada en Molibdeno (soluble en agua 10% p/p) y Boro (soluble en agua 8% p/p) enriquecida con fósforo asimilable y L-α-aminoácidos 100% activos. Presenta un efecto fortalecedor y estimulador de la floración y el cuajado, favoreciendo la fase de engorde de los frutos. El equilibrio de NUTREX CUAJE® en cuanto al Molibdeno y el Boro favorece la fertilidad del polen, mejorando la fecundación de las flores y el correcto desarrollo del cuajado y fructificación. En la fase de fructificación favorece el desarrollo y el engorde del fruto. Es ideal en aplicaciones foliares en cultivos de floración múltiple cuyas fases de cuajado y engorde se solapan en el tiempo como: cucurbitáceas, hortícolas, fresa y también en otros cultivos como cítricos, olivo, vid y frutales.

Formulación
Abono con Aminoácidos PK 9,5-12,6 con Micronutrientes

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Carencia Nutricional	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Cítricos	Boro/Molibdeno	100-150 g/hL	No Procede	Aplicación foliar. para mejorar el cuajado y desarrollo del fruto aplicar en prefloración, caída de pétalos, final del cuajado y engorde.
	Boro/Molibdeno	2-3 kg/ha	No Procede	Fertirrigación, comenzando las aplicaciones antes de la floración
Cucurbitáceas	Boro/Molibdeno	1-1,5 kg/ha	No Procede	Fertirrigación, riego desde el inicio de la floración hasta el final del cuajado cada 15 días.
	Boro/Molibdeno	100-150 g/hL	No Procede	Aplicación foliar.comenzando las aplicaciones en prefloración antes de la aparición del primer ramillete floral hasta el cuajado de los frutos, repitiendo las aplicaciones cada 15 días.
Frutales	Boro/Molibdeno	2-3 kg/ha	No Procede	Fertirrigación, comenzando las aplicaciones antes de la floración.
	Boro/Molibdeno	100-150 g/hL	No Procede	Aplicación foliar. para mejorar el cuajado y desarrollo del fruto aplicar en prefloración, caída de pétalos, final del cuajado y engorde.
Hortícolas	Boro/Molibdeno	1-1,5 kg/ha	No Procede	Fertirrigación, riego desde el inicio de la floración hasta el final del cuajado cada 15 días.
	Boro/Molibdeno	100-150 g/hL	No Procede	Aplicación foliar.comenzando las aplicaciones en prefloración antes de la aparición del primer ramillete floral hasta el cuajado de los frutos, repitiendo las aplicaciones cada 15 días.
Olivo	Boro/Molibdeno	100-150 g/hL	No Procede	Aplicación foliar.Aplicar antes de la floración y durante el engorde de los frutos.
Platanera	Boro/Molibdeno	100-150 g/hL	No Procede	Aplicación foliar. para mejorar el cuajado y desarrollo del fruto aplicar en prefloración, caída de pétalos, final del cuajado y engorde.
Vid	Boro/Molibdeno	2-3 kg/ha	No Procede	Fertirrigación, comenzando las aplicaciones antes de la floración.
	Boro/Molibdeno	100-150 g/hL	No Procede	Aplicación foliar, realizar aplicaciones antes de la floración.

Envases



1 Kg
5 Kg

Nutricionales y Bioestimulantes

N-Release®

N-RELEASE® es un novedoso fertilizante nitrogenado de alta eficacia y persistencia, especialmente diseñado para dar respuesta a las necesidades de todo tipo de cultivos. N-RELEASE® es capaz de satisfacer las necesidades inmediatas de la planta, así como de permitir una liberación más duradera en el tiempo por parte del Nitrógeno debido a la incorporación en su formulación de la molécula MCDHS.

Así mismo, el Nitrógeno aportado con la aplicación de N-RELEASE® es sumamente eficaz gracias a la presencia de Molibdeno y azufre en su formulación, elementos indispensables para una correcta asimilación y aprovechamiento del Nitrógeno por parte de la planta.

Formulación
Solución NP (20-3)
con molibdeno y con
inhibidor de la ureasa
(MCDHS)

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Problema	Dosis	Observaciones
Trigo, Cebada, Triticale y Centeno	Nitrogeno	Secano: 5 L/ha Regadío y secanos húmedos: 10 L/ha	Aplicar mediante pulverización foliar desde salida de invierno mezclado con herbicidas o fungicidas. Se recomienda hacer un tratamiento entre pleno ahijado y primer nudo, y otro entre hoja bandera y floración.
Algodonero	Nitrogeno	Fraccionar en varias aplicaciones de 15-20 L/ha durante el desarrollo de cápsulas.	
Arroz	Nitrogeno	10-15 L/ha	Aplicar a partir de la aplicación de la hoja bandera junto con los tratamientos fungicidas.
Berries	Nitrogeno	A partir de inicio de floración a dosis de 5-10 L/ha. Cada 15 días.	
Cítricos	Nitrogeno	10-15 L/ha	Aplicar en Enero-Febrero para favorecer el desarrollo vegetativo y en el momento de engorde del fruto .
Frutales De Hueso	Nitrogeno	Fraccionar las aplicaciones desde la caída de pétalos hasta engorde de fruto a dosis de 10-15 L/ha. Dosis total máxima 50 L/ha. (En post cosecha: 10 L/ha).	
Frutales De Pepita	Nitrogeno	Fraccionar las aplicaciones desde la caída de pétalos hasta engorde de fruto a dosis de 10-15 L/ha. Dosis total máxima 50 L/ha. (En post cosecha: 10 L/ha).	
Hortícolas	Nitrogeno	Fraccionar las aplicaciones desde la caída de pétalos hasta engorde de fruto a dosis de 10-15 L/ha. Dosis total máxima 50 L/ha. (En post cosecha: 10 L/ha).	
Leguminosas	Nitrogeno	10 L/ha en crecimiento vegetativo activo.	
Maíz	Nitrogeno	10 L/ha después de cada corte.	Aplicar a partir de 6-8 hojas, hasta inicio floración.
Olivo	Nitrogeno	10-20 L/ha	Aplicar en los momentos de máximo crecimiento vegetativo.
Patata	Nitrogeno	10 L/ha en crecimiento vegetativo activo.	
Remolacha	Nitrogeno	10 L/ha en crecimiento vegetativo activo.	
Vid	Nitrogeno	10 -15 L/ha a partir de brotación y 2 aplicaciones de 20 L/ha a partir del cierre del racimo.	

Envases



Nutricionales y Bioestimulantes

Resilient®

RESILIENT® es un novedoso bioestimulante formulado a base de sal potásica del ácido silícico y extracto de algas fresco de Ascophyllum nodosum. El estudiado contenido en Silicio activo presente RESILIENT®, presenta un alto poder agronómico debido a la sinergia establecida entre este y los principios fisioactivos exclusivos del extracto fresco de Ascophyllum nodosum.

Con RESILIENT® se consigue una mejora de los procesos fisiológicos todo tipo de cultivos y el alcance de una mejor producción.

Formulación
Óxido de potasio
(K2O) soluble en agua
6% p/p
Extracto de algas:
Ascophyllum nodosum
Manitol 0, 10% p/p

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Problema	Dosis	Observaciones
Trigo, cebada, triticale y centeno	Estimular Actividad Vegetativa	1,5-2 L/ha	De 1 a 2 aplicaciones a dosis de 1,5-2 L/ha en las fases de crecimiento vegetativo.
Arroz	Estimular Actividad Vegetativa	2-3 L/ha	De 1 a 2 aplicaciones a dosis de 2-3 L/ha en las fases de crecimiento vegetativo y floración / formación espiga. (Se recomienda utilizar junto con los tratamientos fungicidas)
Céspedes	Estimular Actividad Vegetativa	100 cc/ 1.000 m2	Aplicaciones quincenales a dosis de 100 cc/ 1.000 m2 desde inicio de Primavera hasta finales de Otoño.
Citricos	Estimular Actividad Vegetativa	2-3 L/ha	De 2 a 3 aplicaciones a dosis de 2-3 L/ha desde cuajado de fruto hasta cosecha. En especial durante épocas de fuerte calor e insolación para proteger al árbol y fruto de deshidrataciones.
Frutales	Estimular Actividad Vegetativa	1,5-2,5 L/ha	De 2 a 4 aplicaciones a dosis de 1,5-2,5 L/ha desde cuajado hasta cosecha.
Frutos Rojos	Estimular Actividad Vegetativa	2 L/ha	Aplicaciones quincenales a dosis 2 L/ha, a partir de la aparición de los primeros frutos cuajados.
Hortícolas	Estimular Actividad Vegetativa	1,5-2,5 L/ha	De 2 a 4 aplicaciones a dosis de 1,5-2,5 L/ha. Durante el crecimiento vegetativo y producción.
Maíz	Estimular Actividad Vegetativa	1,5-2,5 L/ha	De 2 a 4 aplicaciones a dosis de 1,5-2,5 L/ha a partir del estado de cuatro hojas.
Olivo	Estimular Actividad Vegetativa	2-3 L/ha	De 2 a 3 aplicaciones a dosis de 2-3 L/ha durante la fase de desarrollo del fruto, y 1 aplicación a dosis de 2 L/ha después de recolección para recuperar el óptimo estado del árbol.
Vid	200-300 cc/hL y aplicación	1,5-2,5 L/ha	De 2 a 4 aplicaciones a dosis de 1,5-2,5 L/ha desde cuajado hasta cosecha.

Envases



Listado general de productos



FUNGICIDAS

Nombre de Producto / Composición		Número de registro
Actlet C® Metalaxil-M 28,5 g/l + Hidróxido de cobre 215 g/l (SC)		ES-00713
Actlet F® M-Metalaxyl 5% + Folpet 40% (WG)		NOVEDAD ES-01124
Actlet EVO® M-Metalaxyl+ Cimoxanilo + Folpet		PRÓXIMAMENTE
Azupec Micro WG® Azufre 80% (WG)		24416
Bordbio SC® Caldo Bordeles (sulfato cuprocálcico) 12,4%		860
Centinela 10 EC® Penconazol 10% (EC)		24064
Ceremonia 25 EC® Difenoconazol 25% (EC)		24410
Cimoxate CU® Cimoxanilo 3%, Sulf. Cuprocálcico 22,5% (WP)		23563
Cimoxate FP® Cimoxanilo 4%, Folpet 40% (WP)		23248
Cimoxate FP WG® Cimoxanilo 8%, Folpet 66% (WP)		ES-00258
Cimoxate 45 WG® Cimoxanilo 45% (WP)		NOVEDAD ES-00321
Cimoxate Mz WG® Cimoxamilo 4%, Mancozeb 46,5% (WP)		ES-00216



Nombre de Producto / Composición		Número de registro
Covicampo 50® Oxicloruro de Cu 50% (WP)		12965
Covicampo bordes® Sulfato cuprocálcico (expre. En Cu) 20% (WP)		20048
Covicampo piedra® Sulfato de Cu 25%		Abono CE
Covinex 35 WG® Oxicloruro de Cobre 35% Certificado ecológico CAAE		NOVEDAD ES-00666
Covinex 700 Flow® Oxicloruro de Cu 70% (SC)		24457
Covinex Forte MZ® Oxicloruro de Cu (expr. en Cu) 10%, Sulf. Cuprocálcico (expr. en Cu) 10%, Mancozeb 15% (WP)		19525
Cuper 50® Oxicloruro de Cobre 50% (WP)		22287
Flecha® Kresoxim-metil 50% (WG)		NOVEDAD ES-00853
Flecha Suprem® Kresoxim-metil 25% p/p (250 g/Kg) Difenoconazol 12,5% p/p (87,5 g/Kg) (WG)		NOVEDAD ES-00260
Folpec 50® Folpet 50% (WP)		21821
Grano de Oro 98,5® Azufre 98,5% (DP)		13325





FUNGICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Hidrocuper 50® Hidróxido cúprico 50% (WP)	23015	
Hidrocuper Bio WG® Hidróxido cúprico 20% (WG)	NOVEDAD	ES-00716
Manzivex 80 WP® Mancozeb 80% (WP)	13789	
Melvar EC® Protioconazol 25% (EC) <i>Fusarium y Roya</i>	NOVEDAD	ES-01135
Placaje 25 SC® Azoxistrobin 25% (SC)	ES-00267	
Placaje FP® Azoxistrobin 9,35% + Folpet 50% (SC)	ES-00163	
Pombal 80 WG® Fosetil-Al 80% (WG)	25505	
Pombal Mz® Fosetil-Al 35%, Mancozeb 35% (WG)	22997	
Premier 50 WG® Ciprodinil 50% (WG)	ES-00312	
Smash® Dodina 40% (SC)	NOVEDAD	23392
Spyrit Hidro SC® Dimetomorf 6% + Hidróxido cúprico 20% (SC)	ES-00370	
Spyrit 50 SC® Dimetomorf 44% (SC)	ES-00365	



Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Spyrit M WG® Dimetomorf 7,5%, Mancozeb 66,7% (WG)	ES-00295	
Spyrit Plus WG® Dimetomorf 6%, Folpet 25%, Fosetil-Al 50% (WG)	ES-00240	
Spyrit Pro® Dimetomorf 9%, Propamocarb 50% (SC)	ES-00151	
Tasis 12,5 EC® Miclobutanil 12,5% (EC)	24266	
Trineo 25 EW® Tebuconazol 25% (EW)	24409	
Trineo 25 WG® Tebuconazol 25% (WG)	25092	
Trunfo Max® Azoxistrobin 18.52%, Tebuconazol 18.52%	NOVEDAD	ES-01092





HERBICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Acasto® Pendimetalina 33% (EC)	NOVEDAD	ES-00490
Athir Max® Fluazifop-p-butil 12,5% (EC)		24692
Button® Mesotriona 10% (SC)		ES-00528
Circus 25 WG® Rimsulfuron 25% (WG)		ES-00245
Cizalla OD Nicosulfuron 2%, Sulcotriona 15% (OD)		ES-00110
Decano® Sulcotriona 30% (SC)		24798
Deflexo Mix® S-metolacoloro 312.5 g/L - Terbutilazina 187.5 g/L (SE)	NOVEDAD	ES-01095
Deflexo Ultra® S-metolacoloro 35% + Sulcotriona 10% (SE) Control de gramíneas y hoja ancha en pre-emergencia	NOVEDAD	ES-01108
Estaca WG® Diflufenican 40% p/p (400 g/Kg), Florasulam 2% p/p (20 g/Kg) Iodosulfuron 5% p/p (50 g/Kg) (WG)		ES-00472
Flurostar® 200 Fluroxipir 20% (EC)		25462
Foscary® Diflufenican 4% p/v (40 g/l) + Pendimetalina 40% p/v (400 g/l)	NOVEDAD	25900




Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Herbastop Ultra® 2,4D 34,5%, MCPA 34,5% (SL)		19436
Herbenuron® Tribenuron-metil 75% (WG)		25395
Hercampo Green® Glifosato 36% (SL)		17118
Hercampo Ultra® Glifosato 45%	NOVEDAD	ES-00309
Hereu Super® Oxifluorfen 24% (EC)		23059
Herpan 50® MCPA 50% (SL)		22720
Kaos B® Bentazona 48% (SL)		25575
Mohican 50 SC® Diflufenican 50% (SC)		24085
Mohican Energy® Diflufenican 4%, Glifosato 16% (SC)		25004
Orbiter® Florasulan 5% (SC) Control de malas hierbas de hoja ancha	NOVEDAD	ES-01154
Polarpec 80® Prosulfocarb 80% (EC)		ES-00293





Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Register 25 WG® Flazasulfuron 25% (WG)	ES-00401
Runrud® Glifosato 36% SL	20051
Rusnet® Quizalofop-p-etil 5% p/v (50 g/l) (EC)	24515
Sabba® Pendimetalina 33% (EC)	25767
Sajon OD® Nicosulfuron 4% (OD)	24800
Stonic® Clomazona 36% (CS)	NOVEDAD ES-00670
Voltage Flo® Flufenacet 40%, Diflufenican20%	NOVEDAD ES-00293



INSECTICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Acrux® Hexitiazox 10% (WP)	23489
Aikido® Lambda-cihalotrin 10% (CS)	25640
Boreal® Abamectina 1,8% (EC)	21854
Doctrin® Bacillus thuringiensis var. kurstaki (cepa PB-54) 32% (WG)	NOVEDAD 22423
Delta EC® Deltametrin 2,5% (EC)	25706
Expedient 10 EC® Piriproxfen 10% (EC)	24252
Kopy® Imidacloprid 20% (SL)	23889
Rikolto® Acetamiprid 20% (SG)	NOVEDAD ES-00876
Sondae® Oxamilo 10% (SL)	ES-00131
Superblock® Aceite de parafina 800 g/l (80% p/v) (EC)	NOVEDAD ES-00079
Excentro® 0,5 Teflutrin 0.5% (5 g/kg)	NOVEDAD ES-01191





FITOREGULADORES, MOJANTES Y OTROS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Adrex® Alquil poliglicol eter 20% (SL)	12968
Folmoxanil® 6-Benziladenina 1,9%, Giberelinas 1,9% (SL)	24713
Globaryll 100® 6 Benziladenina (SL)	ES-25881
Multi-Us® Cera de Montana 20% (EW)	15188



NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

Nombre de Producto / Composición
Algaegreen Cítricos® Ácido algínico 0,4%, Manitol 0,25%, Zinc-EDTA 2%, Manganeso EDTA: 2%
Algaegreen Olivo Plus® Ácido algínico: 1.5% p/p; Manitol: 1.09% p/p; Extracto de algas procedente de <i>Ascophyllum nodosum</i> : 100% p/p
Carrier Mix® Hierro-EDTA 7,5%, Manganeso-EDTA 3,5% Zinc-EDTA 0,7%, Cobre-EDTA 0,28%, Molibdeno 0,3%, Boro 0,65%
Delfan Pro 24® Aminoácidos libres: 24,0% p/p, Nitrógeno (N) total: 9,0% p/p, Nitrógeno orgánico: 5,3% p/p, Nitrógeno ureico: 3,7% p/p.
Delfan Pro Eco® Aminoácidos libres: 23,0% p/p, Nitrógeno (N) total: 4,6% p/p, Nitrógeno orgánico: 4,6% p/p.
ENR T-300® MCDHS 100 % (p/p)
Folur® Nitrógeno (N) total: 20% p/p, Nitrógeno Ureico: 20% p/p y Pobre en Biuret
Fortan® Aminoácidos libres 2,0% p/p, Nitrógeno total (N) 0,36% p/p, Nitrógeno orgánico 0,36% p/p, Óxido de potasio (K ₂ O) 30,7% p/p, Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua 8,0% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDTA 1,0% p/p, Manganeso (Mn) quelado por EDTA 0,4% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA 1,6% p/p
Resilient® Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua 6% p/p Extracto de algas: <i>Ascophyllum nodosum</i> Manitol 0,10% p/p





NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

Nombre de Producto / Composición	
Fortan ECO® Óxido de potasio (K ₂ O) p/p, Óxido de magnesio (MgO) p/p, Hierro (Fe) quelado por EDTA 1,0% p/p, Manganeseo (Mn) quelado por EDTA 0,4% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA 1,5% p/p	
Glusapec® Cobre (Cu) soluble en agua: 5% p/p, Cobre (Cu) complejoado por ácido glucónico: 5% p/p	
Microsoil® Enzimas, microorganismos beneficiosos, minerales, vitaminas, polisacáridos y polipéptidos.	
Missylk® Aminoácidos libres: 22,2% p/p, Nitrógeno (N) total: 3.0% p/p, Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅): 16.4% p/p, Óxido de potasio (K ₂ O): 18.0% p/p, Manganeseo (Mn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Molibdeno (Mo): 0.25% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 0,10% p/p, Extracto húmico total: 29.1% p/p, Ácidos húmicos: 14.0% p/p, Ácidos fúlvicos: 15.1% p/p	
Nutrex Cuaje® Aminoácidos libres 5% p/p, Nitrógeno (N) total 0,65% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 0,65% p/p, Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) 9,5% p/p, Óxido de potasio (K ₂ O) 12,6% p/p, Boro (B) 8% p/p, Molibdeno (Mo) 10% p/p	
Nutrex Olivo® Nitrógeno (N) total 20% p/p, Nitrógeno (N) ureico 14,5% p/p, Nitrógeno (N) amoniacal 5,5% p/p, Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) 5% p/p, Óxido de potasio (K ₂ O) p/p, Óxido de Magnesio (MgO) 2% p/p, Boro (B) 2% p/p	
N-Release® Nitrógeno total (N): 20, Nitrógeno Amónico (N): 0,60, Nitrógeno Ureico (N): 19,40, Fósforo (P ₂ O ₅): 3,17, Azufre (SO ₃): 0,39, Molibdeno (Mo): 0,31, MCDHS/ N ureico: 1,34	



Nombre de Producto / Composición	
ON ASCENZA® Aminoácidos libres 2% p/p, Nitrógeno (N) total 1,35% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p, Ácido algínico 1.5% p/p, Manitol 0.9% p/p, Prolina 2% p/p; Glicina Betaina: 10%,	
Suporter Plus AF® Nitrógeno (N) total: 3% p/p, Nitrógeno (N) ureico: 3% p/p, Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) 17% p/p	
Ultraferro Complex® Aminoácidos libres: 2% p/p, Nitrógeno (N): 5% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 4,5% p/p, Hierro (Fe) quelado por [o-o] EDDHA: 3,1% p/p, Manganeseo (Mn) quelado por EDTA: 1,25% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 1,5% p/p	

NOVEDAD



Consejos prácticos para una correcta aplicación de los productos fitosanitarios



Es importante respetar este orden para evitar posibles problemas de incompatibilidades.

	PRIMERO
1°	Reguladores de pH*
2°	Bolsas hidrosolubles (WSB)
3°	Gránulos solubles (SG)
4°	Gránulos dispersables (WG)
5°	Polvos mojables (WP)
6°	Acidificantes del caldo
7°	Suspensiones concentradas (SC, Flow)
8°	Suspensiones encapsuladas (CS)
9°	Suspensiones Concentradas Oleosas (OD)
10°	Líquidos emulsionables (EC, EW, ME)
11°	Sufractantes / Mojantes
12°	Líquidos solubles (SL)
13°	Abonos foliares
14°	Líquidos anti-deriva
	ÚLTIMO

NOTA: (*) Se introducirá en primer lugar sólo en caso de que se trate de reguladores específicos. Cuando se utilicen sustancias con propiedades mojantes y que tengan un efecto regulador de pH deberán introducirse en la cuba según el orden asignado a los surfactantes/mojantes.

Antes de la aplicación del corrector de pH, el tanque deberá estar al menos al 80 % de llenado. Si, en función de los productos a mezclar en la cuba, se prevé una reacción ácida, la dosis de corrector de pH deberá ser ajustada. Se recomienda hacer un ajuste final del pH del tanque una vez se haya completado la mezcla de todos los productos.

Excepción: en formulaciones de Fosetyl-Al hay que añadir las suspensiones concentradas (Flows) antes que los productos que contienen Fosetyl-Al.



ASCENZA®

— FARMING YOUR FUTURE —

www.ascenza.es

