

TÚ DECIDES ASCENZA



ASCENZA. CULTIVANDO TU FUTURO

En 2019 nace ASCENZA, integrada dentro del gran grupo corporativo Rovensa. ASCENZA viene ya operando en el mercado español desde hace más de 20 años como Sapec Agro.


ASCENZA es una compañía que tiene como actividad principal el Desarrollo y la Innovación (D+i) de soluciones fitosanitarias, nutricionales y bioestimulantes para la protección y nutrición de cultivos. Somos líderes en la Península Ibérica en el segmento de soluciones agrícolas off patent.

La central operativa en España está ubicada en Paterna (Valencia). Disponemos de un moderno almacén regulador en el Parque Industrial de Chinchilla (Albacete) dotado de las últimas medidas en lo que a logística y seguridad se refiere. Nuestros productos fitosanitarios se fabrican en Setúbal (Portugal) y los fitonutrientes y bioestimulantes en Sanchidrían (Ávila) y Campollano (Albacete).

En ASCENZA entendemos la complejidad de la agricultura y queremos seguir creciendo para ofrecerte soluciones completas con las que conseguir una agricultura sostenible y de calidad. Apostamos por la agricultura y los agricultores.







ASCENZA PLANT, TU HERRAMIENTA PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

En ASCENZA, hemos desarrollado una potente herramienta digital que contiene la información de todos los productos FITOSANITARIOS registrados en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La aplicación móvil ASCENZA Plant, nace con la vocación de facilitar a los agricultores la información necesaria que les ayude a llevar sus cultivos a buen término dentro una agricultura sostenible.

En ASCENZA Plant podréis encontrar además de la información de producto, la dosis y la aplicación necesaria para proteger los cultivo contra una plaga o enfermedad específica. Y además podréis consultar directamente la Hoja de Registro Oficial de los diferentes productos publicada por el Ministerio.

Dispone de:

- Más de 2000 productos.
- Más de 500 materias activas.
- Más de 180 fabricantes distintos.
- Más de 500 cultivos y plagas/enfermedades.

La aplicación puede descargarse directamente desde Google Play para los sistemas Android y desde Apple Store para los sistemas IOS.





ROVENSA. AGRICULTURA EQUILIBRADA

ROVENSA es el nuevo nombre que adquiere el grupo Sapec Agro Business. Nace de la necesidad de responder a las tendencias actuales del mercado: crecimiento de la población, estilos de vida más saludables, consumidores más informados, distribuidores que necesitan defender la transparencia y agricultores que precisan garantizar una producción segura y de alta calidad.

ROVENSA es un grupo internacional de empresas con soluciones complementarias, un mercado independiente y una meta: cambiar la agricultura. Vendemos productos a más de 70 países y tenemos oficinas en más de 25 países.

ROVENSA integra varias empresas y diferentes unidades de negocio con una cartera complementaria de productos y un objetivo común: cambiar hacia un modelo de Agricultura Equilibrada.

Ascenza, Tradecorp, Idai Nature, OGT, SDP, Microquimica y Agrichem, S.A. and Even Agro S.L son las empresas que a día de hoy conforman **ROVENSA**.

Las empresas que forman **ROVENSA** comparten sinergias y ofrecen un catálogo de productos complementarios con un objetivo común: la Agricultura Equilibrada. Este nuevo concepto combina el uso de distintas herramientas y estrategias para la protección de cultivos, nutrición especial y bioestimulación, y biocontrol para conseguir una agricultura equilibrada y que cumpla con los estándares más estrictos demandados por el consumidor.

ROVENSA busca transmitir a los agricultores que el futuro no es eco ni convencional, es lo mejor de cada uno de manera equilibrada, y sólo esta compañía es capaz de ofrecérselo de manera global.

PARTICIPANDO ACTIVAMENTE ESTE 2020 AL AÑO INTERNACIONAL DE SANIDAD VEGETAL (IYPH)

En diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2020 el Año Internacional de Sanidad Vegetal (en adelante "IYPH") e invitó a los Alimentos y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), en colaboración con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), para facilitar la implementación del Año Internacional.

El objetivo principal de IYPH es concienciar a nivel mundial sobre cómo la protección de la salud de las plantas puede ayudar a erradicar el hambre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo económico.

Las plantas constituyen el 80 por ciento de los alimentos que comemos y producen el 98 por ciento del oxígeno que respiramos. Sin embargo, se enfrentan a la amenaza constante y creciente de plagas y enfermedades.

Las empresas que forman **ROVENSA** trabajan de forma constante para que los agricultores puedan llevar a buen término sus cosechas libres de plagas y enfermedades.









Listado de productos para maíz 2020



Lista de productos para maíz 2020



HERBICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número o	le registro
Button®		
Mesotriona 10% (SC)		ES-00528
Dicotiledóneas y gramíneas		
Circus 25 WG®		
Rimsulfuron 25% (WG)		ES-00245
Gramíneas y dicotiledóneas en post-emergencia		
Cizalla OD®		
Nicosulfuron 2%, Sulcotriona 15% (OD)		ES-00110
Dicotiledóneas anuales y gramíneas anuales y vivaces		
Decano [®]		
Sulcotriona 30% (SC)		24798
Juncia, malas hierbas de hoja ancha y hierbas		24770
monocotiledóneas en post-emergencia		
Deflexo Mix®		
S-metolacloro 312.5 g/L - Terbutilazina 187.5 g/L (SE)	NOVEDAD	ES-01095
Control de gramíneas y hoja ancha en cultivo de maíz		20 01075
en pre-emergencia		
Deflexo Ultra®	PRÓXIMAMENTE	
Flurostar® 200		
·		
FIU rostar® 200 Fluroxipir 20% (EC) Hoja ancha en post-emergencia		

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Hermoxin [®]	
Bromoxinil 23,5% (EC)	15721
Hoja ancha en post-emergencia	
Herpan 50 [®]	
MCPA 50% (SL)	22720
Hierbas de hoja ancha en post-emergencia	
Kaos B®	
Bentazona 48% (SL)	25575
Dicotiledóneas	
Sabba®	
Pendimetalina 33% (EC)	25767
Malas hierbas anuales y malas hierbas de hoja ancha en estado de pre-emergencia o post-emergencia precoz	
Sajon OD®	
Nicosulfuron 4% (OD)	24800
Dicotiledóneas, gramíneas y sorghum halepense en	
post-emergencia precoz	

Lista de productos para maíz 2020



INSECTICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro	
Aikido®		
Lambda-cihalotrin 10% (CS)	25640	
Taladro, gusanos grises, delfácidos, cicadélido y pulgones		
Boreal [®]		
Abamectina 1,8% (EC)	21854	
Ácaros		
Delta EC®		
Deltametrin 2,5% (EC)	25706	
Orugas y diabrótica		



NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

Nombre de Producto / Composición

ENR T-300®

MCDHS 100 % (p/p)

Folur[®]

Nitrógeno (N) total: 20% p/p, Nitrógeno Ureico: 20% p/p y Pobre en Biuret

Missylk®

Aminoácidos libres: 22,2% p/p, Nitrógeno (N) total: 3.0% p/p, Pentóxido de fósforo (P2O5): 16.4% p/p, Óxido de potasio (K2O): 18.0% p/p, Manganeso (Mn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Molibdeno (Mo): 0.25% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 0,10% p/p, Extracto húmico total: 29.1% p/p, Ácidos húmicos: 14.0% p/p, Ácidos fúlvicos: 15.1% p/p

ON®

Aminoácidos libres 2% p/p, Nitrógeno (N) total 1,35% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p, Ácido algínico 1.5% p/p, Manitol 0.9% p/p, Prolina 2% p/p; Glicina Betaina: 10%,

NOVEDAD

Suporter Plus AF®

Nitrógeno (N) total: 3% p/p, Nitrógeno (N) ureico: 3% p/p, Pentóxido de fósforo (P2O5) 17% p/p

Herbicida



Button®

BUTTON® es un herbicida de post-emergencia que contiene mesotriona. La absorción es principalmente vía foliar y en alguna medida a través del suelo, con translocación acrópeta y basípeta y distribución por toda la planta.

BUTTON[®] se utiliza para el control de dicotiledóneas y gramíneas en maíz (grano y forraje).

Número de registro ES-00528 Formulación Mesotriona 10% (SC) Materia activa Mesotriona

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Maíz de grano y forrajero	Malas hierbas anuales	0,75-1,5 L/Ha	No Procede	Malas hierbas de hoja ancha: Abutilon theophrastis, Amaranthus sp, Chenopodium álbum, Convolvulus sp, Datura stramonium, Solanum sp, Sonchus sp y Xanthium sp. Aplicar desde el estadio de 2 hojas desplegadas hasta 9 o más hojas desplegadas (BBCH 12-19).









Envases



1L 5 L 20 L Herbicida



Herbicida selectivo para el control de gramíneas y malas hierbas de hoja ancha en cultivo de maíz. Combinación de dos sustancias activas: S-metolacloro, que inhibe la división celular y el crecimiento de los tallos y las raíces, y terbutilazina, una triazina sistémica con actividad herbicida, de absorción radical y muy débilmente foliar que se trasloca a través del xilema hacia los puntos de acción e interfiere la función clorofílica.

Número de registro ES-01095 Formulación S-metolacloro 312.5 g/L -Terbutilazina 187.5 g/L (SE) Materia activa S-metolacloro + Terbutilazina

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Época	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Maíz	Pre- emergencia	Malas hierbas	3,5 L/ ha	No Procede	









Envases



5 L

Herbicida



Decano®

DECANO[®] es un herbicida selectivo en maíz. No tiene efecto residual. Las plantas afectadas exhiben un blanqueamiento general antes de marchitarse y desaparecer. La vía principal de penetración es la foliar, complementada por la radicular.

Número de registro 24798 Formulación Sulcotriona 30% (SC) Materia activa Sulcotriona

Envases



250 cc 1 L 5 L

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Época	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguri- dad (días)	Observaciones
	Post- emergencia	Juncia	1,-1,5 l/ ha	No Procede	En maíz de grano y forrajero: aplicar a una dosis de 1 a 1,5 l/ha de producto, con un volumen de caldo de 150-400 l/ha.
Maíz de grano y forrajero	Post- emergencia	Monocotile- dóneas	1,-1,5 l/ ha	No Procede	En maíz de grano y forrajero: aplicar a una dosis de 1 a 1,5 l/ha de producto, con un volumen de caldo de 150-400 l/ha.
	Post- emergencia	Malas hierbas de hoja ancha	1,-1,5 l/ ha	No Procede	En maíz de grano y forrajero: aplicar a una dosis de 1 a 1,5 l/ha de producto, con un volumen de caldo de 150-400 l/ha.
Maíz dulce	Post- emergencia	Malas hierbas de hoja ancha	1 l/ha	No Procede	En maíz dulce: aplicar a una dosis de 1 l/ha de producto con un volumen de caldo de 150-400 l/ha.
	Post- emergencia	Monocotile- dóneas	0,5 l/ha	No Procede	Aplicar a una dosis de 0.5 l/ha de producto con un volumen de caldo de 150-400 l/ha.
Sorgo	Post- emergencia	Malas hierbas de hoja ancha	0,5 l/ha	No Procede	Aplicar a una dosis de 0.5 l/ha de producto con un volumen de caldo de 150-400 l/ha.
	Post- emergencia	Juncia	0,5 l/ha	No Procede	Aplicar a una dosis de 0.5 l/ha de producto con un volumen de caldo de 150-400 l/ha.









Insecticida

|||||| Aikido®

Aikido® es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión en diversas plantaciones y cultivos. Se presenta en forma de suspención microencapsulada, confiriendo mayor seguridad al aplicador y una alta persistencia.

Número de registro 25640 Formulación Lambda-cihalotrin 10% (CS) Materia activa Lambda-cihalotrin

Envases



250cc 1L 5L

Aplicación por cultivo autorizada

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
	Pulgones	0,075 l/ha	28	
	Gusanos grises	0,075-0,2%	7	Dosis máxima 0,21/ha
Brécol	Mosca blanca	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,21/ha
	Orugas	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,21/ha
Cebada	Pulgones	0,075 l/ha	28	
	Gusanos grises	0,075-0,2%	7	Dosis máxima 0,21/ha
Coliflor	Mosca blanca	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,21/ha
	Orugas	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,21/ha
	Orugas	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,21/ ha.Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días.
Colirábano	Gusanos grises	0,075-0,2%	7	Dosis máxima 0,21/ ha.Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días.
	Mosca blanca	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,21/ ha.Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días.
Judías para grano	Mosca blanca	0,015-0,02%	7	Dosis máxima 0,21/ha
Judías verdes	Mosca blanca	0,015%-0,02%	7	Dosis máxima 0, 151/ha
Lechuga	Pulgones	0,0075%	7	Sólo aire libre. Máximo 1 aplicación. Dosis máxima 0,751/ha
	Taladro	0,0075-0,02%	60	Dosis máxima 0,21/ha
	Gusanos grises	0,075-0,2 l/ha	60	Dosis máxima 0,21/ha
Maíz	Delfacidos	0, 125-0,2 l/ha	60	Dosis máxima 0,21/ha
	Cicadelidos	0, 125-0,2 l/ha	60	Dosis máxima 0,21/ha
	Pulgones	0, 125-0,2 l/ha	60	Dosis máxima 0,21/ha

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
	Carpocapsa	0,0075-0,0125%	7	Dosis máxima 0, 1251/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Pulgones	0,0075-0,0125%	7	Dosis máxima 0, 1251/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
Manzano	Mosca de la fruta	0,0075-0,0125%	7	Dosis máxima 0, 1251/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Philaneus spumarius	0,0075-0,0125%	7	Dosis máxima 0, 1251/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
Olivo	Prays	0,0075%	No Procede	Iniciar el tratamiento antes de la apertura de las flores. Dosis máxima 0,0751/ha
	Philaneus spumarius	0,075 L/ha	No Procede	Contra philaenus spumarius
	Escarabajo	0,0075-0,02%	14	Dosis máxima 0,21/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
Patata	Gusanos grises	0,075-0,2 l/ha	14	Dosis máxima 0,21/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Carpocapsa	0,0075-0,015%	7	Dosis máxima 0, 151/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Pulgones	0,0125%	7	Dosis máxima 0, 1251/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
Peral	Mosca de la fruta	0,0075-0,015%	7	Dosis máxima 0, 151/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Psila	0,0075-0,015%	7	Dosis máxima 0, 151/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Philaneus spumarius	0,0075-0,015%	7	Dosis máxima 0, 151/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
Pimiento	Mosca blanca	0,015-0,02%	3	Dosis máxima 0,21/ha

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Remolacha Azucarera	Pulgones	0,015%	7	Dosis máxima 0,151/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Orugas	0,0075-0,025% (0,0075-0,015% en parral o espaldera)	3	Solo aire libre. Realizar 2 aplicaciones separadas al menos 10 días. Dosis máxima 0,251/ha (0,15 l/ha en parral o espaldera)
Tomate	Gusanos grises	0,075-0,2 l/ha	3	Efectuar un tratamiento generalizado al suelo a la aparición de la plaga. Dosis máxima 0,251/ha.
	Mosca blanca	0,0075-0,025% (0,0075-0,015% en parral o espaldera)	3	Solo aire libre. Realizar 2 aplicaciones separadas al menos 10 días. Dosis máxima 0,251/ha (0,15 l/ha en parral o espaldera)
Trigo	Pulgones	0,075 l/ha	28	









Nutricionales y Bioestimulantes

Formulación

MCDHS

|||||| ENR T-300®

eficiencia del nitrógeno aportado por cualquier tipo de fertilizante que contenga nitrógeno ureico. Está basado en la actividad inhibidora de la ureasa que presenta el compuesto químico MCDHS.

ENR T-300® es un formulado que aumenta la

ENR T-300® reduce la velocidad a la que la urea se hidroliza en el suelo. Al reducir la velocidad de conversión de la urea en amonio, se minimizan las pérdidas por volatilización de amoniaco NH3 a la atmósfera, así como las pérdidas por lixiviación de nitrato en el suelo. Por lo tanto, se aumenta la eficiencia del nitrógeno en forma uréica, se reducen los efectos fitotóxicos producidos en el cultivo por volatilización de amoniaco y se reduce cualquier impacto ambiental derivado de su uso.

Aplicación por cultivo autorizado

- Fertilizantes con contenido inferior al 15 % de nitrógeno ureico:
 1 L de ENR T-300 por cada 1.000 Kg fertilizante.
- Fertilizantes con contenido superior al 15 % de nitrógeno ureico:
 1,5 L de ENR T-300 por cada 1.000 Kg fertilizante.
- En caso de mezcla con diluciones de urea pura, aplicar 3 cc de ENR T-300 por cada Kg de urea.
- En el caso de mezcla con purín, aplicar 0,25 L de ENR T-300 por cada 1.000 L de purín, con un máximo de 5 L/ha.









Envases

26



ASCENZA

Nutricionales y Bioestimulantes

Formulación

Aminoácidos libres 2% p/p Nitrógeno (N) total 1,35% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p; Ácido algínico 1.5% p/p; Manitol 0.9% p/p; Prolina 2% p/p; Glicina Betaina: 10%

ON® (con tecnología GB) es un activador epigenético de última generación, desarrollado para inducir y maximizar las respuestas celulares y fisiológicas endógenas de las plantas implicadas en la superación de situaciones de estrés y el mantenimiento de una tasa metabólica óptima.Con la aplicación de ON® se consigue:

- Mayor cantidad y calidad de cosecha.
- Desarrollo vegetativo vigoroso y equilibrado.
- Defensa frente a estrés abiótico.
- Mejora de la floración y fertilidad del polen.
- Osmoregulación. Equilibra el balance hídrico celular.
- Protección enzimática frente a compuestos biológicamente tóxicos.

Envases



1 L 5 L

Aplicación por cultivo autorizada

Cultivo	Dosis	Observaciones
Hortícolas de fruto	200-300 cc/hL y aplicación	Realizar aplicaciones a intervalos de 10-15 días durante prefloración, engorde y maduración.
Hortícolas de hoja o flor	150 – 200 cc/hl	Aplicar desde 4-6 hojas. Realizar 2-3 aplicaciones a intervalos de 10-15 días o en cualquier momento de estrés.
Cítricos	200 cc/lh.	Realizar 2-3 aplicaciones en prefloración, desarrollo y engorde de fruto.
Frutales de hueso y pepita	200-300 cc/hl	2-3 aplicaciones desde caída de pétalos, durante el desarrollo y engorde de frutos.
Uva de mesa	300 cc/hl	2-3 aplicaciones durante el engorde y maduración de fruto.
Otros frutales y vid	200-300 сс	En prefloración, cuajado y desarrollo del fruto.
Fresón y berries	150-200 cc/hL y aplicación	Realizar 3 o 4 aplicaciones, con intervalos de 10-14 días, comenzando una semana después del trasplante.
Olivar	200-300 cc/hL y aplicación	En prefloración, cuajado y desarrollo del fruto o en cualquier momento de estrés.
Platanera	200 cc/hL y aplicación	En prefloración, cuajado y desarrollo del fruto o en cualquier momento de estrés.
Maíz	100 cc/hL y aplicación	Realizar 1 aplicación con plantas entre 25 o 50 cm. de altura.
Patata, remolacha	250-300 cc/hL	Inicio vegetación y desarrollo del cultivo.
Alfalfa y praderas	250 cc/hL	Al inicio de la vegetación y después de cada corte.
Cereales	100-250 cc/hL y aplicación	Realizar 1-2 aplicaciones entre encañado e inicio espigado.
Otros cultivos	200 cc/hL	











Formulación Abono con ácidos húmicos NPK 3-16,4-18 con Micronutrientes

Missylk®

MISSYLK®, con tecnología HBE, posee una exclusiva formulación a base de sustancias bioregeneradoras, anti estresantes y activadoras de los procesos fisiológicos de las plantas. MISSYLK® actúa:

- Activando procesos fisiológicos de resistencia a condiciones adversas.
- Produciendo un potente efecto bioestimulante.
- Mejorando la capacidad fotosintética y el estado nutricional de la planta.
- Estimulando la formación de raíces.

Así mismo, su empleo permite mejorar y transformar el medio en el que se desarrollan los cultivos al incrementar la disponibilidad y asimilación de los nutrientes por parte de estos y mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo.

MISSYLK® está formulado en forma de microgránulos de alta solubilidad.

Envases



1 Kg 5 Kg

Aplicación por cultivo autorizada

Cultivo	Acción Correctora	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Alfalfa	Estimular actividad vegetativa	3 - 5 Kg/ ha	No Procede	
Cereales	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No procede	
Céspedes	Estimular actividad vegetativa	3 - 5 Kg/ ha	No procede	
Cítricos	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No procede	FOLIAR: Aplicar en dosis de 1-2 Kg/ha
Fresales	Estimular actividad vegetativa	2-4 Kg/ha	No procede	FERTIRRIGACIÓN: 2-4 Kg/ha.Realizar 2-4 aplicaciones en función de las condiciones de estrés y de las demandas del cultivo.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No procede	FOLIAR: Aplicar en dosis de 1-2 Kg/ha.
Frutales	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No procede	5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
rrutales	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No procede	FOLIAR: Aplicar en dosis de 1-2 Kg/ha.
Hortícolas	Estimular actividad vegetativa	2-4 Kg/ha	No procede	FERTIRRIGACIÓN: 2-4 Kg/ha.Realizar 2-4 aplicaciones en función de las condiciones de estrés y de las demandas del cultivo.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar en dosis de 1-2 Kg/ha.
	Estimular actividad vegetativa	3-5 Kg/ha	No procede	
Maíz	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
Olivo	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No Procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.

Cultivo	Acción Correctora	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Olivo	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar en dosis de 1-2 Kg/ha.
Ornamentales	Estimular actividad vegetativa	2-4 Kg/ha	No Procede	FERTIRRIGACIÓN: 2-4 Kg/ha.Realizar 2-4 aplicaciones en función de las condiciones de estrés y de las demandas del cultivo
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar en dosis de 1-2 Kg/ha.
Patata	Estimular actividad vegetativa	3- 5 Kg/ha	No Procede	
Platanera	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No Procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar en dosis de 1-2 Kg/ha.
Remolacha	Estimular actividad vegetativa	3- 5 Kg/ha	No Procede	
Vid	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No Procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar en dosis de 1-2 Kg/ha.







TÚ DECIDES ASCENZA



32 ASCENZA

Consejos prácticos para una correcta aplicación de los productos fitosanitarios

Es importante respetar este orden para evitar posibles problemas de incompatibilidades.

		PRIMERO	
1°	Reguladores de pH*		
2°	Bolsas hidrosolubles (WSB)		
3°	Gránulos solubles (SG)		
4°	Gránulos dispersables (WG)		
5°	Polvos mojables (WP)		
6°	Acidificantes del caldo		
7°	Suspensiones concentradas (SC, Flow)		
8°	Suspensiones encapsuladas (CS)		
9°	Suspensiones Concentradas Oleosas (OD)		
10°	Líquidos emulsionables (EC, EW, ME)		
11°	Sufractantes / Mojantes		
12°	Líquidos solubles (SL)		
13°	Abonos foliares		
14°	Líquidos anti-deriva		
		ÚLTIMO	



NOTA: (*) Se introducirá en primer lugar sólo en caso de que se trate de reguladores especícos. Cuando se utilicen sustancias con propiedades mojantes y que tengan un efecto regulador de pH deberán introducirse en la cuba según el orden asignado a los surfactantes/mojantes. Antes de la aplicación del corrector de pH, el tanque deberá estar al menos al 80 % de llenado. Si, en función de los productos a mezclar en la cuba, se prevé una reacción ácida, la dosis de corrector de pH deberá ser ajustada. Se recomienda hacer un ajuste final del pH del tanque una vez se haya completado la mezcla de todos los productos. Excepción: en formulaciones de Fosetyl-Al hay que añadir las suspensiones concentradas (Flows) antes que los productos que confienen Fosetyl-Al.

34 ASCENZA



www.ascenza.es



Puedes descargar nuestra APP **Ascenza Plant** en Google Play para los sistemas Android y desde Apple Store para los sistemas IOS.