

CATÁLOGO ARROZ



**TÚ
DECIDES
ASCENZA**
Porque eres
imparable.



ASCENZA®
— FARMING YOUR FUTURE —

ASCENZA. CULTIVANDO TU FUTURO

En 2019 nace ASCENZA, integrada dentro del gran grupo corporativo Rovensa. ASCENZA viene ya operando en el mercado español desde hace más de 20 años como Sapec Agro.

ASCENZA es una compañía que tiene como actividad principal el Desarrollo y la Innovación (D+i) de soluciones fitosanitarias, nutricionales y bioestimulantes para la protección y nutrición de cultivos. Somos líderes en la Península Ibérica en el segmento de soluciones agrícolas off patent.

La central operativa en España está ubicada en Paterna (Valencia). Disponemos de un moderno almacén regulador en el Parque Industrial de Chinchilla (Albacete) dotado de las últimas medidas en lo que a logística y seguridad se refiere. Nuestros productos fitosanitarios se fabrican en Setúbal (Portugal) y los fitonutrientes y bioestimulantes en Sanchidrián (Ávila) y Campollano (Albacete).

En ASCENZA entendemos la complejidad de la agricultura y queremos seguir creciendo para ofrecerte soluciones completas con las que conseguir una agricultura sostenible y de calidad. Apostamos por la agricultura y los agricultores.



ROVENSA. AGRICULTURA EQUILIBRADA

ROVENSA es el nuevo nombre que adquiere el grupo Sapec Agro Business. Nace de la necesidad de responder a las tendencias actuales del mercado: crecimiento de la población, estilos de vida más saludables, consumidores más informados, distribuidores que necesitan defender la transparencia y agricultores que precisan garantizar una producción segura y de alta calidad.

ROVENSA es un grupo internacional de empresas con soluciones complementarias, un mercado independiente y una meta: cambiar la agricultura.

Vendemos productos a más de 70 países y tenemos oficinas en más de 25 países.

ROVENSA integra varias empresas y diferentes unidades de negocio con una cartera complementaria de productos y un objetivo común: cambiar hacia un modelo de Agricultura Equilibrada.

Ascenza, Tradecorp, Idai Nature, OGT, SDP, Microquímica y Agrichem, S.A. and Even Agro S.L son las empresas que a día de hoy conforman **ROVENSA**.

Las empresas que forman **ROVENSA** comparten sinergias y ofrecen un catálogo de productos complementarios con un objetivo común: la Agricultura Equilibrada. Este nuevo concepto combina el uso de distintas herramientas y estrategias para la protección de cultivos, nutrición especial y bioestimulación, y biocontrol para conseguir una agricultura equilibrada y que cumpla con los estándares más estrictos demandados por el consumidor.

ROVENSA busca transmitir a los agricultores que el futuro no es eco ni convencional, es lo mejor de cada uno de manera equilibrada, y sólo esta compañía es capaz de ofrecérselo de manera global.



ROVENSA
— WELL BALANCED AGRICULTURE —

ASCENZA en arroz


||||| Productos destacados

||||| **Placaje 25 SC[®]**

||||| **Stonic[®]**

||||| **ENR T-300[®]**

Lista de Productos para Arroz



FUNGICIDAS

Nombre de Producto / Composición

Número de registro

Placaje 25 SC®

Azoxistrobin 25% (SC)

Helmintosporium y piricularia

ES-00267



HERBICIDAS

Nombre de Producto / Composición

Número de registro

Acasto®

Pendimetalina 33% (EC)

Malas hierbas en pre o post-emergencia

NOVEDAD

ES-00490

Herpan 50®

MCPA 50% (SL)

Hoja ancha en post-emergencia

22720

Kaos B®

Bentazona 48% (SL)

Dicotiledóneas y ciperáceas.

25575

Stonic®

Clomazona 36% (CS)

Malas hierbas anuales

NOVEDAD

ES-00670



NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

Nombre de Producto / Composición

ENR T-300®

MCDHS 100 % (p/p)



Placaje 25 SC®

PLACAJE 25 SC® es un fungicida con gran efectividad y un espectro de acción polivalente.

El azoxistrobin es un fungicida translaminar y sistémico. La azoxistrobin pertenece a la familia química de las estrobirulinas, grupo químico de metoxiacrilatos pertenecientes al grupo de Inhibidores de la Quinona (QoI), clasificado dentro del grupo C3 según su Modo de Acción (MoA) por el FRAC (Comité de Acción contra la Resistencia Fungicida). Se absorbe a través de las raíces y se transloca en el xilema a los tallos y hojas, o a través de las superficies de las hojas hasta las puntas de las hojas y los bordes de crecimiento. El modo de acción es mediante la inhibición de la respiración mitocondrial en hongos. Inhibe la germinación de esporas, el crecimiento micelial y la producción de esporas de hongos. El azoxistrobin tiene actividad sistémica, con acción preventiva y curativa contra una amplia gama de enfermedades de las plantas causadas por hongos.

Número de registro
ES-00267

Formulación
Azoxistrobin 25%
(SC)

Materia activa
Azoxistrobin

Aplicación por cultivo autorizado

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | Plazo de seguridad (días) | Observaciones |
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|--|
| Arroz | Helmintosporium | 1 l/Ha | 28 | Aplicar desde el estado de hinchado medio (BBCH43) hasta el estado de grano pastoso duro (BBCH87).Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400 l/ha |
| | Piricularia | 1 l/Ha | 28 | Aplicar desde el estado de hinchado medio (BBCH43) hasta el estado de grano pastoso duro (BBCH87).Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400 l/ha |
| Calabacín | Oídio | 0,075-0,08% | 1 | Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. de 0,8 l/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha |
| Calabaza | Oídio | 0,08-1% | 3 | Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. de 0,8 l/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha |
| Cebada | Helmintosporium | 1 l/Ha | 35 | Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha |
| | Oídio | 1 l/Ha | 35 | Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 2. Volumen de caldo: 200-400l/Ha |
| | Roya parda | 1 l/Ha | 35 | Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos: 2. Volumen de caldo: 200-400l/Ha |

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | Plazo de seguridad (días) | Observaciones |
|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|--|
| Cebada | Escaldado de los cereales | 1 l/Ha | 35 | Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). N ^o máximo tratamientos: 2. Volumen de caldo: 200-400l/Ha |
| Melón | Oídio | 0,075-0,08% | 3 | Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del fruto (BBCH89).N ^o máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha |
| Pepinillo | Oídio | 0,075-0,08% | 1 | Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del fruto (BBCH89).N ^o máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha |
| Pepino de invernadero | Oídio | 0,075-0,08% | 1 | Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del fruto (BBCH89).N ^o máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha |
| Sandía | Oídio | 0,075-0,08% | 3 | Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx. de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del fruto (BBCH89).N ^o máximo tratamientos: 3. Intervalo 10. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha |
| Tomate de invernadero | Oídiopsis | 0,08-1% | 1 | Aplicación en invernadero. Pulverización manual, con un máximo de 1 L/ha. desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del fruto (BBCH89). N ^o máximo tratamientos: 2. Intervalos: 10. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha |
| Trigo | Podredumbre radicular | 1 l/Ha | 35 | Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). N ^o máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha |
| | Roya amarilla | 1 l/Ha | 35 | Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). N ^o máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha |
| | Oídio | 1 l/Ha | 35 | Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). N ^o máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha |
| | Septoriosis | 1 l/Ha | 35 | Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). N ^o máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha |
| | Roya parda | 1 l/Ha | 35 | Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo (BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). N ^o máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha |



Envases



5 L



STONIC® es un herbicida que contiene clomazona. La Clomazona interfiere con el desarrollo de los cloroplastos y reduce o previene la acumulación de pigmentos plastídicos en las especies susceptibles. El tratamiento con clomazona produce blanqueamiento (de apariencia blanco, amarillo o verde pálido) en las plántulas, dependiendo de las especies y/o método y dosis de tratamiento. Clomazona inhibe la formación de isoprenoides del cloroplasto que incluye los pigmentos fotosintéticos (phytol cadena lateral de la clorofila) carotenoides, transportadores de electrones (plastoquinona), tocoferol y hormonas (giberelinas) en plantas superiores. Es absorbida por las raíces y meristemas apicales con traslocación acrópeta.

STONIC® se utiliza en el control de mono y dicotiledóneas anuales y se puede aplicar en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malas hierbas y especies de cultivo tolerantes.

Número de registro
ES-01154

Formulación
Florasulan 5%
(SC)

Materia activa
Florasulan

Aplicación por cultivo autorizado

| Cultivo | Mala hierba | Dosis | Plazo de seguridad (días) | Vol. Caldo | Observaciones |
|---------|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|---|
| Arroz | Malas hierbas anuales | 0,5 - 0,7 l/ha | 1 | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia (en agua), entre BBCH 11-12. |
| Colza | Malas hierbas anuales | 0,33 l/ha | 1 | 200 - 400 l/ha | Aplicar en pre-emergencia, máximo 5 días después de la siembra. |
| Patata | Malas hierbas anuales | 0,25 - 0,3 l/ha | 1 | 200 - 400 l/ha | Aplicar en pre-emergencia, máximo 7 días antes de la emergencia. Reducir la dosis a 0,2 l/ha en el caso de terrenos ligeros y sin materia orgánica y en las variedades precoces Agata y Seglinde. |

Envases



5L

Nutricionales y
Bioestimulantes



ENR T-300®

ENR T-300® es un formulado que aumenta la eficiencia del nitrógeno aportado por cualquier tipo de fertilizante que contenga nitrógeno ureico. Está basado en la actividad inhibidora de la ureasa que presenta el compuesto químico MCDHS.

Formulación
MCDHS

ENR T-300® reduce la velocidad a la que la urea se hidroliza en el suelo. Al reducir la velocidad de conversión de la urea en amonio, se minimizan las pérdidas por volatilización de amoníaco NH_3 a la atmósfera, así como las pérdidas por lixiviación de nitrato en el suelo. Por lo tanto, se aumenta la eficiencia del nitrógeno en forma uréica, se reducen los efectos fitotóxicos producidos en el cultivo por volatilización de amoníaco y se reduce cualquier impacto ambiental derivado de su uso.

Aplicación por cultivo autorizado

- **Fertilizantes con contenido inferior al 15 % de nitrógeno ureico:**
1 L de ENR T-300 por cada 1.000 Kg fertilizante.
- **Fertilizantes con contenido superior al 15 % de nitrógeno ureico:**
1,5 L de ENR T-300 por cada 1.000 Kg fertilizante.
- En caso de mezcla con diluciones de urea pura, aplicar 3 cc de ENR T-300 por cada Kg de urea.
- En el caso de mezcla con purín, aplicar 0,25 L de ENR T-300 por cada 1.000 L de purín, con un máximo de 5 L/ha.



TÚ
DECIDES
ASCENZA

Envases



5 L



ASCENZA®

— FARMING YOUR FUTURE —

www.ascenza.es

