CATÁLOGO HORTÍCOLAS

TÚ DECIDES ASCENZA

ASCENZA®
FARMING YOUR FUTURE

ASCENZA en hortícolas

Productos destacados

- Actlet C®
- Centinela 10 EC®
- Spyrit 50 SC®
- Spyrit Pro®
- Circus 25 WG®
- Aikido®
- Delta EC®
- Sondae®
- Missylk®
- ON®

Lista de productos para hortícolas 2020

FUNGICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Actlet C® Metalaxil-M 28,5 g/l + Hidróxido de cobre 215 g/l (SC) ***Phytophthora infestans***	ES-00713
Azupec Micro WG® Azufre 80% (WG) ***Oídio***	24416
Centinela 10 EC® Penconazol 10% (EC) ***Oídio***	24064
Ceremonia 25 EC® Difenoconazol 25% (EC) ***Septoria y alternaria***	24410
Cimoxate CU® Cimoxanilo 3%, Sulf. Cuprocálcico 22,5% (WP) ***Mildiu***	23563
Cimoxate Mz WG® Cimoxamilo 4%, Mancozeb 46,5% (WP) ***Mildiu***	ES-00216
Cuper 50 (antes cuprital)® Oxicloruro de Cobre 50% (WP) ***Antracnosis, alternaria, bacteriosis y mildiu***	22287
Grano de Oro 98,5® Azufre 98,5% (DP) ***Oídio y oídiopsis***	13325
Manzivex 80 WP® Mancozeb 80% (WP) ***Mildiu y alternaria***	13789
Placaje 25 SC® Azoxistrobin 25% (SC) ***Oídio***	ES-00267
Spyrit 50 SC® Dimetomorf (SC) ***Mildiu***	ES-00365
Spyrit M WG® Dimetomorf 7,5%, Mancozeb 66,7% (WG) ***Mildiu***	ES-00295
Spyrit Pro® Dimetomorf 9%, Propamocarb 50% (SC) ***Mildiu***	
Tasis 12,5 EC® Miclobutanil 12,5% (EC) ***Oídio***	24266

HERBICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Athir Max® Fluazifop-p-butil 12,5% (EC) ***Gramíneas anuales***	24692
Circus 25 WG® Rimsulfuron 25% (WG) ***Dicotiédoneas y gramíneas en post-emergencia***	ES-00245
Sabba® Pendimetalina 33% (EC) ***Dicotiledoneas en pre-emergencia o post-emergencia precoz***	25767

Lista de productos para hortícolas 2020

INSECTICIDAS

Nombre de Producto / Composición	Número de registro
Aikido® Lambda-cihalotrin 10% (CS) ***Orugas, mosca blanca, gusanos grises, pulgones y escarabajos***	25640
Boreal® Abamectina 1,8% (EC) ***Ácaros en berenjena, curcurbitáceas, lechuga y tomate***	21854
Delta EC® Deltametrin 2,5% (EC) ***Orugas, pulgones y escarabajo de la patata***	25706
Expedient 10 EC® Piriproxifen 10% (EC) ***Mosca blanca***	24252
Sondae® Oxamilo 10% (SL) ***Nemátodos***	ES-00131

NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES

Nombre de Producto / Composición	
Missylk® Aminoácidos libres: 22,2% p/p, Nitrógeno (N) total: 3.0% p/p, Pentóxido de fósforo (P_2O_5): 16.4% p/p, Óxido de potasio (K_2O): 18.0% p/p, Manganeso (Mn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Molibdeno (Mo): 0.25% p/p, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 0.2% p/p, Hierro (Fe) quelado por EDDHA: 0,10% p/p, Extracto húmico total: 29.1% p/p, Ácidos húmicos: 14.0% p/p, Ácidos fúlvicos: 15.1% p/p	
ON® Aminoácidos libres 2% p/p, Nitrógeno (N) total 1,35% p/p, Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p, Ácido algínico 1.5% p/p, Manitol 0.9% p/p, Prolina 2% p/p; Glicina Betaina: 10%	NOVEDAD

ASCENZA



Fungicida

Actlet C®

ACTLET C® es un fungicida que contiene metalaxil-M e Hidróxido de cobre. Metalaxil-M inhibe el crecimiento micelial y la formación de esporas. Metalaxil-M inhibe el hongo interfiriendo selectivamente con la síntesis de ARN ribosómico. Metalaxil-M es un fungicida sistémico que se absorbe muy rápidamente después de la aplicación foliar. La traslocación del compuesto es principalmente acrópeta protegiendo los nuevos crecimientos. Metalaxil-M está dentro del grupo A1 del FRAC de acuerdo a su modo de acción.

El hidróxido de cobre es buen protector, contacto, multisitio y no sistémico por lo que complementa muy bien la acción de M-Metalaxil al usarlos en mezcla de proporciones adecuadas. El cobre está dentro del grupo M1 del FRAC de acuerdo a su modo de acción.

Número de registro
ES-00713

Formulación
Metalaxil-M 2,85% + Hidróxido de cobre 21,5% (SC)

Materia activa
Metalaxil-m + Hidróxido De Cobre

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Berenjena	Mildiu	3,5 L/ha	10 aire libre / 3 invernadero	Aire libre e invernadero. Autorizado contra Phythophthora infestans. Aplicar desde 9 o más brotes apicales laterales visibles (BBCH 29) hasta comienzo de la maduración de frutos y semillas (BBCH 81). Volumen 500-1000L/ha. Nº máximo tratamientos:3 Intervalo entre aplicaciones: 7-10 días
Patata	Mildiu	3,5 L/ha	21	Autorizado contra Phythophthora infestans. Uso al aire libre. Aplicar desde 60% de las plantas se tocan entre hileras (BBCH 36) hasta comienzo de la maduración de frutos y semillas (BBCH 81). Volumen 500-1000L/ha. Nº máximo tratamientos:3 Intervalo entre aplicaciones: 7-10 días
Tomate	Mildiu	3,5 L/ha	10 aire libre / 3 invernadero	Aire libre e invernadero. Autorizado contra Phythophthora infestans. Aplicar desde 9 o más brotes apicales laterales visibles (BBCH 29) hasta comienzo de la maduración de frutos y semillas (BBCH 81). Volumen 500-1000L/ha. Nº máximo tratamientos:3 Intervalo entre aplicaciones: 7-10 días

Envases

5 L

Fungicida

Centinela 10 EC®

CENTINELA 10 EC® es un fungicida antiOídio, sistémico, que protege las nuevas brotaciones, con acción preventiva y curativa, y con notable persistencia, evitando y deteniendo los ataques de Oídio sobre racimos, hojas y sarmientos. La sustancia activa Penconazol, gracias a su rapidez de penetración en la planta no es lavada por lluvias posteriores al tratamiento.

Número de registro
24064

Formulación
Penconazol 10% (EC)

Materia activa
Penconazol

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Albaricoquero	Oídio	0,03-0,04%	14	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días entre las mismas. En frutales de hueso (melocotón, nectarino y albaricoquero) aplicar desde BBCH 01 (comienzo del hinchado de las yemas foliares) hasta BBCH 71 (crecimiento del ovario; los frutos no cuajados se caen).
Cucurbitaceas	Oídio	0,03-0,04%	3	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días entre las mismas. En cucurbitáceas (aire libre e invernadero) aplicar desde BBCH 14 (3ª hoja verdadera del tallo principal desplegada) hasta BBCH 79 (el 90% de los frutos sobre el tallo principal ha alcanzado el tamaño y la forma típicas).
Frutales de pepita	Oídio	0,03-0,04%	14	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días entre las mismas.En frutales de pepita, aplicar desde BBCH 01 (comienzo del hinchado de las yemas foliares) hasta BBCH 71 (crecimiento del ovario; los frutos no cuajados se caen).
Melocotonero	Oídio	0,03-0,04%	14	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días entre las mismas. En frutales de hueso (melocotón, nectarino y albaricoquero) aplicar desde BBCH 01 (comienzo del hinchado de las yemas foliares) hasta BBCH 71 (crecimiento del ovario; los frutos no cuajados se caen).
Nectarino	Oídio	0,03-0,04%	14	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días entre las mismas. En frutales de hueso (melocotón, nectarino y albaricoquero) aplicar desde BBCH 01 (comienzo del hinchado de las yemas foliares) hasta BBCH 71 (crecimiento del ovario; los frutos no cuajados se caen).
Tomate de invernadero	Oídio	0,03-0,04%	3	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días entre las mismas. En tomate (invernadero) aplicar desde BBCH 61 (flor abierta) hasta BBCH 81 (el 10% de los frutos muestra el color típico de madurez).
Vid	Oídio	0,03-0,04%	14	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días entre las mismas. desde BBCH 13 (3 hojas desplegadas) hasta BBCH 79 (todas las bayas de un racimo se tocan).

Envases

1 L

Fungicida

Spyrit 50 SG®

SPYRIT 50 SG ® es un fungicida que contiene la sustancia activa dimetomorf para aplicación por pulverización foliar manual y mecánica.

Dimetomorf es un fungicida penetrante con actividad preventiva curativa y anti-esporulante contra Oomycetos (mildius). Dimetomorf es una amida del ácido cinámico, que pertenece al grupo de las Amidas de Ácidos Carboxílicos (CAA), clasificadas dentro del grupo H5 del Comité de Acción sobre la Resistencia a Fungicidas (FRAC) de acuerdo a su modo de acción.

SPYRIT 50 SG ® se aplica en pulverización foliar sobre las hojas de los cultivos y tiene actividad preventiva, curativa y erradicante Se aplica para el control de *Plasmopara viticola* (mildiu) en vid, *Phytophthora infestans* (mildiu) en patata y *Bremia lactucae* (Mildiu en lechuga).

Número de registro
ES-00370

Formulación
Dimetomorf 50% SC

Materia activa
Dimetomorf 50%

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Lechuga y similares	Mildiu	0.4 L/ha	7-10	Aplicar al aire libre. Estado del cultivo BBCH 12-49 Volumen de caldo 500-1000
Patata	Mildiu	0.4-0.5 L/ha	7-10	Estado del cultivo BBCH 12-81 Volumen de caldo 500-1000
Vid de mesa	Mildiu	0.5 L/ha	13	Estado del cultivo BBCH 18-77 Volumen de caldo 200-1000
Vid de vinificacion	Mildiu	0.5 L/ha	13	Estado del cultivo BBCH 18-77 Volumen de caldo 200-1000

Envases

5 L

Fungicida

Spyrit Plus WG®

SPYRIT PLUS WG® está constituido por 3 sustancias activas: Dimethomorf es un fungicida penetrante con actividad preventiva, curativa y antiesporulante frente a Oomicetos (Mildius).

Folpet es un fungicida protector foliar con acción preventiva perteneciente al grupo químico de las Phtalimidas, con modo de acción multisitio. Fosetil-Al es un fungicida sistémico con acción protectora. Se absorbe a través de las hojas con translocación ascendente y descendente.

La combinación de estos fungicidas hace de SPYRIT PLUS WG un fungicida foliar con triple modo de acción, altamente resistente al lavado que presenta larga persistencia de acción y una muy elevada eficacia en el control del mildiu de la vid (*Plasmopara vitícola*).

Número de registro
ES-00240

Formulación
Dimetomorf 6% + Fosetil 50% + Folpet 25% (WG)

Materia activa
Dimetomorf + Fosetil +Folpet

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Vid de vinificacion	Mildiu	3 Kg/ha	28	Aplicar desde 8 hojas desplegadas hasta que las bayas comienzan a tocarse (BBCH018-77). 1 Aplicación. Volumen de 200-1000 l/ha

TÚ DECIDES ASCENZA

Envases

3 kg

Herbicida

Circus 25 WG®

CIRCUS 25 WG® es un herbicida sistémico selectivo, que es absorbido por las raíces y las hojas, con rápida traslocación a los tejidos meristemáticos. Rimsulfuron es una sulfonilurea para tratamientos herbicidas contra malas hierbas, gramíneas y dicotiledóneas en post-emergencia de las mismas en tomate, patata y maíz al aire libre.

Es necesaria la adición de un coadyuvante humectante a fin de mejorar la absorción del producto por las hojas de las malas hierbas.

Número de registro
ES-00245

Formulación
Rimsulfuron 25% (WG)

Materia activa
Rimsulfurom

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Época	Mala hierba	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Maíz	Post-emergencia	Gramíneas	50 gr/ha	No Procede	Tratar en todos los casos en post-emergencia del maíz durante el estado de BBCH12-14 (desarrollo del tallo principal, desde 2 hasta 4 hojas desplegadas). Para conseguir los mejores resultados siga las instrucciones de la etiqueta.
	Post-emergencia	Dicotiledóneas	50 gr/ha	No Procede	Tratar en todos los casos en post-emergencia del maíz durante el estado de BBCH12-14 (desarrollo del tallo principal, desde 2 hasta 4 hojas desplegadas). Para conseguir los mejores resultados siga las instrucciones de la etiqueta.
Patata	Post-emergencia	Dicotiledóneas	60 gr/ha	No Procede	Tratar cuando la patata se encuentre en la fase de formación de brotes laterales (BBCH 20-30). Para conseguir los mejores resultados siga las instrucciones de la etiqueta.
	Post-emergencia	Gramíneas	0,3-0,4%	No Procede	Tratar cuando la patata se encuentre en la fase de formación de brotes laterales (BBCH 20-30). Para conseguir los mejores resultados siga las instrucciones de la etiqueta.
Tomate	Post-emergencia	Dicotiledóneas	60 gr/ha	No Procede	Tratar desde la tercera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta 8 hojas del tallo principal desplegadas (BBCH 13-18). Para conseguir los mejores resultados siga las instrucciones de la etiqueta.
	Post-emergencia	Gramíneas	60 gr/ha	No Procede	Tratar desde la tercera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta 8 hojas del tallo principal desplegadas (BBCH 13-18). Para conseguir los mejores resultados siga las instrucciones de la etiqueta.

Envases

100 g

Insecticida

Sondae®

SONDAE® es un potente nematicida que actúa por contacto e ingestión produciendo la parálisis y muerte de los organismos afectados. Tiene un efecto de inhibición de la eclosión así como de la alimentación y el movimiento, provocando finalmente la muerte.

Número de registro
ES-00131

Formulación
Oxamilo 10% (SL)

Materia activa
Oxamilo

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Berenjena de invernadero	Nemátodos	10l/ha. Máx. 30 l/ha	21	Aplicar mediante riego por goteo en siembra/trasplante a dosis de 10 L/ha por aplicación, pudiendo darse una primera aplicación a 20 L/ha. Con un máximo de 30 L/ha por campaña, con un intervalo entre aplicaciones de 20 días.
Cucurbitáceas de piel comestible en invernadero	Nemátodos	10l/ha. Máx. 30 l/ha	21	Aplicar mediante riego por goteo en siembra/trasplante a dosis de 10 L/ha por aplicación, pudiendo darse una primera aplicación a 20 L/ha. Con un máximo de 30 L/ha por campaña, con un intervalo entre aplicaciones de 20 días.
Pimiento de invernadero	Nemátodos	10l/ha. Máx. 30 l/ha	21	Aplicar mediante riego por goteo en siembra/trasplante a dosis de 10 L/ha por aplicación, pudiendo darse una primera aplicación a 20 L/ha. Con un máximo de 30 L/ha por campaña, con un intervalo entre aplicaciones de 20 días.
Platanera	Nemátodos	10l/ha. Máx. 30 l/ha	7	Sólo en invernadero. Realizar 3 aplicaciones en total, mediante riego por goteo, al inicio de la infestación, con un intervalo de 20 días entre las aplicaciones, a una dosis de 10 l/ha. No superar la dosis máxima por campaña de 30 l/ha.
Tomate de invernadero	Nemátodos	10l/ha. Máx. 30 l/ha	21	Aplicar mediante riego por goteo en siembra/trasplante a dosis de 10 L/ha por aplicación, pudiendo darse una primera aplicación a 20 L/ha. Con un máximo de 30 L/ha por campaña, con un intervalo entre aplicaciones de 20 días.

Envases

5 L

Insecticida

Aikido®

Aikido® es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión en diversas plantaciones y cultivos. Se presenta en forma de suspención microencapsulada, confiriendo mayor seguridad al aplicador y una alta persistencia.

Número de registro
25640

Formulación
Lambda-cihalotrin 10% (CS)

Materia activa
Lambda-cihalotrin

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Avena	Pulgones	0,075 l/ha	28	
Brécol	Gusanos grises	0,075-0,2%	7	Dosis máxima 0,2l/ha
	Mosca blanca	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,2l/ha
	Orugas	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,2l/ha
Cebada	Pulgones	0,075 l/ha	28	
Coliflor	Gusanos grises	0,075-0,2%	7	Dosis máxima 0,2l/ha
	Mosca blanca	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,2l/ha
	Orugas	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,2l/ha
Colirábano	Orugas	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,2l/ha.Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días.
	Gusanos grises	0,075-0,2%	7	Dosis máxima 0,2l/ha.Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días.
	Mosca blanca	0,0075-0,02%	7	Dosis máxima 0,2l/ha.Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días.
Judías para grano	Mosca blanca	0,015-0,02%	7	Dosis máxima 0,2l/ha
Judías verdes	Mosca blanca	0,015%	7	Dosis máxima 0,15l/ha
Lechuga	Pulgones	0,0075%	7	Sólo aire libre.Máximo 1 aplicación. Dosis máxima 0,75l/ha
Maíz	Taladro	0,0075-0,02%	60	Dosis máxima 0,2l/ha
	Gusanos grises	0,075-0,2 l/ha	60	Dosis máxima 0,2l/ha
	Delfacidos	0,125-0,2 l/ha	60	Dosis máxima 0,2l/ha
Maíz	Cicadelidos	0,125-0,2 l/ha	60	Dosis máxima 0,2l/ha
	Pulgones	0,125-0,2 l/ha	60	Dosis máxima 0,2l/ha
Manzano	Carpocapsa	0,0075-0,0125%	7	Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Pulgones	0,0075-0,0125%	7	Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Mosca de la fruta	0,0075-0,0125%	7	Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Philaneus spumarius	0,0075-0,0125%	7	Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
Olivo	Prays	0,0075%	No Procede	Iniciar el tratamiento antes de la apertura de las flores. Dosis máxima 0,075l/ha
	Philaneus spumarius	0,075 L/ha	No Procede	Contra Philaenus Spumarius
Patata	Escarabajo	0,0075-0,02%	14	Dosis máxima 0,2l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Gusanos grises	0,075-0,2 l/ha	14	Dosis máxima 0,2l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
Peral	Carpocapsa	0,0075-0,015%	7	Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Pulgones	0,0125%	7	Dosis máxima 0,125l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Mosca de la fruta	0,0075-0,015%	7	Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Psila	0,0075-0,015%	7	Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
	Philaneus spumarius	0,0075-0,015%	7	Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
Pimiento	Mosca blanca	0,015-0,02%	3	Dosis máxima 0,2l/ha
Remolacha Azucarera	Pulgones	0,015%	7	Dosis máxima 0,15l/ha. Máximo 2 aplicaciones separadas 15 días
Tomate	Orugas	0,0075-0,025% (0,0075-0,015% en parral o espaldera)	3	Solo aire libre. Realizar 2 aplicaciones separadas al menos 10 días. Dosis máxima 0,25l/ha (0,15 l/ha en parral o espaldera)
	Gusanos grises	0,075-0,2 l/ha	3	Efectuar un tratamiento generalizado al suelo a la aparición de la plaga. Dosis máxima 0,25l/ha.
	Mosca blanca	0,0075-0,025% (0,0075-0,015% en parral o espaldera)	3	Solo aire libre. Realizar 2 aplicaciones separadas al menos 10 días. Dosis máxima 0,25l/ha (0,15 l/ha en parral o espaldera)
Trigo	Pulgones	0,075 l/ha	28	

Envases

250 cc
1 L
5 L

ASCENZA

Insecticida

Delta EC®

DELTA EC® es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, con amplio espectro de actividad contra los insectos nocivos. Dotado de una rápida acción inicial permite una protección de las plantas suficientemente duradera con una gran seguridad de uso.

Número de registro
25706

Formulación
Deltametrina 2,5% (EC)

Materia activa
Deltametrina

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Adormidera	Pulgones	0,2 l/ha	45	Realizar 4 tratamientos en total, mediante pulverización foliar, con un intervalo de 14 días entre las aplicaciones, a una dosis de 0,2 l/ha, con un volumen de caldo de 500 l/ha.
	Orugas defoliadoras	0,2 l/ha	45	Realizar 4 tratamientos en total, mediante pulverización foliar, con un intervalo de 14 días entre las aplicaciones, a una dosis de 0,2 l/ha, con un volumen de caldo de 500 l/ha.
Albaricoquero	Pulgones	0,03-0,06%	3	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Almendro	Barrenillo	0,5 l/ha	3	Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.
	Pulgones	0,5 l/ha	3	Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.
	Orugas defoliadoras	0,5 l/ha	3	Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.
	Tigre	0,5 l/ha	3	Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.
	Anarsia	0,5 l/ha	3	Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.
	Empoasca	0,5 l/ha	3	Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.
	Orugueta (aglaope infausta)	0,5 l/ha	3	Aplicar en pulverización foliar, en una única aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 0.5 L/ha.
Avellano	Pulgones	0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.
Brassica	Orugas	0,03-0,05%	7	Brócoli, coliflor, coles de Bruselas, coles acogolladas y otras coles, excepto col china, berza y colirrábano Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
Calabacín	Orugas	0,3-0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.
	Pulgones	0,3-0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.
Cereales	Polilla	0,3-0,5 l/ha	30	Número máximo de aplicaciones 1.
	Pulgones	0,3-0,5 l/ha	30	Número máximo de aplicaciones 1.
Cerezo	Pulgones	0,03-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Ciruelo	Pulgones	0,03-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Frutales de pepita	Pulgones	0,03-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3 Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Frutales de pepita	Psila	0,03-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
	Carpocapsa	0,03-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
	Philaneus spumarius	0,03-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3 Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Lechuga y similares	Pulgones	0,03-0,05%	14	Excepto escarola. Número máximo de aplicaciones 3, Intervalo mínimo entre aplicaciones 7 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
	Orugas	0,03-0,05%	14	Excepto escarola. Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 7 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
Maíz	Orugas	0,3-0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.
	Diabrótica	0,3-0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.
Melocotonero	Pulgones	0,03-0,06%	3	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Nectarino	Pulgones	0,03-0,06%	3	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Olivo	Mosca	0,04-0,06%	7	Bractocera oleae. Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones: 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
	Prays	0,04-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
	Barrenillo	0,04-0,06%	7	Phloeotribus scarabaeoides. Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
	Philaneus spumarius	0,04-0,06%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,6 l/ha por aplicación.
Ornamentales herbáceas	Pulgones	0,5 l/ha	No procede	Número máximo de aplicaciones 1.
	Philaneus spumarius	0,5 l/ha	No Procede	Número máximo de aplicaciones 1.
Ornamentales leñosas	Pulgones	0,5 l/ha	No procede	Número máximo de aplicaciones 1.
Patata	Orugas	0,03-0,05%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
	Escarabajo	0,03-0,05%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
	Pulgones	0,03-0,05%	7	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
Tomate	Pulgones	0,03-0,05%	3	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
	Orugas	0,03-0,05%	3	Número máximo de aplicaciones 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. No sobrepasar 0,5 l/ha por aplicación.
Vid	Polilla	0,4-0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.
	Cicadelidos	0,4-0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.
	Philaneus spumarius	0,4-0,5 l/ha	3	Número máximo de aplicaciones 1.

Envases

1 L
5 L

Nutricionales y Bioestimulantes

Missylk®

MISSYLK®, con tecnología HBE, posee una exclusiva formulación a base de sustancias bio-regeneradoras, anti estresantes y activadoras de los procesos fisiológicos de las plantas. **MISSYLK®** actúa:

- Activando procesos fisiológicos de resistencia a condiciones adversas.
- Produciendo un potente efecto bioestimulante.
- Mejorando la capacidad fotosintética y el estado nutricional de la planta.
- Estimulando la formación de raíces.

Así mismo, su empleo permite mejorar y transformar el medio en el que se desarrollan los cultivos al incrementar la disponibilidad y asimilación de los nutrientes por parte de estos y mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo.

MISSYLK® está formulado en forma de microgránulos de alta solubilidad.

Formulación
Abono con ácidos húmicos NPK 3-16,4-18 con Micronutrientes

TÚ DECIDES ASCENZA

Envases

1 Kg
5 Kg

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Acción Correctora	Dosis	Plazo de seguridad (días)	Observaciones
Alfalfa	Estimular actividad vegetativa	3 - 5 Kg/ha	No Procede	
Cereales	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No procede	
Céspedes	Estimular actividad vegetativa	3 - 5 Kg/ha	No procede	
Cítricos	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha
Fresales	Estimular actividad vegetativa	2-4 Kg/ha	No procede	FERTIRRIGACIÓN: 2-4 Kg/ha.Realizar 2-4 aplicaciones en función de las condiciones de estrés y de las demandas del cultivo.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
Frutales	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No procede	5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
Hortícolas	Estimular actividad vegetativa	2-4 Kg/ha	No procede	FERTIRRIGACIÓN: 2-4 Kg/ha.Realizar 2-4 aplicaciones en función de las condiciones de estrés y de las demandas del cultivo.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
Maíz	Estimular actividad vegetativa	3-5 Kg/ha	No procede	
	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
Olivo	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No Procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
Ornamentales	Estimular actividad vegetativa	2-4 Kg/ha	No Procede	FERTIRRIGACIÓN: 2-4 Kg/ha.Realizar 2-4 aplicaciones en función de las condiciones de estrés y de las demandas del cultivo
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
Patata	Estimular actividad vegetativ	3- 5 Kg/ha	No Procede	
Platanera	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No Procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.
Remolacha	Estimular actividad vegetativa	3- 5 Kg/ha	No Procede	
Vid	Estimular actividad vegetativa	5 Kg/ha	No Procede	FERTIRRIGACIÓN: 5 Kg/ha. 1 a 2 aplicaciones al inicio de actividad vegetativa.
	Estimular actividad vegetativa	1-2 Kg/ha	No Procede	FOLIAR: Aplicar a dosis de 1-2 Kg/ha.

Nutricionales y Bioestimulantes

ON®

ON® (con tecnología GB) es un activador epigenético de última generación, desarrollado para inducir y maximizar las respuestas celulares y fisiológicas endógenas de las plantas implicadas en la superación de situaciones de estrés y el mantenimiento de una tasa metabólica óptima.

Con la aplicación de ON® se consigue:

- Mayor cantidad y calidad de cosecha.
- Desarrollo vegetativo vigoroso y equilibrado.
- Defensa frente a estrés abiótico.
- Mejora de la floración y fertilidad del polen.
- Osmoregulación. Equilibra el balance hídrico celular.
- Protección enzimática frente a compuestos biológicamente tóxicos.

Formulación
Aminoácidos libres 2% p/p Nitrógeno (N) total 1,35% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 1,35% p/p; Ácido algínico 1.5% p/p; Manitol 0.9% p/p; Prolina 2% p/p; Glicina Betaina: 10%

Aplicación por cultivo autorizado

Cultivo	Dosis	Observaciones
Hortícolas de fruto	200-300 cc/hL y aplicación	Realizar aplicaciones a intervalos de 10-15 días durante prefloración, engorde y maduración.
Hortícolas de hoja o flor	150 – 200 cc/hl	Aplicar desde 4-6 hojas. Realizar 2-3 aplicaciones a intervalos de 10-15 días o en cualquier momento de estrés.
Cítricos	200 cc/lh.	Realizar 2-3 aplicaciones en prefloración, desarrollo y engorde de fruto.
Frutales de hueso y pepita	200-300 cc/hl	2-3 aplicaciones desde caída de pétalos, durante el desarrollo y engorde de frutos
Uva de mesa	300 cc/hl	2-3 aplicaciones durante el engorde y maduración de fruto.
Otros frutales y vid	200-300 cc	En prefloración, cuajado y desarrollo del fruto.
Fresón y berries	150-200 cc/hL y aplicación	Realizar 3 o 4 aplicaciones, con intervalos de 10-14 días, comenzando una semana después del trasplante.
Olivar	200-300 cc/hL y aplicación	En prefloración, cuajado y desarrollo del fruto o en cualquier momento de estrés.
Platanera	200 cc/hL y aplicación	En prefloración, cuajado y desarrollo del fruto o en cualquier momento de estrés.
Maíz	100 cc/hL y aplicación	Realizar 1 aplicación con plantas entre 25 o 50 cm. de altura.
Patata, remolacha	250-300 cc/hL	Inicio vegetación y desarrollo del cultivo.
Alfalfa y praderas	250 cc/hL	Al inicio de la vegetación y después de cada corte.
Cereales	100-250 cc/hL y aplicación	Realizar 1-2 aplicaciones entre encañado e inicio espigado.
Otros cultivos	200 cc/hL	

Envases

1 L
5 L

ASCENZA

ASCENZA®

www.ascenza.es

Puedes descargar nuestra APP **Ascenza Plant** en Google Play para los sistemas Android
y desde Apple Store para los sistemas IOS.