

# Actlet® C

Cultivo	Enfermedad	Dosis (l/ha)	Volumen de caldo	Nº tratamientos	Intervalo de aplicaciones	Estado del cultivo	Plazo Seguridad
Patata	<i>Phytophthora infestans</i>	3,5 L/ha	500-1000 L/ha	3	7-10 días	BBCH 36-81	21 días
Tomate y Berenjena (aire libre e invernadero)	<i>Phytophthora infestans</i>	3,5 L/ha	500-1000 L/ha	3	7-10 días	BBCH 29-81	10 días en aire libre 3 días en invernadero

EDICIÓN: Mayo 2019



NUEVO  
2019



# Actlet® C

## Fungicida



**DIFFERENTIATION**  
LEADING TRENDS  
COMPETITIVE ADVANTAGE  
ADAPTED SOLUTIONS  
INDEPENDENCE  
ECONOMIC DRIVING FORCE  
INNOVATION  
ADD VALUE  
INTERNATIONAL PRESENCE



**IT MEANS**  
Competitiveness, quality and innovation by Sapec Agro Business



[www.ascenza.es](http://www.ascenza.es)

ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA, S.A.U Parque Empresarial TÁCTICA C/ Botiguers, nº 3 - 4ª Planta. 46980 - Paterna (Valencia) Telf. 96 134 51 50 / Fax. 96 134 35 10



## TODA LA EFICACIA DEL METALAXIL-M PARA EL CONTROL DE MILDIU

ACTLET® C combina la acción del Metalaxil-M y del Hidróxido de Cobre, convirtiéndose en una solución única con actividad preventiva, curativa y antiesporulante para el control de **mildiu** en **patata**, **berenjena** y **tomate**.



[www.ascenza.es](http://www.ascenza.es)

ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA. USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.  
La información del folleto no exime de seguir las indicaciones de la etiqueta del producto.



**Actlet® C** es un fungicida con una formulación única a base de Metalaxil-M e Hidróxido de Cobre muy eficaz para el control de *Phytophthora infestans* en cultivos de **patata, tomate y berenjena**.

La eficacia de **Actlet® C** se basa en la combinación de la acción sistémica del Metalaxil-M con la acción de contacto del Hidróxido de Cobre.


**COMPOSICIÓN:** Metalaxil-M 28,5 g/L + Hidróxido de Cobre 215 g/L

**FORMULACIÓN:** Suspensión concentrada (SC)

## ACCIÓN COMPLETA DURANTE TODO EL CICLO DEL HONGO

Actúa en todas las fases del ciclo de vida del Mildiu mediante acción:


- 1 - Preventiva:** evita la germinación de esporas y la formación del micelio
- 2 - Curativo:** evita el desarrollo del micelio
- 3 - Antiesporulante:** Impide la formación de nuevas esporas




**Actlet® C**

## MOMENTOS DE APLICACIÓN


### APLICACIÓN EN PATATA



**ACTLET® C:** Aplicar desde BBCH 36 hasta BBCH 81



### APLICACIÓN EN TOMATE Y BEREJENA



**ACTLET® C:** Aplicar desde BBCH 29 hasta BBCH 81



## VENTAJAS

- **Protección de los nuevos crecimientos** gracias a su **sistemia acrópeta**
- **Rápida absorción** tras su aplicación foliar.
- **Protección duradera en el tiempo**
- **Alta resistencia al lavado**
- La **formulación líquida:** mejor solubilidad y cobertura.
- Autorización tanto en **invernadero** como al **aire libre**.
- Amplia ventana de aplicación
- Adecuado para incluir en un **programa de gestión de resistencias**. Metalaxil-M está clasificada dentro del al grupo A1 del Comité de Acción sobre la Resistencia a Fungicida (FRAC) y el Cobre está clasificada dentro del grupo M1 .

**ASCENZA®**