

Spyrit 50 SC®

Cultivo	Enfermedad	Dosis (l/ha)	Volumen de caldo	Nº tratamientos	Estado del cultivo	Intervalo de aplicaciones
Vid (mesa y vinificación)	<i>Plasmopara viticola</i> (mildiu)	0.5	200 - 1000	3	BBCH 18-77	13 días
Patata	<i>Phytophthora infestans</i> (mildiu)	0.4 - 0.5	500 - 1000	3	BBCH 12-81	7-10 días
Lechuga y similares	<i>Bremial actuae</i> (peronospora)	0.4	500 - 1000	3	Aplicar al Aire libre (excluidas brassicaceas) BBCH 12-49	7-10 días

EDICIÓN: Marzo 2019



NUEVO
2019



Spyrit 50 SC® Fungicida

DIFFERENTIATION
LEADING TRENDS
COMPETITIVE ADVANTAGE
ADAPTED SOLUTIONS
INDEPENDENCE
ECONOMIC DRIVING FORCE
INNOVATION
ADD VALUE
INTERNATIONAL PRESENCE



IT MEANS
Competitiveness, quality and innovation by Sapec Agro Business



www.ascenza.es

ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA, S.A.U Parque Empresarial TÁCTICA C/ Botiguers, nº 3 - 4ª Planta. 46980 - Paterna (Valencia) Telf. 96 134 51 50 / Fax. 96 134 35 10

PROTEGE TUS CULTIVOS FRENTE AL MILDIU

SPYRIT 50 SC® es un fungicida de acción translaminar, con actividad **protectora**, **curativa** y **anti-esporulante** contra mildiu en Patata, Viña y Lechugas y similares



ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA. USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
La información del folleto no exige de seguir las indicaciones de la etiqueta del producto.

www.ascenza.es





Spyrit 50 SC® es un fungicida de acción translaminar, con actividad protectora, curativa y anti-esporulante contra Oomycetos (mildius).

Spyrit 50 SC® se aplica en pulverización foliar sobre las hojas de los cultivos y tiene efecto por contacto y actividad translaminar. Se aplica para el control de *Plasmopara viticola* (mildiu) en vid, *Phytophthora infestans* (mildiu) en patata y *Bremia lactucae* (peronospora) en lechuga.

COMPOSICIÓN: Dimetomorf 50%


FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC)



MÚLTIPLE ACCIÓN DURANTE TODO EL CICLO DEL HONGO

Actúa en todas las fases del ciclo de vida del Mildiu mediante acción:

- 1 - **Preventiva:** evita la germinación de esporas y la formación del micelio
- 2 - **Curativo:** evita el desarrollo del micelio
- 3 - **Antiesporulante:** Impide la formación de nuevas esporas




MOMENTOS DE APLICACIÓN

SPYRIT 50 SC® se aplica desde que aparecen las condiciones que propician un riesgo en la infección.


La mayor efectividad de **SPYRIT 50 SC**® se consigue aplicado en las fases iniciales de infección y hasta el final del desarrollo vegetativo del cultivo.



Spyrit 50 SC®: Aplicar en viña desde BBCH 18 hasta BBCH 77



Spyrit 50 SC®: Aplicar en patata desde BBCH 12 hasta BBCH 81



Spyrit 50 SC®: Aplicar en lechuga desde BBCH 12 hasta BBCH 49

VENTAJAS

- Adecuado para incluir en un programa para **evitar aparición de resistencias**. Dimetomorf es una amida del ácido cinámico, que pertenece al grupo de las Amidas de Ácidos Carboxílicos (CAA), clasificadas dentro del **grupo H5** del Comité de Acción sobre la Resistencia a Fungicidas (FRAC) de acuerdo a su modo de acción
- Combina una **rápida penetración** con una **duradera eficacia**
- **Resistencia al lavado** por lluvia

