

# INSECTICIDA

lambda cyhalotrina

Insecticida piretroide con potente efecto de derribe y control residual sobre insectos masticadores, raspadores y chupadores



# Cordoba®

FICHA TÉCNICA

Para mayor información lea la etiqueta completa del producto.  
Disponible en nuestro website  
[ascenza.mx](http://ascenza.mx)



**ASCENZA®**  
— FARMING YOUR FUTURE —

## DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO

#### INGREDIENTE ACTIVO:

**lambda cyhalotrina:** (R)- $\alpha$ -Ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-tri-fluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato. 6.53 (Equivalente a 60 g i.a./L a 20 °C).

#### INGREDIENTES INERTES:

Emulsificantes, diluyente, disolvente, impurezas y compuestos relacionados. 93.47  
**TOTAL 100.00**

**CATEGORÍA:** Insecticida

**FORMULACIÓN:**  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:**  
4 Precaución

**REGISTRO:**  
RSCO-INAC-0177-0693-009-6.53



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **CORDOBA®** es un insecticida a base de **Lambda Cyhalotrina**, ingrediente activo del grupo de los Piretroides (IRAC Grupo 3A) que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos alternando el flujo de iones a través de la membrana nerviosa. Los insectos tratados entran en una fase de agitación seguida de una parálisis que conduce a la muerte.
- **CORDOBA®** es un insecticida no sistémico, de gran capacidad de penetración que posee un alto efecto de choque y buena persistencia. Produce una fuerte repelencia que evita reinvasiones de insectos en el cultivo. Es activo sobre insectos adultos y también sobre los diferentes estados larvarios en especial de Lepidópteros y Dípteros.

## CULTIVOS AUTORIZADOS

**CORDOBA®** se recomienda para el control de las plagas y en los cultivos que se indican a continuación:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Aguacatero (14)*	<b>Trips</b> ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	400 – 500 ml/ha	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 950 -1050 L de agua/ha.
Jitomate (5)	<b>Gusano del fruto</b> ( <i>Heliothis zea</i> )	0.4 – 0.5	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 370 - 470 L de agua /ha.
Maíz (15)	<b>Gusano cogollero</b> ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	0.25 – 0.30	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 550 – 650 L de agua/ha.
Ajo (14) Cebolla (14) Cebollín (14)	<b>Trips</b> ( <i>Thrips tabaci</i> )	0.5 – 0.75	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 5 días, iniciar las aplicaciones cuando se detecte la presencia de la plaga distribuida homogéneamente en el cultivo, adicionar un coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta; volumen de aplicación 350 – 450 L de agua/ha.
Brócoli (1) Col (1) Col de Bruselas (1) Coliflor (1)	<b>Palomilla dorso de diamante</b> ( <i>Plutella xylostella</i> )	0.4 – 0.6	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros individuos de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 350 – 450 L de agua/ha.
Soya (15)	<b>Gusano terciopelo</b> ( <i>Anticarsia gemmatilis</i> )	0.5 – 0.7	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 370 – 470 L de agua/ha.
Chile (5) Berenjena (5) Jitomate (5) Okra (5) Papa (5) Pimiento morrón (5) Tomate verde (5)	<b>Gusano soldado</b> ( <i>Spodoptera exigua</i> )	400 - 600 ml/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia de la plaga con distribución homogénea en el cultivo, periodo de protección por al menos 14 días; volumen de aplicación 460 – 560 L de agua/ha.
Pepino (1) Calabacita (1) Calabaza (1) Chayote (1) Melón (1) Sandía (1)	<b>Gusano soldado</b> ( <i>Spodoptera exigua</i> )	500 – 700 ml/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días, cuando se detecte la presencia de la plaga, periodo de protección por al menos 17 días; volumen de aplicación 350 – 450 L de agua/ha.
Melón (1) Calabacita (1) Calabaza (1) Chayote (1) Pepino (1) Sandía (1)	<b>Trips</b> ( <i>Caliothrips phaseoli</i> )	500 – 700 ml/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia de la plaga con una distribución homogénea dentro del cultivo, periodo de protección hasta 14 días; volumen de aplicación 460 – 560 L de agua/ha.

\* ( ): **Intervalo de seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** 6 horas después de la aplicación.

### Nevada Chemicals, SA de CV

Av. Patria 888 3er Piso Interior A Col. Loma Real,  
C.P. 45129, Zapopan, Jalisco, México  
Teléfono: Lada sin costo 800 88 872 33