

حمى التيفوئيد

الأعراض



تبدأ الأعراض خلال 6 إلى 30 يومًا بعد التعرض ، وعادةً ما تشمل الحمى الشديدة والضعف وآلام البطن والصداع . في بعض الحالات ، قد يصاب الشخص بالإسهال ، أو إسهال ، أو طفح جلدي مع بقع وردية اللون .
لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص المصابين ، ولكن برازهم قد يسبب المرض للآخرين .

الانتشار



ينتشر هذا بشكل أكبر في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا حيث الوصول إلى المياه الآمنة والصرف الصحي المناسب محدود. يصاب ما يصل إلى 20 مليون شخص بالتيفوئيد وبيوت 161 ألف شخص بسبب المرض كل عام (منظمة الصحة العالمية، 2018).

السبب




استهلاك الماء أو الطعام الملوث ببكتيريا السالمونيل التيفية . يصاب الأشخاص بالعدوى عن طريق تناول الطعام أو شرب الماء الذي يحتوي على مسببات الأمراض من البراز .

العلاج



يمكن استخدام العديد من المضادات الحيوية ضد التيفوئيد .
في حالة الإصابة بالجفاف بسبب الإسهال ، شرب محلول الإماهة الفموي . في الحالات الشديدة ، قد تكون هناك حاجة للسوائل الوريدية .



صورة مجهرية تظهر بكتيريا السالمونيللا (باللون الأحمر) وهي تغزو الخلايا البشرية المزروعة . يبلغ عرض كل بكتيريا حوالي 1 ميكرومتر وطولها 2.5 ميكرومتر .
حقوق الصورة: المعاهد الوطنية للصحة ([المجال العام](#)) .

الوقاية



- معالجة مياه الشرب وتخزينها جميعها بشكل آمن .
- غسل الفواكه والخضروات بمياه شرب آمنة، وطهي الطعام جيدًا .
- استخدام المراحيض المحسنة لإبعاد البراز عن البيئة .
- تطعيم الفئات المعرضة للخطر ضد حمى التيفوئيد .

خيارات معالجة المياه المنزلية

- المرشحات المصنفة على أنها "فعالة جدًا" ضد البكتيريا .
- معظم طرق التطهير ، بما في ذلك التطهير الشمسي ، والكلور ، الغلي .

المراجع:

World Health Organization (2018). Typhoid Fact Sheet. Retrieved January 29, 2018, from <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/typhoid/en/>

هذا المصدر مفتوح المحتوى ومرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي Attribution 4.0 International (CC BY) .
الإشارة إلى مصادر CAWST (resources.cawst.org/cc) .