

COIMBRA®

Fungicida endoterapico sistemico
Sospensione concentrata
Propamocarb-codice FRAC: 28; Dimetomorph-codice FRAC: 40

COIMBRA

Registrazione Ministero della Salute n. 16278 del 03/07/2017

Composizione

- Dimetomorph puro	g 8,0 (= 90 g/l)	ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA
- Propamocarb cloridrato puro	g 44,2 (=500 g/l)	
- Coformulanti q.b. a	g 100,0	

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH 208 - Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one e Propamocarb cloridrato. Può provocare una reazione allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P401 - Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Ascenza ITALIA S.r.l.
Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA)
Tel: 0284944669

Stabilimento di Produzione:

Ascenza AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal – Portogallo

Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena

Stabilimento di Ri-etichettatura: Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara

Taglia: 0,25 – 1 – 5 l

Partita n° vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Indossare guanti protettivi durante le fasi di miscelamento e carico. In caso di rientro nelle aree trattate di recente indossare camicia a maniche lunghe, pantaloni e scarpe.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi

Dimetomorph – Ingestione: disturbi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, mal di testa, febbre; Inalazione: irritazione del sistema respiratorio, tosse, dispnea, riniti, aumento della secrezione di muco; Contatto: irritazione di occhi, cute e mucose, lacrimazione oculare, congiuntiviti, dermatiti da contatto.

Propamocarb cloridrato - Ingestione: disturbi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, insufficienza epatica, atassia, confusione, convulsioni, sindrome extra piramidale, bradicinesia, instabilità emotiva, letargia, paralisi, iperplasia tiroidea. Inalazione: disturbi respiratori, tosse, dispnea, riniti, aumento della secrezione di muco. Contatto: Irritazione di occhi, pelle e mucose, lacrimazione oculare, congiuntiviti, dermatiti da contatto.

Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

COIMBRA è una innovativa miscela fungicida a base di Dimetomorph e Propamocarb dotato di attività translaminare e sistemica, specifico per il controllo delle peronosspore. In virtù dei differenti meccanismi di azione dei due principi attivi, COIMBRA non presenta alcun rischio di resistenza incrociata e si inserisce ottimamente nei programmi di gestione delle resistenze. La complementarità fra i due principi attivi sia in termini di sito sia di modalità di azione si esplicita attraverso un importante effetto sinergico nei confronti degli organismi bersaglio. Una volta applicato il prodotto viene assorbito rapidamente (1-2 ore) e si redistribuisce all'interno delle foglie ove esercita una protezione endoterapica nei confronti dei patogeni che si estende alla giovane vegetazione in via di formazione e alle parti non direttamente raggiunte dal trattamento. Il prodotto agisce sul fungo disgregandone la parete cellulare e alterando la permeabilità delle membrane cellulari e determinandone la conseguente morte del patogeno. COIMBRA presenta una ottima resistenza al dilavamento e garantisce una protezione prolungata della vegetazione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura	Patogeno	Dose	Epoca e Condizioni di utilizzo
PATATA	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 L/ha in un volume d'acqua di 500-1000 l/ha	Da inizio dello sviluppo vegetativo (dalle 4-5 foglie sviluppate) fino a inizio maturazione dei tuberi (BBCH 19-81). Numero massimo di applicazioni: 3. Intervallo tra le applicazioni: 7-12 giorni (utilizzare l'intervallo minore in condizioni di elevata pressione della malattia)
LATTUGA (pieno campo)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	2 L/ha in un volume d'acqua di 600-1000 l/ha	Da inizio dello sviluppo vegetativo (dalle 2-3 foglie sviluppate) fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 12-45). Numero massimo di applicazioni: 3. Intervallo tra le applicazioni: 10-12 giorni (utilizzare l'intervallo minore in condizioni di elevata pressione della malattia).

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta su patata, 7 giorni prima su lattuga.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, mantenendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la preparazione che l'applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. **NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**

COIMBRA®

PfnPE

Fungicida endoterapico sistemico
Sospensione concentrata
Propamocarb-codice FRAC: 28; Dimetomorph-codice FRAC: 40

COIMBRA

Registrazione Ministero della Salute n. 16278 del 03/07/2017

Composizione

- Dimetomorph puro g 8,0 (= 90 g/l)
- Propamocarb cloridrato puro g 44,2 (=500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100,0

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON
PRUDENZA**

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH 208 - Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one e Propamocarb cloridrato. Può provocare una reazione allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P401 - Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Ascenza ITALIA S.r.l.

Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA)
Tel: 0284944669

Stabilimento di Produzione:

Ascenza AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal – Portogallo

Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena

Stabilimento di Ri-etichettatura: Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara

Taglia: 0,25 l

Partita n° vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Indossare guanti protettivi durante le fasi di miscelamento e carico. In caso di rientro nelle aree trattate di re-

cente indossare camicia a maniche lunghe, pantaloni e scarpe.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi

Dimetomorph – Ingestione: disturbi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, mal di testa, febbre; Inalazione: irritazione del sistema respiratorio, tosse, dispnea, riniti, aumento della secrezione di muco; Contatto: irritazione di occhi, cute e mucose, lacrimazione oculare, congiuntiviti, dermatiti da contatto.

Propamocarb cloridrato - Ingestione: disturbi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, insufficienza epatica, atassia, confusione, convulsioni, sindrome extra piramidale, bradicinesia, instabilità emotiva, letargia, paralisi, iperplasia tiroidea. Inalazione: disturbi respiratori, tosse, dispnea, riniti, aumento della secrezione di muco. Contatto: Irritazione di occhi, pelle e mucose, lacrimazione oculare, congiuntiviti, dermatiti da contatto.

Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

COIMBRA è una innovativa miscela fungicida a base di Dimetomorph e Propamocarb dotato di attività translaminare e sistemica, specifico per il controllo delle peronosspore. In virtù dei differenti meccanismi di azione dei due principi attivi, COIMBRA non presenta alcun rischio di resistenza incrociata e si inserisce ottimamente nei programmi di gestione delle resistenze. La complementarietà fra i due principi attivi sia in termini di sito sia di modalità di azione si esplicita attraverso un importante effetto sinergico nei confronti degli organismi bersaglio. Una volta applicato il prodotto viene assorbito rapidamente (1-2 ore) e si redistribuisce all'interno delle foglie ove esercita una protezione endoterapica nei confronti dei patogeni che si estende alla giovane vegetazione in via di formazione e alle parti non direttamente raggiunte dal trattamento. Il prodotto agisce sul fungo disgregandone la parete cellulare e alterando la permeabilità delle membrane cellulari e determinandone la conseguente morte del patogeno. COIMBRA presenta una ottima resistenza al dilavamento e garantisce una protezione prolungata della vegetazione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura	Patogeno	Dose	Epoca e Condizioni di utilizzo
PATATA	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 L/ha in un volume d'acqua di 500-1000 l/ha	Da inizio dello sviluppo vegetativo (dalle 4-5 foglie sviluppate) fino a inizio maturazione dei tuberi (BBCH 19-81). Numero massimo di applicazioni: 3. Intervallo tra le applicazioni: 7-12 giorni (utilizzare l'intervallo minore in condizioni di elevata pressione della malattia)
LATTUGA (pieno campo)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	2 L/ha in un volume d'acqua di 600-1000 l/ha	Da inizio dello sviluppo vegetativo (dalle 2-3 foglie sviluppate) fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 12-45). Numero massimo di applicazioni: 3. Intervallo tra le applicazioni: 10-12 giorni (utilizzare l'intervallo minore in condizioni di elevata pressione della malattia).

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta su patata, 7 giorni prima su lattuga.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, mentendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la preparazione che l'applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è

responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

COIMBRA®

PfnPE

Fungicida endoterapico sistemico
Sospensione concentrata
Propamocarb-codice FRAC: 28; Dimetomorph-codice FRAC: 40

COIMBRA

Registrazione Ministero della Salute n. 16278 del 03/07/2017

Composizione

- Dimetomorph puro g 8,0 (= 90 g/l)
- Propamocarb cloridrato puro g 44,2 (=500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100,0

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON
PRUDENZA**

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH 208 - Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one e Propamocarb cloridrato. Può provocare una reazione allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P401 - Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Ascenza ITALIA S.r.l.

Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA)
Tel: 0284944669

Stabilimento di Produzione:

Ascenza AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal – Portogallo

Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena

Stabilimento di Ri-etichettatura: Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara

Taglia: 1 l

Partita n° vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Indossare guanti protettivi durante le fasi di miscelamento e carico. In caso di rientro nelle aree trattate di re-

cente indossare camicia a maniche lunghe, pantaloni e scarpe.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi

Dimetomorph – Ingestione: disturbi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, mal di testa, febbre; Inalazione: irritazione del sistema respiratorio, tosse, dispnea, riniti, aumento della secrezione di muco; Contatto: irritazione di occhi, cute e mucose, lacrimazione oculare, congiuntiviti, dermatiti da contatto.

Propamocarb cloridrato - Ingestione: disturbi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, insufficienza epatica, atassia, confusione, convulsioni, sindrome extra piramidale, bradicinesia, instabilità emotiva, letargia, paralisi, iperplasia tiroidea. Inalazione: disturbi respiratori, tosse, dispnea, riniti, aumento della secrezione di muco. Contatto: Irritazione di occhi, pelle e mucose, lacrimazione oculare, congiuntiviti, dermatiti da contatto.

Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

COIMBRA è una innovativa miscela fungicida a base di Dimetomorph e Propamocarb dotato di attività translaminare e sistemica, specifico per il controllo delle peronosspore. In virtù dei differenti meccanismi di azione dei due principi attivi, COIMBRA non presenta alcun rischio di resistenza incrociata e si inserisce ottimamente nei programmi di gestione delle resistenze. La complementarità fra i due principi attivi sia in termini di sito sia di modalità di azione si esplicita attraverso un importante effetto sinergico nei confronti degli organismi bersaglio. Una volta applicato il prodotto viene assorbito rapidamente (1-2 ore) e si redistribuisce all'interno delle foglie ove esercita una protezione endoterapica nei confronti dei patogeni che si estende alla giovane vegetazione in via di formazione e alle parti non direttamente raggiunte dal trattamento. Il prodotto agisce sul fungo disgregandone la parete cellulare e alterando la permeabilità delle membrane cellulari e determinandone la conseguente morte del patogeno. COIMBRA presenta una ottima resistenza al dilavamento e garantisce una protezione prolungata della vegetazione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura	Patogeno	Dose	Epoca e Condizioni di utilizzo
PATATA	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 L/ha in un volume d'acqua di 500-1000 l/ha	Da inizio dello sviluppo vegetativo (dalle 4-5 foglie sviluppate) fino a inizio maturazione dei tuberi (BBCH 19-81). Numero massimo di applicazioni: 3. Intervallo tra le applicazioni: 7-12 giorni (utilizzare l'intervallo minore in condizioni di elevata pressione della malattia)
LATTUGA (pieno campo)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	2 L/ha in un volume d'acqua di 600-1000 l/ha	Da inizio dello sviluppo vegetativo (dalle 2-3 foglie sviluppate) fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 12-45). Numero massimo di applicazioni: 3. Intervallo tra le applicazioni: 10-12 giorni (utilizzare l'intervallo minore in condizioni di elevata pressione della malattia).

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta su patata, 7 giorni prima su lattuga.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, mentendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la preparazione che l'applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è

responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

