

OSSIRAM® 70 FLOW

NOVITÀ

Fungicida multisito a base di ossicloruro di rame liquido.

Composizione: Rame da ossicloruro 36,7% (700 g/l)

FRAC: M1

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

CLP: H410 - EUH401  **ATTENZIONE**

Registrazione: n° 9420 del 05/11/1997

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 680 L

- ✓ Ossiram® 70 Flow è l'ossicloruro di rame liquido più concentrato in commercio.
- ✓ Ha una formulazione colloidale e finissima.
- ✓ Disciolto in acqua forma una sospensione uniforme che facilita la preparazione della miscela.

VANTAGGI

- ✓ Ossiram® 70 Flow grazie alla sua formulazione garantisce una copertura uniforme e completa.
- ✓ Manifesta una alta adesività utile.
- ✓ E' resistente ai dilavamenti.
- ✓ L'alto contenuto in principio attivo per litro permette la movimentazione di minori quantitativi di prodotto.
- ✓ Ha un'ampia etichetta su tutti i fruttiferi.

® Marchio registrato.



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
Agrumi	Peronospora (<i>Phytophthora spp.</i>)	75 (max 0,75 l/ha)	Applicare durante la fase di maturazione dei frutti. Ogni 14-21 giorni.	2	15
	Fumaggine e altri	125 (max 1,25 l/ha)			
Vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	100-150 (max 1,5 l/ha)	Applicare ogni 7-10 giorni.	4	15
Olivo	Occhio di pavone (<i>Cycloconium oleaginum</i>)	150-250 (max 2,5 l/ha)	Applicare in primavera e/o autunno.	2	15
Pomacee	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>)	150-250 (max 2,5 l/ha)	Applicare alla caduta delle foglie. Ogni 14 giorni.	3	-
Patata	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	100-150 (max 1,5 l/ha)	Applicare ogni 7-10 giorni.	3	15
Drupacee	Bolla (<i>Taphrina deformans</i>) Monilia (<i>Monilia fructigena</i>)	200 (max 2 l/ha)	Applicare alla caduta delle foglie e all'ingrossamento delle gemme.	2	-
Pomodoro	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 (max 2 l/ha)	Applicare ogni 7-10 giorni.	3	3 (in serra) 10 (in pieno campo)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Non trattare durante la fioritura.
- ✓ Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame ettaro nell'arco di 7 anni.

