


Hereu® SC

Erbicida selettivo ad ampio spettro d'azione in sospensione concentrata.

Hereu® SC è un erbicida selettivo a base di Oxyfluorfen per il controllo di un ampio spettro di infestanti annuali dicotiledoni e graminacee in applicazioni di pre e post-emergenza.

Agisce per contatto sulle infestanti presenti ma anche sulle plantule in via di emergenza.

| COMPOSIZIONE | CODICE HRAC | FORMULAZIONE | CLASSIFICAZIONE CLP |
|----------------------------------|-------------|------------------------------|---|
| Oxyfluorfen puro 42,9% (500 g/l) | E | Sospensione Concentrata (SC) |  PERICOLO Registrazione n°: 16033 del 04/06/2014 |



Flaconcino: 0,5 L
 Cartone: 12x0,5 L
 Pallet: 510 L



Flacone: 1 L
 Cartone: 12x1 L
 Pallet: 600 L



Accedi al
Volantino



Accedi alla
SDS



Accedi
all'**Etichetta**



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

| COLTURA | INFESTANTI CONTROLLATE | EPOCA D'IMPIEGO | DOSE (l/ha) | PHI (gg) |
|--|---|---|-------------|----------|
| VITE POMACEE DRUPACEE NOCCIOLO ARANCIO LIMONE POMPELMO MANDORLO | Infestanti sensibili: <u>Monocotiledoni annuali:</u> Coda di topo (<i>Alopecurus</i> spp.) Digitaria (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Orzo (<i>Hordeum vulgare</i>) Panico (<i>Panicum dichotomiflorum</i>) Setaria (<i>Setaria</i> spp.) Zizzania (<i>Lolium temulentum</i>) | In pre-emergenza contro specie annuali In post-emergenza consultare l'etichetta per i casi specifici | 0,9 | - |
| OLIVO | <u>Dicotiledoni annuali:</u> Amaranto (<i>Amaranthus</i> spp.) Betonica (<i>Stachys annua</i>) Centocchio dei campi (<i>Anagallis arvensis</i>) Crucifere in genere Datura (<i>Datura stramonium</i>) Papavero (<i>Papaver</i> spp.) Porcellana (<i>Portulaca oleracea</i>) Poligoni (<i>Polygonum</i> spp.) Senape (<i>Sinapis arvensis</i>) | Su impianti in produzione fino a 7gg prima del raccolto | 0,9 | 7 |
| GIRASOLE | <u>Dicotiledoni perenni</u> (nei trattamenti di post emergenza): Acetosella (<i>Oxalis</i> spp.) Artemisia (<i>Artemisia</i> spp.) Malva (<i>Malva</i> spp.) Ortica (<i>Urtica dioica</i>) Romici (<i>Rumex</i> spp.) Stoppione (<i>Cirsium arvense</i>) Vilucchio (<i>Convolvulus arvensis</i>) | Su colture con file di 70-75 cm trattare con banda di 20-25 cm | 0,5 | - |
| CARCIOFO | | In pre-emergenza subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura | 0,5-0,75 | - |
| | | In post-emergenza | 0,75-0,9 | - |
| VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI | | Impiegare solo sulla fila della coltura | 0,5-0,75 | - |
| AREE INCOLTE E SEDI FERROVIARIE | | Applicare in pre-emergenza o con infestanti presenti o in post-emergenza precoce | 0,5-0,9 | - |

VANTAGGI

- **Hereu® SC** è una soluzione di riferimento nel controllo delle infestanti del girasole in pre-emergenza.
- È il diserbante ideale in miscela con Glifosate per il controllo totale di un ampio spettro di infestanti.