

VITIEPEC R WDG

Fungicida ad azione translaminare e di contatto per la difesa della vite
Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili

VITIEPEC R WDG

Autorizzazione Ministero della Salute n. 16394 del 21/10/2015

Composizione

Cimoxanil puro	4 g
Rame metallo (sotto forma ossicloruro)	40 g
Coformulanti q. b. a	100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319: Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie.
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto. H371 Può provocare danni agli organi. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. EUH208: Contiene cimoxanil. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P273: Non disperdere nell'ambiente. P391: Raccogliere la fuoriuscita. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ASCENZA Italia S.r.l.

Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA)
Tel. +39 0284944669

Distribuito da:

ASCENZA Italia S.r.l.- Via Varese 25/G - 21047 Saronno (VA) - Tel. +39 0284944669

Stabilimenti di produzione:

ASCENZA AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910 440 Setúbal (Portogallo)

Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena

Stabilimento di Ri-etichettatura:

Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara

Taglia: 0,200 -0,250 - 0,500 -1 - 5 - 10 – 25 kg

Partita n. vedi corpo della confezione



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante le operazioni di miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto e durante qualsiasi attività di rientro in campo indossare sempre abbigliamento da lavoro. Date le proprietà irritanti per gli occhi, durante la manipolazione del concentrato indossare una visiera. Inoltre, durante le operazioni di miscelazione/caricamento indossare guanti protettivi. Durante l'applicazione del prodotto con trattore indossare calzari, maschera, copricapo e guanti; in caso di applicazione con trattore cabinato è sufficiente indossare guanti protettivi. Durante le attività di mantenimento/raccolta in campo indossare guanti protettivi.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per applicazioni precoci su vite e una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali per applicazioni tardive.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale di accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agro-climatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL: derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 21/12/2018 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n 55/2012, con validità dal 30/11/2019

RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latte-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

VITIPPEC R WDG è un fungicida in granuli idrodispersibili ad azione translaminare endoterapica e di contatto efficace contro la Peronospora della vite. VITIPPEC R WDG è una miscela di due principi attivi: Cymoxanil che possiede prontezza d'azione ed effetto bloccante e Ossicloruro di Rame ad attività preventiva e lunga persistenza di azione. La particolare formulazione in granuli idrodispersibili garantisce la massima semplicità d'uso e sicurezza per l'operatore, in quanto il prodotto non produce polvere durante le operazioni di preparazione della soluzione antiparassitaria.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate, in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.

Vite: contro Peronospora alla dose di 300-600 g/hL; iniziare gli interventi quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni e proseguire gli interventi a cadenza di 12 giorni, secondo la necessità, fino ad un massimo di 3 applicazioni all'anno.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare VITIPPEC R WDG ad altri fungicidi. Non effettuare più di 3 applicazioni per anno.

Sospendere i trattamenti 66 giorni prima della raccolta per la Vite.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. IL rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO