



CATALOGO PRODOTTI AGROFARMACI

EDIZIONE
2021



ASCENZA®
— FARMING YOUR FUTURE —



ASCENZA FARMING YOUR FUTURE

Il logo **ASCENZA** si ispira alla foresta mediterranea popolata da un albero, antico e forte, che simboleggia maturità, evoluzione e resilienza.

La nostra azienda si riflette in quell'albero che per crescere ha bisogno di tempo, impegno costante e grande determinazione.


Un'azienda che identifica la sua forza nella costruzione di solide relazioni utili a rafforzare il suo messaggio e i suoi obiettivi futuri.

Oggi **ASCENZA** ha un obiettivo importante: diventare un punto di riferimento nel settore della difesa delle colture e rispondere alle esigenze di un'agricoltura moderna, costruendo un'attenta interazione tra bisogni e soluzioni, attenta alle esigenze degli agricoltori, alla sicurezza dei consumatori, rispettosa dell'ambiente e fautrice di produzioni eccellenti, sane e sicure.

L'AGRICOLTURA NON PUO' FERMARSI!

Con l'avvento della pandemia negli ultimi mesi siamo stati chiamati ad affrontare una sfida di portata planetaria che ci porta quotidianamente a seguire strettamente norme igieniche per la nostra sicurezza. Davanti a questo scenario è emersa l'importanza di garantire il soddisfacimento del bisogno primario dell'uomo di nutrirsi. Un nutrimento che il pianeta ci offre attraverso le piante, la cui cura è affidata ogni giorno agli agricoltori in prima linea in campo.

Noi, come **ASCENZA** stiamo facendo di tutto per stare al loro fianco e garantire i mezzi tecnici necessari per promuovere la difesa delle piante e produzioni agroalimentari eccellenti e sicure.





Rovensa Well Balanced Agriculture

Il Gruppo ROVENSA integra al suo interno diverse Aziende e diverse divisioni offrendo un portfolio di soluzioni con un obiettivo comune: creare un modello basato sul concetto di **AGRICOLTURA EQUILIBRATA**.

ROVENSA è una realtà proiettata al futuro, che nasce dalla necessità di rispondere alle grandi sfide del settore agricolo: crescita della popolazione mondiale, proteggere le piante e l'ambiente, uno stile di vita più sano, consumatori più informati, rivenditori che ricercano più trasparenza ed agricoltori che devono assicurare produzioni sane e di alta qualità.

Tutte le aziende del Gruppo ROVENSA allo stesso tempo contribuiscono nello sviluppo di soluzioni differenziate che si integrano tra di loro, promuovendo la creazione di sinergie per il raggiungimento di un comune obiettivo, garantire un'agricoltura equilibrata e sostenibile che garantisca prodotti sicuri, sani, di qualità e rispettosi dell'ambiente, che rappresentino al tempo stesso una fonte di reddito per tutti gli attori della filiera agroalimentare.


Le principali divisioni del Gruppo sono rappresentate da:

ASCENZA: dedicata alla difesa delle colture;

TRADECORP: esperta nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per la nutrizione e la biostimolazione delle colture;

IDAI NATURE: specializzata nello sviluppo di soluzioni per il biocontrollo.

Il Gruppo presente in oltre 70 paesi oggi rappresenta una piattaforma internazionale con conoscenze globali pronta ad affrontare le sfide dell'agricoltura moderna grazie al suo approccio locale con il territorio.





Mission, Vision, Values

La nostra **missione** è nutrire il pianeta, attraverso soluzioni sane e sicure consentendo un'agricoltura equilibrata e sostenibile.

Crediamo che il nostro contributo possa aiutare il mondo ad affrontare le sfide alimentari del futuro, a causa della sovrappopolazione, dei cambiamenti climatici e del declino delle risorse del pianeta.

ROVENSA supporta direttamente gli agricoltori nei processi produttivi, nel rispetto dell'ambiente, garantendo ai consumatori prodotti sani e di qualità.

La nostra **visione** è diventare un riferimento mondiale, grazie a soluzioni uniche e innovative per la salute delle piante, facendo leva sulla nostra vicinanza con l'agricoltura locale.

I nostri valori basilari:

IMPEGNO

Ci permette di lottare con audacia ed ambizione per portare avanti la missione e la visione del Gruppo.

EMPOWERMENT


Che accresce la sicurezza in noi stessi e nella nostra organizzazione.

ETICA

Che manteniamo per restare fedeli ai nostri valori e alle nostre intenzioni.

DEDIZIONE


Che mostriamo per portare avanti i nostri obiettivi comuni.





INDICE GENERALE


Fungicidi	8
Erbicidi	66
Insetticidi e Acaricidi	100
Nematocidi e Coadiuvanti	114
Bio Soluzioni	120
Info utili	130





INDICE FUNGICIDI

	Actlet® C	10
	Actlet® F	12
NEW	Actlet EVO	14
	Almada® F	16
	Almada® 50 SC	18
	Almada® Hydro	20
	Almada® MZ	22
	Almada® Trio	24
	Azox® 25 SC	26
	Azupec® 80 WG	28
NEW	Back® 100 SC	30
	Cardinal 50 WG	32
	Coimbra®	34
	Douro® 10 WG	36
	Douro® 100 EC	38
NEW	Drum®	40
	Folpec® 50 SC	42
	Folpec® 80 WG Advance	44
	Kresostar®	46
	Kubik® MCZ	48
	Medeiro® 80 WG Advance	50
	Ossiram® 70 Flow	52
NEW	Shardif® 250 EC	54
	Spyrit® Gold	56
	Tokra®	58
	Tribasic® Flow New	60
	Vegas® 50 WG	62
	Vitipec® MZ	64





Actlet® C

Fungicida antiperonosporico sistemico per vite, patata, pomodoro e melanzana.

Composizione:

M-Metalaxil puro g 2,26 (=28,5 g/l)

Rame Idrossido g 17,06 (=215 g/l)

Codice Frac:

4 gruppo A1

M01

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:



PERICOLO

Registrazione n°: 16660 del 19/12/2018



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Actlet® C combina l'attività curativa sistemica del M-metalaxil a quella preventiva di contatto del rame idrossido.
- ✓ Svolge una triplice azione preventiva, curativa e antisporulante.
- ✓ Si assorbe rapidamente attraverso le foglie e viene traslocato verso le parti della pianta in attiva crescita.

VANTAGGI:

1. Il rame idrossido garantisce una migliore rapidità d'azione contro la peronospora rispetto agli altri Sali di rame.
2. E' la formulazione liquida più concentrata sul mercato.
3. A parità di superficie trattata apporta più M-metalaxil e meno rame dei formulati liquidi in commercio.
4. La formulazione liquida garantisce una migliore solubilità del prodotto e una migliore copertura grazie alla ottimale micronizzazione delle particelle.
5. Rapido assorbimento e traslocazione per una maggiore resistenza al dilavamento e una più prolungata protezione.



Tanica: 10 L

Pallet: 500 L

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE (da vino e da tavola)	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	3,5	Dalla fase di allegagione a invaiatura (BBCH 71-83). Ogni 12-14 gg.	2	28
PATATA	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	3,5	Dalla fase di allungamento dello stelo principale fino all'accrescimento dei tuberi (BBCH 36-81). Ogni 7-10 gg.	3	21
POMODORO (Pieno campo e serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)		Dalla prefioritura a inizio maturazione frutti (BBCH 29-81). Ogni 7-10 gg.		10 (campo)
MELANZANA (Pieno campo e serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)		Dalla prefioritura a inizio maturazione frutti (BBCH 29-81). Ogni 7-10 gg.		3 (serra)





Actlet® F

Fungicida antiperonosporico sistemico per la vite.

Composizione:

M-Metalaxil puro g 5 (=50 g/kg)

Folpet g 40 (=400 g/kg)

Codice Frac:

4 gruppo A1

M4

Formulazione: Granuli Idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione n°: 16663 del 21/06/2019

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Actlet® F** è disegnato per combattere l'insorgenza delle resistenze. E' composto da principi attivi con due meccanismi d'azione differenti, di cui folpet è multisito.
- ✓ E' ideale per le fasi fenologiche iniziali e per le fasi successive per la protezione del grappolo.
- ✓ Svolge una triplice azione (preventiva, curativa e sporulante).
- ✓ La sistemica di Metalaxil-M gli conferisce la capacità di proteggere la nuova vegetazione in accrescimento, combinata con la protezione completa di Folpet sulla vegetazione presente e sul grappolo.
- ✓ L'ottimale capacità di legarsi alle cere delle foglie e del grappolo di Folpet e l'elevata solubilità in acqua di Metalaxil-M conferiscono un rapido assorbimento, un'elevata capacità sistemica e una persistenza d'azione duratura grazie all'elevata resistenza al dilavamento.

VANTAGGI:

1. Questa particolare formulazione, esente da polvere, permette una dispersione delle sostanze attive in acqua più rapida, completa e stabile e quindi un miglioramento dell'efficacia del trattamento (indipendentemente dalle temperature); inoltre il prodotto risulta più comodo da utilizzare e più sicuro per l'operatore.
2. Folpet è efficace su Escoriosi e ha azione collaterale su Botrite, Oidio, Black rot e Carie bianca (malattia di post-grandine).

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.



Sacchetto: 1 kg

Cartone: 12x1 kg

Pallet: 480 kg



Sacco: 6 kg

Pallet: 600 kg

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (g/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 (2 kg/ha)	Da inizio sviluppo tralci fino a inizio maturazione (BBCH 18-85)	2 Ogni 12-14 gg	28
VITE DA TAVOLA			Da inizio sviluppo tralci fino a fine fioritura (BBCH 18-69)		fino a fine fioritura





Actlet® Evo

Fungicida endoterapico e di contatto per la vite da vino e da tavola contro la peronospora.

Composizione:

M-Metalaxil 4%

Cimoxanil 4,8 %

Folpet 40%

Codice Frac:

4 gruppo A1

27

M 04

Formulazione: Granuli Idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



PERICOLO

Registrazione n°: 16960 del 05/06/2020



Sacchetto: 1 kg

Cartone: 12x1 kg

Pallet: 600 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Actlet® EVO** è una miscela fungicida a tre vie per la Vite da vino e da tavola a base di metalaxil-M, cimoxanil e folpet.
- ✓ Dotato di attività sistemica, translaminare e di contatto, **Actlet® Evo** è in grado di offrire una protezione completa della vegetazione, sia presente sia in via di sviluppo, e del grappolo, in virtù della sua azione preventiva, curativa e antisporulante.
- ✓ Le tre sostanze attive da cui è composta la miscela agiscono a livello di siti di azione completamente differenti garantendo una assenza totale di rischio di sviluppo di resistenze incrociate.

VANTAGGI:

1. Un fungicida innovativo a tre vie, che combina le proprietà di tre sostanze attive a diverso meccanismo d'azione e pronto all'uso.
2. Soluzione ottimale per la gestione delle resistenze anche nelle zone a più alta pressione.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (kg/ha)	DOSE (g/hL)	EPOCA D'IMPIEGO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	2,5	250	Massimo 2 trattamenti per anno ad intervallo di 12-14 giorni a partire dall'accrescimento dei tralci fino a inizio maturazione del grappolo (BBCH 18-85).	28
VITE DA TAVOLA	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	2,5	250	Massimo 2 trattamenti per anno ad intervallo di 12-14 giorni a partire dall'accrescimento dei tralci fino a fine fioritura (BBCH 18-69).	Fine della fioritura.





Almada® F

Fungicida a sistemica locale e di copertura per pomodoro e vite da vino.

Composizione:

Dimetomorf puro g 11,3 (=113 g/Kg)

Folpet puro g 60 (= 60 g/Kg)

Codice Frac:

40 gruppo H5

M 04

Formulazione: Granuli Idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



PERICOLO

Registrazione n°: 16140 del 24/05/2019

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Almada® F** è un fungicida antiperonosporico in microgranuli idrodispersibili dotato di attività traslaminare, locosistemica e di contatto che agisce in via preventiva, curativa e antisporulante nei confronti della peronospora della Vite e del Pomodoro.
- ✓ I due componenti, Dimetomorf e Folpet, presentano una azione sinergica e complementare, sia in termini di modalità che di siti di azione.

VANTAGGI:

1. Soluzione ottimale per la gestione delle resistenze e una protezione completa e prolungata sia della vegetazione presente al momento del trattamento sia di quella in via di formazione.
2. Folpet è efficace su Escoriosi e ha azione collaterale su Muffa Grigia, Oidio, Black rot e Carie bianca (malattia di post-grandine). È il prodotto di copertura con la massima resistenza al dilavamento.



Sacchetto: 4 kg

Pallet: 480 kg



Sacco: 8kg

Pallet: 640 kg

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (g/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	160 - 200 (1,6 - 2 kg/ha)	Da inizio sviluppo tralci (BBCH 18) fino a pre chiusura grappolo (BBCH 72). Ogni 10-12 gg.	3	28
POMODORO (campo e serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	160 (1,6 kg/ha)	Dalle prime fasi di sviluppo ad inizio maturazione (BBCH 12-81). Ogni 10-12 gg.		7





Almada® 50 SC

Fungicida antiperonosporico endoterapico per lattughe, baby leaf ed erbe fresche, patate e vite.

Composizione:

Dimetomorf puro g 44,25 (=500 g/l)

Codice Frac:

40 gruppo H5

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)

Classificazione CLP:



Registrazione n°: 16277 del 08/03/2018

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Almada® 50 SC è un fungicida a base di Dimetomorf dotato di attività citotropica-translaminare e locosistemica, registrato su un ampio numero di colture.
- ✓ Il prodotto presenta una ottima resistenza al dilavamento e garantisce una protezione della vegetazione e del grappolo prolungata.

VANTAGGI:

1. L'unico Dimetomorf puro registrato su erbe fresche, basilico e baby leaf.
2. Attività curativa e antisporulante.
3. L'ampia etichetta permette applicazioni con il prodotto puro su colture nuove ampliando le possibilità di lotta agli oomiceti.
4. Si inserisce in differenti strategie di lotta alla peronospora.



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Peronospora (Plasmopara viticola)	0,5	Dalle 7-8 foglie a chiusura grappolo (BBCH 18-77). Ogni 10-12 gg.	3	28
PATATA	Peronospora (Phytophthora infestans)	0,4	Dalle 2-3 foglie fino alla maturazione dei tuberi (BBCH 12-81). Ogni 7-10 gg.		21
LATTUGHE, ALTRE INSALATE* (pieno campo e serra) (escluse brassicacee)	Peronospora (Bremia lactucae)		Utilizzabile per tutto il periodo di sviluppo vegetativo (BBCH 12-49). Ogni 7-10 gg.	Lattughe e altre: 3	7
INSALATE DA TAGLIO (tipo Babyleaf)			Per le baby leaf l'uso è consentito dalle 2-3 foglie fino alla raccolta (BBCH 12-25).	Baby leaf: 1	
BASILICO ED ERBE FRESCHE** (pieno campo e serra)	Peronospora (Peronospora behlbarii)		Dalle 2-3 foglie fino alla raccolta (BBCH 12-49).	3	

* Lattuga, Cicoria, Radicchio, Indivia, Scarola, Dente di leone, Crescione, Valerianella, Dolcetta, altre.

** Cerfoglio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Menta, Salvia, Salvia moscatella, Timo, Angelica, Melissa, Borragine, Pimpinella, Fieno greco, Matricale, Issopo, Calendula o Fiorrancio, Maggiorana, Nasturzio, Ortica, Origano, Rosmarino, Ruta, Santoreggia, Cerfoglio muschiato, Acetosa, Drangocello, Stellina odorosa, altre.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

- ✓ Sono ammessi al massimo 3 trattamenti e non più di 2 interventi consecutivi (eccezione fatta per baby leaf).





Almada® Hydro

Fungicida antiperonosporico endoterapico
per la vite.

Composizione:

Dimetomorf puro g 4,72 (=60 g/l)

Rame idrossido g 15,75 (=200 g/l)

Codice Frac:

40 gruppo H5

M 01

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)

Classificazione CLP:



PERICOLO

Registrazione n°: 16280 del 20/12/2017



Tanica: 10 L

Pallet: 500 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Almada® Hydro** è un fungicida a base di Dimetomorf e Rame idrossido dotato di attività citotropica e translaminare, locosistemica e di contatto, specifico per il controllo della peronospora della Vite.
- ✓ Il Dimetomorf si ridistribuisce all'interno delle foglie ove esercita un'azione endoterapica nei confronti del fungo.
- ✓ La componente rameica esercita un'azione di copertura, mentre il dimetomorf svolge una efficace azione di copertura sulla vegetazione per effetto della componente rameica.

VANTAGGI:

1. La formulazione liquida permette una distribuzione più omogenea e un assorbimento del prodotto più rapida (1-2 ore).
2. **Almada® Hydro** è la formulazione liquida con minore concentrazione di rame sul mercato.

® Marchio registrato.




Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	3	Dallo sviluppo vegetativo fino alla chiusura del grappolo (BBCH 18-77). Ogni 10-12 gg.	3	28

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Al fine di ridurre al minimo il potenziale di accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agro-climatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.





Almada® MZ

Fungicida antiperonosporico endoterapico e di contatto.

Composizione:

Dimetomorf puro g 7,5

Mancozeb puro g 66,7

Codice Frac:

40 gruppo H5

M 03

Formulazione: Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



Registrazione n°: 17163 del 08/03/2018



Sacchetto: 1 kg

Cartone: 12x1 kg

Pallet: 480 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Almada® MZ** è una miscela fungicida a base di Dimetomorf e Mancozeb dotato di attività citotropica e locosistemica, nonché di contatto, specifica per il controllo della peronospora, della vite, della patata, delle lattughe e delle insalate.
- ✓ Il Dimetomorf penetra nelle foglie e si ridistribuisce all'interno ove esercita una protezione endoterapica nei confronti del fungo che si estende anche nella giovane vegetazione in via di formazione.

VANTAGGI:

1. La spiccata capacità di copertura del Mancozeb, in particolare in presenza di condizioni umide, garantisce una perfetta tenuta del prodotto anche in presenza di condizioni particolarmente predisponenti la malattia.
2. Grazie ai diversi meccanismi di azione delle sue sostanze attive, **Almada® MZ** si inserisce perfettamente nei programmi di gestione delle resistenze.
3. Ottima resistenza al dilavamento e protezione prolungata.



Sacco: 10 kg

Pallet: 500 kg

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	2-2,5	A partire dalla fase di sviluppo vegetativo (7-8 foglie), fino a chiusura grappolo (BBCH 18-77). Ogni 10-12 gg.	3	28
PATATA	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,5	A partire dallo sviluppo vegetativo (2-3 foglie), fino a maturazione tuberi. Ogni 10-12 gg.		21
LATTUGHE e INSALATE	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	3	Dalla 2ª-3ª foglia, fino al pieno accrescimento (BBCH 12-47). Ogni 10-12 gg.		





Almada® Trio

Fungicida antiperonosporico sistemico e di contatto.

Composizione:

Dimetomorf puro 6%

Folpet 25%

Fosetil alluminio 50%

Codice Frac:

40 gruppo H5

M 04

P 07 (33)

Formulazione: Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



Registrazione n°: 16204 del 21/02/2018



Sacco: 6 kg

Pallet: 600 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Almada® Trio è una miscela fungicida a base di tre sostanze attive con differenti caratteristiche, modalità di azione e comportamento all'interno della pianta, attivo nei confronti della Peronospora della vite.
- ✓ Il Fosetil Alluminio stimola le naturali difese della pianta, agisce rallentando lo sviluppo del fungo e potenzia l'effetto degli altri componenti della miscela.
- ✓ Il Folpet svolge una fondamentale azione preventiva fissandosi sulla lamina fogliare e sul grappolo impedendo al fungo di penetrare.
- ✓ Il Dimetomorf viene assorbito dalla foglia e si redistribuisce localmente proteggendo dall'interno la vegetazione nei confronti delle spore del fungo che hanno già iniziato il processo di germinazione e di penetrazione nella foglia.
- ✓ E' un formulato unico ed esclusivo ASCENZA®.

VANTAGGI:

1. Formulazione completa, pronta all'uso con complementari modi di azione.
2. Elevata sinergia fra i tre principi attivi.
3. Elevata persistenza e resistenza al dilavamento.
4. Grazie all'azione multisito di Folpet e Fosetyl Alluminio, il Dimetomorf viene protetto dalla insorgenza di possibili riduzioni di efficacia.

® Marchio registrato.




Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.


EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	3	Dallo sviluppo vegetativo fino alla chiusura del grappolo (BBCH 18-77). Ogni 10-12 gg.	2	28

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina, con formulati contenenti rame e prodotti oleosi.
- ✓ Eventuali prodotti contenenti azoto potrebbero originare fenomeni di incompatibilità per cui è necessario effettuare saggi preliminari.





Azox[®] 25 SC

Fungicida ad ampio spettro d'azione in
sospensione concentrata.

Composizione:

Azoxystrobin puro g 22,93 (=250 g/l)

Codice Frac:

11 gruppo C3

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:



Registrazione n°: 15888 del 11/12/2017

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Azox[®] 25 SC è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia chimica delle strobilurine. Agisce a livello dei mitocondri bloccando la respirazione e quindi la germinazione e la crescita di micelio e spore.
- ✓ Azox[®] 25 SC viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie con movimento translaminare sistemico, risultando efficace a basse dosi d'impiego.

VANTAGGI:

1. Efficacia consolidata di Azoxystrobin contro le patologie fungine della spiga e contro il brusone del riso.
2. Grazie al rapido assorbimento l'efficacia fungicida del prodotto non viene ridotta da piogge cadute due ore dopo l'applicazione.
3. Azox[®] 25 SC è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari predatori) e non favorisce lo sviluppo degli acari.



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 800 L

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.


EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
FRUMENTO	Oidio (<i>Erysiphe graminis</i>) Ruggini (<i>Puccinia striiformis</i>) Septoria (<i>Septoria spp.</i>)	1	Dalla fine della levata e prima della fine fioritura. Ogni 14 gg.	2	35
ORZO	Oidio (<i>Erysiphe graminis</i>) Ruggini (<i>Puccinia spp.</i>) Striatura bruna dell'orzo (<i>Helminthosporium graminea</i>)		Dalla la fine della levata e prima della fine fioritura. Ogni 14 gg.		
RISO	Brusone del riso (<i>Pyricularia oryzae</i>) Elmintosporiosi (<i>Helminthosporium spp.</i>)		Tra la fase di fine botticella e la fine della spigatura.	1	28
CUCURBITACEE A BUCCIA NON COMMESTIBILE (melone, zucca, cocomero)	Oidio (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	0,8	Applicare ad inizio fioritura al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Ogni 10 gg.	3	3
CUCURBITACEE A BUCCIA COMMESTIBILE (zucchini, cetriolo, cetriolino)(in serra)					
POMODORO (in serra)	Oidio (<i>Leveillula taurica</i>)	0,8	A partire dall'inizio della fioritura al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Ogni 10 gg.	2	

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Per evitare il rischio di insorgenza di ceppi resistenti è necessario applicare Azox® 25 SC secondo le attuali linee guida del FRAC per quanto concerne i preparati a base di strobilurine.





Azupec® 80 WG

Fungicida antioidico a base di Zolfo.

Composizione:

Zolfo puro (esente da Selenio) g 80

Codice Frac:

M 02

Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:

Registrazione n°: 12949 del 28/05/2009

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Azupec® 80 WG Indicato per il controllo di tutte le forme di Oidio o Mal Bianco.

VANTAGGI:

1. Zolfo esente da selenio, selettivo nei confronti delle principali colture anche ad alti dosaggi.
2. Microgranulo idrodispersibile ad elevatissima solubilità, indicato anche in caso di miscele complesse con altri agrofarmaci o applicazioni a basso volume.
3. Autorizzato l'impiego in Agricoltura Biologica Reg. 834/07/CE.



Sacchetto: 1 kg

Cartone: 18x1 kg

Pallet: 720 kg



Sacco: 5 kg

Pallet: 500 kg



Sacco: 25 kg

Pallet: 1000 kg

® Marchio registrato.




Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (g/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Oidio	275-400	Applicare preventivamente dalla 5ª - 8ª foglia. Ogni 7 gg.	8	5
POMODORO		150-200	Applicare alla comparsa dei primi sintomi. Ogni 10 gg.	6	3

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Compatibile con i più comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.) olii minerali e formulati a base di Captano.





Back® 100 SC

Fungicida per la lotta contro la Peronospora della patata, pomodoro e vite.

Composizione:

Cyazofamid puro g 9,5 (=100 g/L)

Codice Frac:

21 gruppo C4

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione n°: 17605 del 23 giugno 2020



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Back® 100 SC è un fungicida ad azione preventiva per il controllo della peronospora della Vite, del Pomodoro e della Patata.

VANTAGGI:

1. Dotato di elevata affinità alle cere cuticolari che conferiscono elevata resistenza al dilavamento
2. Tra gli antiperonosporici in commercio Back® 100 SC è il prodotto più indicato per la protezione dei frutti, data la sua elevata lipofilia.
3. Back® 100 SC è miscibile con numerosi prodotti presenti in commercio (Azox, Drum, Almada ecc...)
4. Grazie al suo breve intervallo di sicurezza. Back® 100 SC è indispensabile nella difesa di ortaggi con raccolta scalare.
5. Selettivo nei confronti degli insetti pronubi e utili.
6. Inserito nelle Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture.



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 800 L

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,9-1,1	Dalla prefioritura alla maturazione (BBCH 11-89). Ogni 8-10 gg a dose minima e 12-14 a dose massima.	4	21
POMODORO (da industria e mensa) in pieno campo e serra	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,8	Dalla prefioritura alla maturazione (BBCH 12-89). Ogni 7-10 gg.	6	3
PATATA	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)		Dallo sviluppo fogliare alla pre- raccolta (BBCH 11-89). Ogni 5-7 gg, fino a 10 in caso di basso rischio.		7





Cardinal® 50 WG

Fungicida sistemico per la difesa della vite, delle pomacee e drupacee.

Composizione:
Cyprodinil puro g 50

Codice Frac:
9 gruppo D1

Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



Registrazione n°: 16249 del 18/12/2018



Sacchetto: 1 kg

Cartone: 12x1 kg

Pallet: 480 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Cardinal® 50 WG è un fungicida attivo contro Botrite della Vite, Ticchiolatura delle Pomacee e Monilia delle Drupacee.
- ✓ Il meccanismo di azione del Ciprodinil agisce bloccando la biosintesi degli aminoacidi, in questo modo viene inibita la crescita del patogeno.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,75	Tra la fioritura ed invaiatura (BBCH 60-83).	1	7
POMACEE	Ticchiolatura del melo (<i>Venturia inaequalis</i>) Ticchiolatura del Pero (<i>Venturia pirina</i>)	0,5	Tra la fase di orecchiette di topo e pre-fioritura (BBCH 10-59). Ogni 10-14 gg.	3	60
DRUPACEE	Monilia (<i>Monilia fructigena</i>)		Tra lo sviluppo germogli e pre-raccolta. Ogni 10-14 gg.	2	7





Coimbra®

Fungicida antiperonosporico endoterapico per
lattuga e patata.

Composizione:	Codice Frac:
Dimetomorf puro g 8 (= 90 g/l)	40 gruppo H5
Propamocarb g 44,2 (= 500 g/l)	28 gruppo F4

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:

ATTENZIONE

Registrazione: n° 16278 del 03/07/2017



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Coimbra® e' una esclusiva miscela fungicida ASCENZA®.
- ✓ Dotato di attività citotropica-translaminare e sistemica assicura il controllo preventivo, curativo e antisporulante delle peronospore.
- ✓ Assicura una completa protezione della vegetazione esistente e quella in via di sviluppo o più nascosta.
- ✓ E' selettivo nei confronti degli organismi utili e non bersaglio.

VANTAGGI:

1. Formulazione liquida, di facile utilizzo e priva di solventi nocivi.
2. L'effetto sinergico fra le sostanze attive permette un importante incremento di efficacia e persistenza rispetto alla miscela estemporanea.
3. Grazie al rapido assorbimento (2 ore) è resistente al dilavamento.
4. Selettivo per la coltura.
5. È pienamente inserito nei programmi di gestione delle resistenze.
6. In virtù dei differenti meccanismi di azione, Coimbra® non presenta alcun rischio di resistenza incrociata e si inserisce perfettamente nei programmi di difesa integrata.
7. Il propamocarb è altamente efficace su *Pythium*.
8. Eccellente profilo ecotossicologico e tossicologico


® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
PATATA	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	2	Dalle 4-5 foglie fino a inizio maturazione dei tuberi (BBCH 19-81). Ogni 7-12 gg.	3	21
LATTUGA (pieno campo)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)		Dalle 2-3 foglie fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 12-45). Ogni 10-12 gg.		7





Douro® 10 WG

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante per colture arboree e orticole.

Composizione:

Penconazolo puro g 10

Codice Frac:

3 gruppo G1

Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione: n° 13782 del 02/05/2007



Sacchetto: 1 kg

Cartone: 10x1 kg

Pallet: 500 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Douro® 10 WG è un fungicida appartenente alla famiglia chimica dei triazoli, dotato di attività sistemica con azione preventiva, curativa e bloccante.
- ✓ È attivo nei confronti dell'Oidio del Melo, della Vite e di numerose altre colture ed agisce anche nei confronti della Ticchiolatura delle Pomacee.

VANTAGGI:

1. La formulazione WG garantisce la perfetta miscibilità e selettività nei confronti di tutte le più comuni varietà di Melo e Pero.
2. Su Vite esplica anche un effetto collaterale e azione di contenimento contro Black rot (*Guignardia bidwellii*).
3. Viene rapidamente assorbito anche in condizioni difficili (poche ore).
4. Il penconazolo è inserito in tutti i disciplinari di produzione integrata.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (g/hl)		EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
		PREVENTIVI	BLOCCANTI			
VITE DA VINO	Oidio (<i>Uncinula necator</i>) Black rot (<i>Guignardia bidwellii</i>) <i>Pseudopezia</i> spp.	25-30	-	Pre-post fioritura. Ogni 14-16 gg.	-	14
VITE DA TAVOLA		15-20	-	Pre-post fioritura. Ogni 7-10 gg.	-	
		-	50	Attacchi in atto ogni 5-7 gg.	-	
MELO	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>)	30-40	-	Fino alla fase frutto-noce ogni 7-8 gg dopo 10-14 gg.	-	
		-	35-40	In presenza di sintomi. Effettuare 2 applicazioni ogni 7 gg.	2	
			35-40	Per i trattamenti curativi entro le 100 ore dopo la pioggia.		
	Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	30-40	-	Nel periodo estivo: ogni 10-14 gg. In primavera: ogni 10 gg.	-	
		-	30-35	In presenza di sintomi. Ogni 7 gg.	3	
	Malattie da conservazione (<i>Monilia fructigena</i> , <i>Penicilium</i> spp.)	35-40	-	In pre-raccolta. Ogni 7 gg.	3	
PERO	Ticchiolatura (<i>Ventura pirina</i>)	25-35	-	Ogni 10-12 gg.	-	
		-	30-40	Curativo: Entro 100 ore dalla pioggia infettante. Bloccante: In presenza di sintomi ogni 5-7 gg.	2	
PESCO (compreso nettarine e ibridi simili)	Oidio	40-50	-	Dalla caduta dei petali. Ogni 10-14 gg.	-	
	Malattie da conservazione (<i>Monilia fructigena</i> , <i>Penicillium</i> spp., <i>Gleosporium</i> e Muffa grigia)	50	-	In pre-raccolta. Ogni 7 gg.	2-3	
TABACCO	Oidio (<i>Erysyphe cichoracearum</i>)	35-50	-	Alla comparsa dei primissimi sintomi. Ogni 10-14 gg.	2-4	
MELONE ZUCCHINO ZUCCA CETRIOLO PEPERONE POMODORO (in pieno campo)	Oidio	25-50	-	Applicare preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi. Ogni 12-14 gg.	2-4	
ORNAMENTALI E DA FIORE	Oidio e Ruggini	25-50	-	A seconda della specie. Ogni 10- 14 gg.	-	-

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Su floreali e ornamentali data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.





Douro[®] 100 EC

Fungicida antioidico sistemico preventivo, curativo e bloccante.

Composizione: Penconazolo puro g 10,20 (= 100 g/l)
Codice Frac: 3 gruppo G1

Formulazione: Concentrato emulsionabile (EC)

Classificazione CLP



Registrazione: n° 16034 del 30/07/2014



Flacone: 0,25 L

Cartone: 40x0,25 L

Pallet: 500 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Douro[®] 100 EC** è un fungicida appartenente alla famiglia chimica dei triazoli, attivo nei confronti dell'Oidio della vite e di numerose altre colture.
- ✓ La sua attività sistemica ha un'azione preventiva, curativa e bloccante.
- ✓ Il prodotto viene assorbito rapidamente anche in condizioni difficili (poche ore).

VANTAGGI:

1. Su vite manifesta un effetto collaterale e azione di contenimento contro Black rot (*Guignardia bidwellii*).
2. La grande efficacia e persistenza del trattamento antioidico si traducono in qualità e quantità delle uve destinate alla vinificazione.
3. È inserito in tutti i disciplinari di produzione integrata.
4. Grazie all'ottima miscibilità è un partner ideale di prodotti ad azione specifica in strategie antiresistenza.



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (ml/hl)		EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
		PREVENTIVI	BLOCCANTI			
VITE DA VINO	Oidio (<i>Uncinula necator</i>) Black rot (<i>Guignardia bidwellii</i>) <i>Pseudopezia Spp.</i>	25-30	-	Pre-post fioritura. Ogni 14-16 gg.	-	14
VITE DA TAVOLA		15-20	-	Pre-post fioritura. Ogni 7-10 gg.	-	
		-	50	Attacchi in atto ogni 5-7gg.	2	
MELO	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>)	30-40	-	Fino alla fase frutto-noce 7-8 gg dopo 10-14 gg.	-	
		-	35-40	In presenza di sintomi. Ogni 7 gg	2	
			35-40	Per i trattamenti curativi entro le 100 ore dopo la pioggia.		
	Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	30-40	-	Nel periodo estivo. Ogni 10-14 gg. In primavera: ogni 10 gg.	-	
		-	30-35	In presenza di sintomi. Ogni 7 gg.	3	
	Malattie da conservazione (<i>Monilia fructigena</i> , <i>Penicilium Spp.</i>)	40-45	-	Durante il pre-raccolto.	3	
PERO	Ticchiolatura (<i>Ventura pirina</i>)	25-35	-	Ogni 10-12 gg.	-	
		-	30-40	Curativo: in presenza di sintomi ogni 5-7gg entro 100 ore dalla pioggia infettante.	2	
PESCO	Oidio	40-50	-	Dalla caduta dei petali. Ogni 10-14 gg.	-	
	Malattie da conservazione (<i>Monilia fructigena</i> , <i>Penicilium spp.</i>)	50	-	In fase di pre-raccolta. Ogni 7 gg.	2-3	
TABACCO	Oidio	35-50	-	Alla comparsa dei primissimi sintomi. Ogni 10-14 gg.	2-4	
MELONE ZUCCHINO ZUCCA CETRIOLO PEPERONE POMODORO (in pieno campo)	Oidio	25-50	-	Alla comparsa dei primi sintomi. Ogni 14-16 gg.	2-4	
ORNAMENTALI E DA FIORE	Oidio e Ruggini	25-50	-	A seconda della specie. Ogni 10- 14 gg.	-	-

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Su floreali e ornamentali, data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.





Drum®

Fungicida citotropico translaminare ad azione preventiva e curativa nei confronti delle peronosporacee che attaccano vite, orticole, tabacco e rosa.

Composizione:
Cimoxanil puro 45%

Codice Frac:
27

Formulazione: Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



Registrazione n°: 15084 del 07/06/2011



Scatola: 500 g

Cartone: 20x0,5

Pallet: 300 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Il Drum® è un fungicida attivo nei confronti delle peronosporacee che attaccano diverse colture.
- ✓ Agisce in un duplice modo, sia per contatto nei confronti degli elementi di propagazione della peronospora (zoospore) che con azione endoterapica nei confronti del micelio che si sviluppa all'interno della lamina fogliare.

VANTAGGI:

1. Il Drum® si caratterizza per la sua formulazione di qualità nell'ambito dei prodotti a base di cimoxanil al 45%.
2. Il Drum® è un partner valido nella gestione delle malattie fungine e ha un ruolo importante nelle strategie anti resistenza.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (g/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	PHI (gg)
VITE	Peronospora (Plasmopara viticola)	40 - 50	Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione fino alla sfioritura.	10
		30 - 35	Dell'allegagione fino alla chiusura del grappolo.	
CARCIOFO	Peronospora (Bremia lactucae)	40 - 50	Dal manifestarsi delle condizioni di infezione fino alla raccolta dei capolini. Effettuare max. 6 trattamenti/anno.	21
LATTUGA	Peronospora (Bremia lactucae)	40 - 50	Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione sia in semenzaio che in campo, ripetendo i trattamenti a cadenza quindicinale. Effettuare max. 5 trattamenti/anno.	7
SPINACIO	Peronospora (Peronospora farinosa)	40 - 50	Trattare quando le piantine sono ancora giovani; in caso di comparsa della malattia ripetere i trattamenti.	10
MELONE	Peronospora (Pseudoperonospora cubensis)	40 - 50	Trattamenti ripetuti dalla fase di post-trapianto fino al frutto giovane.	3
ZUCCHINA, CETRIOLO (in serra)	Peronospora (Pseudoperonospora cubensis)	40 - 50	Trattamenti ripetuti dalla fase di post-trapianto fino al frutto giovane. Effettuare max. 5 trattamenti/anno.	
PISELLO (esclusi piselli da granella secchi e piselli con baccello)	Peronospora (Peronospora pisi)	40 - 50	In vegetazione fino alla fioritura a seconda delle condizioni climatiche	10
AGLIO, CIPOLLA	Peronospora (Peronospora Schleideni)	40 - 50	Dal manifestarsi delle condizioni di infezione in seguito a cadenza quindicinale secondo l'andamento pluviometrico e termico. Effettuare max. 4 trattamenti/anno.	7
PORRO	Peronospora (Phytophthora porri)	40 - 50	Dal manifestarsi delle condizioni di infezione in seguito a cadenza quindicinale secondo l'andamento pluviometrico e termico. Effettuare max. 4 trattamenti/anno.	
PATATA	Peronospora (Phytophthora infestans)	40 - 50	Dal manifestarsi delle condizioni di infezione fino all'approssimarsi del periodo della raccolta. Effettuare max. 6 trattamenti/anno.	
POMODORO	Peronospora (Phytophthora infestans)	40 - 50	Dal manifestarsi delle condizioni di infezione fino alla fruttificazione.	10
TABACCO	Peronospora (Peronospora tabacina)	40 - 50	Dal manifestarsi delle condizioni di infezione in tutti gli stadi di accrescimento; dal semenzaio fino all'approssimarsi della raccolta.	-
ROSA	Peronospora (Peronospora sparsa)	40 - 50	Dal manifestarsi delle condizioni di infezione ripetere i trattamenti ogni 6-10 giorni a seconda dell'andamento pluviometrico e termico.	





Folpec® 50 SC

Fungicida antiperonosporico di contatto per la difesa di vite e pomodoro in sospensione concentrata.

Composizione:

Folpet g 40 (=500 g/l)

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Codice Frac:

M 04

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 13714 del 9/11/2007



Tanica: 10 L

Pallet: 500 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Folpec® 50 SC è un fungicida multisito ad azione preventiva dotato di tre diversi meccanismi di azione sul patogeno: inibizione della respirazione, azione sulla divisione cellulare e interferenza con la permeabilità delle membrane.
- ✓ Attività polivalente su Peronospora, Escoriosi e Botrite. Presenta inoltre un'attività collaterale su Oidio e Marciume nero.
- ✓ La formulazione liquida è dotata di una elevatissima miscibilità e stabilità.

VANTAGGI:

1. Folpec® 50 SC è il partner ideale di fungicidi sistemici o citotropico-translaminari in virtù della capacità di proteggere la vegetazione esistente al momento del trattamento.
2. È indicato all'interno di strategie antiresistenza in virtù dell'azione multisito.
3. È inserito nei disciplinari di produzione integrata della vite.
4. E' selettivo nei confronti dei fitoseidi.
5. La formulazione liquida di Folpec® 50 SC permette una maggiore rapidità di azione ed una maggiore adesività per una migliore penetrazione del prodotto ed una aumentata efficacia. La resistenza al dilavamento è ottimizzata dalla rapidità di assorbimento all'interno dei tessuti vegetali.
6. L'ottimale coefficiente di ripartizione ottanolo acqua (K_{ow} LogP= 3, 11) di Folpet conferisce alta persistenza d'azione e forte resistenza al dilavamento.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO


COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO	Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>)	0,5-1,5 max 3 l/ha	Durante il germogliamento. Ogni 7 gg.	2*	28
	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,2-2 max 2 l/ha	In condizioni favorevoli alla malattia.	10*	28
POMODORO (in campo)	Alternaria (<i>Alternariosi spp.</i>) Cladosporiosi (<i>Fulvia fulva</i>) Antracnosi (<i>Colletotrichum coccodes</i>) Septoriosi (<i>Septoria lycopersici</i>) Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,25-0,5 max 2,5 l/ha	Intervenire dallo stadio 3-4 foglie.	4	7
POMODORO (in serra)		0,25-0,32 max 3,2 l/ha		3	7

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione della Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Oli Bianchi.
- ✓ Attendere almeno 20 giorni da eventuali applicazioni con olii minerali e prodotti a base di zolfo prima di eseguire il trattamento.

* numero massimo di applicazioni complessive su vite da vino per stagione.





Folpec® 80 WG Advance

Fungicida antiperonosporico di contatto per la difesa di vite e pomodoro.

Composizione:
Folpet g 80

Codice Frac:
M 04

Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 13485 del 14/01/2013

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Folpec® 80 WG Advance è un fungicida multisito ad azione preventiva dotato di tre diversi meccanismi di azione sul patogeno: inibizione della respirazione, azione sulla divisione cellulare e interferenze con la permeabilità delle membrane.
- ✓ Ha attività polivalente su Peronospora, Escoriosi e Botrite. Presenta inoltre attività collaterale su Oidio e Marciume nero.
- ✓ La formulazione in Microgranuli Idrodispersibili (WG) garantisce l'assenza di polverosità, una perfetta solubilità e miscibilità in botte.

VANTAGGI:

1. Folpec® 80 WG Advance è il partner ideale di fungicidi sistemici o citotropico-translaminari grazie alla capacità di proteggere la vegetazione esistente al momento del trattamento.
2. È indicato all'interno di strategie anti resistenza in virtù dell'azione multisito.
3. È inserito nei disciplinari di produzione integrata della vite.
4. E' selettivo nei confronti dei fitoseidi.
5. L'ottimale coefficiente di ripartizione ottanolo acqua (Kow LogP= 3, 11) di Folpet conferisce alta persistenza di azione e forte resistenza al dilavamento.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.



Sacchetto: 1 kg

Cartone: 12x1 kg

Pallet: 480 kg



Sacco: 10 kg

Pallet: 500 kg

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (g/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO	Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>)	150-175 max 1,5 Kg/ha	Dalla ripresa vegetativa fino alle prime foglie.	-	28
	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>) Black rot (<i>Guignardia bidwellii</i>) Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)		In condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e attenersi alle disposizioni dei programmi di protezione della zona.		
POMODORO (in campo)	Alternaria (<i>Alternariosi spp.</i>) Cladosporiosi (<i>Cladosporium fulvum</i>) Antracnosi (<i>Colletotrichum coccodes</i>) Septoriosi (<i>Septoria lycopersici</i>) Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 max 1,5 Kg/ha	In condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.	4	7
POMODORO (in serra)		200 max 2 Kg/ha	In condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.	3	

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione della Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Oli Bianchi.
- ✓ Attendere almeno 20 giorni da eventuali applicazioni con olii minerali prima di eseguire il trattamento.
- ✓ Impiegare volumi di acqua tali da garantire una opportuna copertura delle foglie e dei frutti in particolare in presenza di vegetazione molto sviluppata.





Kresostar®

Fungicida ad azione multisito per il controllo della ticchiolatura delle pomacee, della maculatura bruna del pero e occhio di pavone dell'olivo.

Composizione:	Codice Frac:
Difenoconazolo puro g 12,5 (=125 g/Kg)	3 gruppo G1
Kresoxim metile g 25 (= 250 g/Kg)	11 gruppo C3

Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



Registrazione n°: 16301 del 23/10/2018



Flacone: 0,6 kg

Cartone: 12x0,6 kg

Pallet: 360 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Kresostar® è una miscela innovativa a base di Kresoxim-metile e Difenoconazolo.
- ✓ La composizione del prodotto permette di contrastare i patogeni in maniera completa. Il Kresoxim-metile ostacola la germinazione delle spore e lo sviluppo dei miceli mentre il Difenoconazolo agisce all'interno della pianta esplicando un'azione endoterapica contro il patogeno.

VANTAGGI:

1. Grazie alla presenza di due diversi principi attivi, Kresostar® non presenta rischi di resistenza incrociata, ponendosi come soluzione laddove si sono manifestati fenomeni di resistenza a carico dei tradizionali fungicidi triazolici.
2. L'innovativa formulazione permette di resistere a lungo sulla pianta anche in condizioni climatiche sfavorevoli.


® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
POMACEE	Ticchiolatura del melo (<i>Venturia inaequalis</i>), Ticchiolatura del Pero (<i>Venturia pirina</i>) e Maculatura bruna del Pero (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	0,25-0,30	Dalla fase punte verdi fino al completo sviluppo del frutto (BBCH 53-79). Applicare ogni 12-14 gg	3	35
OLIVO (olive da olio e da tavola)	Occhio di pavone (<i>Cycloconium oleaginum</i>)	0,25-0,30	Dalla fase di differenziazione dei grappoli florali fino alla fase di apertura delle corolle (BBCH 50-59).	2	-





Kubik® MCZ

Fungicida sistemico per il controllo delle peronosporacee della vite, del pomodoro e del tabacco.

Composizione:
Metalaxil puro 8%
Mancozeb puro 64%

Codice Frac:
4 gruppo A1
M 03

Formulazione: Polvere bagnabile (WP)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 14491 del 15/12/2008

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Kubik® MCZ è un fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato per la lotta alle Peronosporacee della Vite, Tabacco e Pomodoro.
- ✓ L'elevata sistemica del Metalaxil, combinata all'azione di copertura del Mancozeb, rende il prodotto particolarmente indicato per i trattamenti nelle fasi iniziali.
- ✓ È caratterizzato da un'elevata capacità protettiva nei confronti dei grappoli in pre-fioritura e in via di allegagione.

VANTAGGI:

1. Kubik® MCZ garantisce la massima protezione della vegetazione esistente e di quella in via di formazione.
2. È particolarmente indicato nei trattamenti di pre e post fioritura.
3. È indicato nelle strategie antiresistenza in virtù della sua attività multisito.



Sacchetto: 1 kg

Cartone: 8x1 kg

Pallet: 400 kg



Sacco: 10 kg

Pallet: 500 kg

® Marchio registrato.




Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (g/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	250	Applicare preventivamente fra accrescimento dei germogli e allegagione. Ogni 14 gg.	-	28
TABACCO	Peronospora (<i>Peronospora tabacina</i>)	300	- In pre-trapianto: In semenzaio, 1-2 gg prima della messa a dimora. - In post-trapianto. Ogni 10 gg.	-	
POMODORO	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	250	Applicare fino alla prima fioritura. Ogni 14 gg.	-	*

* Sospendere i trattamenti prima della fioritura.





Medeiro® 80 WG Advance

Fungicida sistemico per vite, pomacee e agrumi.

Composizione:

Fosetil alluminio puro 80%

Codice Frac:

P 07 (33)

Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP: NC

Registrazione: n° 15363 del 15/03/2012



Sacchetto: 1 kg

Cartone: 10x1 kg

Pallet: 500 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Medeiro® 80 WG** è dotato di sistemica acropeta e basipeta, in grado di garantire una protezione sia della vegetazione esistente che di quella in via di formazione.
- ✓ Una volta assorbito esercita una attività preventiva e di stimolo delle difese naturali della pianta con la produzione di Fitoalessine, sostanze in grado di potenziare la capacità di reazione contro le malattie fungine.
- ✓ Particolarmente efficace nei confronti dei Fitomiceti, Peronospora e Fitoftore (marciumi radicali). Importante effetto collaterale su batteriosi delle frutticole.

VANTAGGI:

1. **Medeiro® 80 WG** è il partner ideale per numerose miscele in virtù della sinergia con numerosi principi attivi sia di contatto che citotropico-translaminari.
2. È inserito in tutti i disciplinari di produzione integrata delle colture in etichetta.
3. Microgranulo dotato di elevata solubilità e ridotta emissione di polveri.
4. È particolarmente indicato in combinazione con prodotti a sito di azione specifico in chiave di strategia antiforesistenza.



Sacco: 10 kg

Pallet: 500 kg

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.


EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (g/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	250-300	Intervenire dalla fase di pre-fioritura. Ogni 10-14 gg.	4	28
POMACEE	Fitoftora (<i>Phytophthora spp.</i>)	250-300	1° applicazione: aprile 2° applicazione: luglio 3° applicazione: settembre-ottobre	3	15
AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio amaro, Mapo, Tangelo)	Fitoftora (<i>Phytophthora spp.</i>)	250-300	1° applicazione: inizio fioritura 2° applicazione: luglio 3° applicazione: ottobre-novembre	3	

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Il prodotto non è compatibile con ossicloruri e idrossidi rameici.
- ✓ Non miscelare a olii, concimi fogliari, fitostimolanti e fitoregolatori.
- ✓ Eventuali miscele con prodotti in sospensione concentrata potrebbero determinare fenomeni di precipitazione, per cui è raccomandato evitare combinazioni complesse con tali tipologie di prodotti.





Ossiram® 70 Flow

Fungicida multisito a base di ossicloruro di rame liquido.

Composizione: Ossicloruro di rame g 36,7 (= 700 g/l) Codice Frac: M 01

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 9420 del 05/11/1997



Flacone: 1 L

Cartone: 10x1 L

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Ossiram® 70 Flow è l'ossicloruro di rame liquido più concentrato in commercio.
- ✓ Ha una formulazione colloidale e finissima.
- ✓ Disciolto in acqua forma una sospensione uniforme che facilita la preparazione della miscela.

VANTAGGI:

1. Ossiram® 70 Flow grazie alla sua formulazione garantisce una copertura uniforme e completa.
2. Manifesta una alta adesività utile.
3. E' resistente ai dilavamenti.
4. L'alto contenuto in principio attivo per litro permette la movimentazione di minori quantitativi di prodotto.
5. Ha un'ampia etichetta su tutti i fruttiferi.
6. Consentito l'impiego in Agricoltura Biologica Reg. 834/07/CE.



Tanica: 5 L

Cartone: 2x5 L

Pallet: 680 L

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (ml/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
AGRUMI	Peronospora (<i>Phytophthora spp.</i>)	75 (max 0,75 l/ha)	Applicare durante la fase di maturazione dei frutti. Ogni 14-21 giorni.	2	15
	Fumaggine e altri	125 (max 1,25 l/ha)			
VITE	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	100-150 (max 1,5 l/ha)	Evitare la fase di fioritura.	4	
OLIVO	Occhio di pavone (<i>Cycloconium oleaginum</i>)	150-250 (max 2,5 l/ha)	Applicare in primavera e/o autunno.	2	
POMACEE	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>)	150-250 (max 2,5 l/ha)	Applicare alla caduta delle foglie. Ogni 14 giorni.	3	-
PATATA (campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	100-150 (max 1,5 l/ha)	Applicare ogni 7-10 giorni.	3	15
DRUPACEE	Bolla (<i>Taphrina deformans</i>) Monilia (<i>Monilia fructigena</i>)	200 (max 2 l/ha)	Applicare alla caduta delle foglie e all'ingrossamento delle gemme.	2	-
POMODORO (campo e serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 (max 2 l/ha)	Applicare ogni 7-10 giorni.	3	3 (in serra) 10 (in pieno campo)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Non trattare durante la fioritura.
- ✓ Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame ad ettaro nell'arco di 7 anni.





Shardif® 250 EC

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, cercosporiosi della barbabietola da zucchero e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano.

Composizione: Difenonazolo puro g 23,23 (250 g/l)
Codice Frac: 3 gruppo G1

Formulazione: Concentrato Emulsionabile (EC)

Classificazione CLP:



Registrazione n°: 16354 del 12/05/2015



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Shardif® 250 EC è un fungicida sistemico a base di difenonazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	<i>Cercospora beticola</i>	0,2-0,3 l/ha	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 15-20 giorni.	21
MELO, PERO	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>) Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	15-20 ml per ettolitro	Massimo 4 trattamenti. Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura.	14
ASPARAGO	Puccinia asparagi, <i>Stemphylium vesicarium</i>	0,5 l/ha	Applicare alla caduta delle foglie e all'ingrossamento delle gemme.	7
SEDANO	<i>Alternaria</i> spp., <i>Septoria</i> spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia.	21
PATATA				14
CAROTA				7
CAVOLFIORE				7
POMODORO	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di ca 10 giorni.	7
	<i>Alternaria</i> spp., <i>Septoria</i> spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia.	
CETRIOLO	Oidi, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni.	
ROSA, GAROFANO	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml per ettolitro	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preli-minari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici..	-
PESCO	Bolla	20-30 ml per ettolitro	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie.	7
	Monilia		1-2 trattamenti pre-raccolta	





Spyrit® Gold

Fungicida antiperonosporico per la difesa della vite da vino.

Composizione:

Azoxystrobin puro 8%

Dimetomorf puro 8%

Folpet puro 40%

Codice Frac:

11 gruppo C3

40 gruppo H5

M 04

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione n°: 16153 del 24/05/2019

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Spyrit® Gold** è un fungicida in microgranuli idrodispersibili con effetto preventivo, curativo ed eradicante, a base di tre sostanze attive sinergiche dotate di differente meccanismo di azione, in grado quindi di prevenire e controllare l'insorgenza di fenomeni di resistenza incrociata.
- ✓ Dimetomorf, principio attivo con proprietà locosistemiche e translaminari, dotato di forte effetto preventivo, curativo e bloccante.
- ✓ Folpet, principio attivo di contatto, azione multisito e fortissimo effetto preventivo.
- ✓ Azoxystrobin, principio attivo con proprietà citotropiche e translaminari, a forte effetto preventivo.

VANTAGGI:

1. Questa particolare formulazione, esente da polvere, permette una dispersione delle sostanze attive in acqua più rapida, completa e stabile e quindi un miglioramento sull'efficacia del trattamento (indipendentemente dalle temperature); inoltre il prodotto risulta più comodo da utilizzare e più sicuro per l'operatore.
2. Folpet è efficace su Escoriosi e ha azione collaterale su Muffa Grigia, Oidio, Black rot e Carie bianca (malattia di post-grandine).

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.



Sacco: 1 kg

Cartone: 10x1 kg

Pallet: 480 kg




Sacco: 10 kg

Pallet: 500 kg

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	2-2,5	Da post germogliamento fino alla chiusura grappolo. Ogni 12-14 gg.	3	28





Tokra®

Miscela fungicida antioidica sistemica e di contatto.

Composizione:

Kresoxim-metile puro g 25

Penconazolo puro g 8,75

Codice Frac:

11 gruppo C3

3 gruppo G1

Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione n°: 16310 del 23/10/2018



Flacone: 0,6 kg

Cartone: 12x0,6 kg

Pallet: 360 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Tokra® è una miscela innovativa a base di Kresoxim-metile e Penconazolo per il controllo di Oidio e Black rot della Vite.
- ✓ Grazie alla presenza di due diversi principi attivi, Tokra® non presenta rischi di resistenza incrociata, ponendosi come soluzione laddove si sono manifestati fenomeni di resistenza a carico dei tradizionali fungicidi triazolici.

VANTAGGI:

1. La composizione del prodotto permette di contrastare i patogeni in maniera completa. Il Kresoxim-metile ostacola la germinazione delle spore e lo sviluppo dei miceli, mentre il penconazolo agisce all'interno della pianta esplicando un'azione endoterapica contro il patogeno.
2. Consente una protezione prolungata anche in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli.


® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Oidio (<i>Uncinula necator</i>) Black Rot (<i>Guignardia bidwellii</i>)	0,3-0,4	Dalla fase di sviluppo vegetativo fino ad inizio maturazione (BBCH 15-85). Ogni 12-14 gg.	3 (uva da tavola) 2 (uva da vino)	35





Tribasic® Flow New

Fungicida a base di solfato di rame tribasico.

Composizione:

Codice Frac:

Solfato di rame tribasico g. 15,2 (= 190 g/l) M 01

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione n°: 17479 del 19/09/2019



Tanica: 10 L

Pallet: 750 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Tribasic® Flow New ha una struttura molecolare tale da rendere subito disponibile parte del rame contenuto, mentre l'altra parte si solubilizza più lentamente garantendo una graduale liberazione degli ioni rame.
- ✓ La formulazione liquida garantisce una maggiore efficienza di assorbimento dello ione metallo grazie all'elevata adesività alla superficie fogliare.
- ✓ Tribasic® Flow New garantisce un'elevata selettività.

VANTAGGI:

1. Ottima efficacia e persistenza d'azione prolungata.
2. Eccezionale adesività grazie alla sua qualità formulativa.
3. Elevata micronizzazione delle particelle che fornisce un ottimo potere coprente.
4. Consentito l'impiego in Agricoltura Biologica Reg. 834/07/CE.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ ANNO	PHI (gg)	
MELO, PERO, COTOGNO	Cancri rameali (<i>Nectria galligena</i> , <i>Sphaeropsis malorum</i> , <i>Phomopsis mali</i>), Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i>) Muffa a circoli (<i>Monilia fructigena</i>), Colpo di fuoco batterico del pero (<i>Erwinia amylovora</i>)	5,16-6,45 (0,43 l/hl)	Trattamenti al bruno.	3-4 Ogni 7-8 gg.	-	
		3,3-5,25 (0,28-0,35 l/hl)	Dall'ingrossamento delle gemme alla comparsa dei mazzetti fiorali.	2-3 Ogni 7-8 gg.		
NESPOLO	Ticchiolatura (<i>Fusicladium eriobotryae</i>)	2,72-3,3 (0,27 l/hl)	Trattamenti al bruno.	2-3 Ogni 7-8 gg.		
PESCO, ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO	Bolla (<i>Taphrina deformans</i>), Cancro rameale (<i>Fusicoccum amygdali</i>), Corineo (<i>Stigmina carpophila</i> = <i>Coryneum beijerinckii</i>), Moniliosi (<i>Monilia laxa</i> , <i>M. fructigena</i>), Nerume o Cladosporiosi (<i>Cladosporium carpophilum</i>), Cilindrosporiosi del ciliegio (<i>Cylindrosporium padi</i>), Scopazzi del ciliegio (<i>Taphrina cerasi</i>), Bozzacchioni del susino (<i>Taphrina pruni</i>). <i>Xanthomonas</i> spp, <i>Pseudomonas</i> spp (azione collaterale)	4-6 (0,4-0,5 l/hl)	Trattamenti al bruno.	3-4 Ogni 14-21 gg.		
VITE DA VINO	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>) ed escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>) Black-rot (<i>Guignardia biwelli</i>)	2,5-3,5 (0,25-0,35 l/hl)	Terza foglia distesa fino a pre-fioritura.	3-5 Ogni 7-8 gg.		21
VITE DA TAVOLA			Chiusura del grappolo fino ad inizio invaiatura.			
OLIVO DA OLIO	Occhio di pavone (<i>Spilocaea oleaginea</i>), Fumaggine (<i>Capnodium</i> spp.), Rogna (<i>Pseudomonas syringae</i> subsp. <i>savastanoi</i>)	4-4,5 (0,4-0,45 l/hl)	Da stasi alla ripresa vegetativa.	3-4 Ogni 7-8 gg.		14
OLIVO DA MENZA			Da inizio maturazione drupe a raccolta.			
AGRUMI	<i>Phytophthora</i> spp. e Fumaggine (<i>Capnodium</i> spp.)	2,5-3 (0,25-0,3 l/hl)	Pre-fioritura (dalla schiusura delle gemme fiorali).	3-4 Ogni 7-8 gg		-
ACTINIDIA	Marciume del colletto (<i>Phytophthora</i> spp.), <i>Alternaria</i> (<i>Alternaria alternata</i>), Maculatura batterica (<i>Pseudomonas viridiflava</i>), Cancro batterico (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>)	6-6,5 (0,6-0,65 l/hl)	Da dormienza fino a ripresa vegetativa.	1-3 Ogni 7-14 gg.		
NOCE, NOCCIOLO, CASTAGNO, MANDORLO	Mal dello stacco (<i>Cytospora Corylicola</i>), Antracnosi del noce, Fersa del castagno (<i>Mycosphaerella maculiformis</i>). Attività collaterale contro: Macchie nere del noce (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>juglandis</i>), Necrosi batterica del nocciolo (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>corylina</i>), Cancro batterico del nocciolo (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>avellanae</i>)	2,5-3,45 (0,25-0,345 l/hl)	Trattamenti al bruno.	2-3 Ogni 7-8 gg.		
PICCOLI FRUTTI (in campo)	Micosferella (<i>Mycosphaerella rubi</i>) e Cancri corticali (<i>Phomopsis cinerescens</i>)	2,4-3,5 (0,3-0,35 l/hl)	Da dormienza fino a ripresa vegetativa.	2-3 Ogni 7-14 gg.		
FRAGOLA (in campo)	Vaiolatura (<i>Mycosphaerella fragariae</i>), <i>Phytophthora</i> spp. e <i>Xanthomonas</i> spp. (azione collaterale)	2-2,5 (0,2-0,25 l/hl)	Al trapianto.	3-4 Ogni 7-8 gg.	7	
POMODORO (in campo e serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Marciume zonato (<i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i>) e <i>Alternaria</i> spp. Attività collaterale su batteriosi	2,5-3,5 (0,25-0,35 l/hl)	In vegetazione.	3-4 Ogni 7-8 gg.	3 (da mensa) 10 (da industria)	
MELANZANA (in campo e serra)	Cancrena pedale (<i>Phytophthora</i> spp.), Antracnosi (<i>Colletotrichum coccodes</i>). Attività collaterale su batteriosi.	2,5-3 (0,25-0,3 l/hl)		2-3 Ogni 7-8 gg.	8	
CUCURBITACE A BUCCIA COMMESTIBILE (in campo e serra)	<i>Pseudoperonospora cubensis</i> , <i>Colletotrichum lagenarium</i> , Maculatura angolare (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>).	2-3 (0,25-0,3 l/hl)		2-3 Ogni 7-8 gg.	3	
CUCURBITACE A BUCCIA NON COMMESTIBILE (in campo)					7	
CARCIOFO	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>), Antracnosi (<i>Ascochyta</i> spp.), <i>Septoria apiicola</i> , Batteriosi (attività collaterale)	1,5-3 (0,25-0,3 l/hl)	Dopo la raccolta dei turioni.	3-4 Ogni 7-8 gg.	3	
ASPARAGO					-	
PISELLO, PISELLO MANGIATUTTO, FAGIOLO, FAGIOLINO, LENTICCHIA (in campo e serra)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i> , <i>Peronospora schleideni</i> , <i>Peronospora pisi</i> , <i>Peronospora brassicae</i> , <i>Peronospora</i> spp.), <i>Alternaria</i> spp., Antracnosi (<i>Ascochyta</i> spp. <i>Colletotrichum</i> spp.). Batteriosi (attività collaterale)	1,5-3 (0,25-0,3 l/hl)	In vegetazione	2-3 Ogni 7-8 gg.	3	
ORTAGGI A BULBO (in campo)					3	
CAVOLI AD INFIORESCENZA (in campo)					14	
PATATA (in campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>) e <i>Alternaria</i> spp. Attività collaterale su Batteriosi.	3-4 (0,3-0,4 l/hl)		3-4 Ogni 7-8 gg.	7	
CIPRESSO	Cancro del cipresso (<i>Coryneum</i> = <i>Seiridium cardinale</i>)	2,8-3,5 (0,35 l/hl)				
COLTURE FLOREALI (in campo e serra)	Peronospora, Alternariosi, Ruggini, Diplicarpon rosae Attività collaterale su batteriosi	1,35-2,25 (0,23 l/hl)	Alla comparsa delle condizioni predisponenti allo sviluppo del patogeno	2-3 Ogni 7-8 gg.	-	



Vegas® 50 WG

Fungicida preventivo per la difesa di olivo, vite e pomacee.

Composizione:
Kresoxim metile puro 50%

Codice Frac:
11 gruppo C3

Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



Registrazione n°: 15986 del 30/11/2018



Flacone: 0,6 kg

Cartone: 12x0,6 kg

Pallet: 360 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Vegas® 50 WG è un innovativo fungicida di copertura dotato di capacità traslocuare.
- ✓ Soluzione esclusiva ASCENZA® per la difesa dell'Olio per il controllo dell'Occhio di Pavone.
- ✓ Ampia spettro di azione su diversi patogeni di Melo, Pero, Vite e Olio.

VANTAGGI:

1. Vegas® 50 WG è selettivo per gli organismi utili (impollinatori).
2. Non influenza la fermentazione e le caratteristiche organolettiche dei vini.


® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (g/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
OLIVO	Occhio di pavone (<i>Spilocaea oleaginea</i>)	200	Dall'inizio dei bottoni floreali alla mignolatura. Ogni 14 gg	2	Non effettuare la raccol- ta prima dello stadio di piena matura- zione.
MELO	Ticchiolatura del melo (<i>Venturia inaequalis</i>) Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)		Applicare in via preventiva, da dopo la fioritura. Ogni 12-14 gg	3	35
PERO	Ticchiolatura del pero (<i>Venturia pyrina</i>) Maculatura bruna (<i>Stemphylium vesicarium</i>)				
VITE	Oidio (<i>Uncinula necator</i>)	300	Iniziare i trattamenti alla comparsa dei grappoli. Ogni 12-14 gg	2	
	Black rot (<i>Guidnardia bidwellii</i>)			3	





Vitipec® MZ

Fungicida preventivo e curativo per la difesa di Vite, Patata, Pomodoro e Tabacco.

Composizione:

Cimoxanil puro 4%

Mancozeb 46,5%

Codice Frac:

27

M 03

Formulazione: Polvere bagnabile (WP)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 15219 del 19/12/2011

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Vitipec® MZ agisce sia per contatto che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotropica e translaminare.
- ✓ È dotato di azione multisito preventiva, curativa ed eradicante.

VANTAGGI:

1. Vitipec® MZ protegge la vegetazione esistente e quella in via di formazione.
2. È dotato di spiccata capacità protettiva nei confronti del grappolo di vite e della vegetazione.



Sacchetto: 1 kg

Cartone: 10x1 kg

Pallet: 400 kg



Sacco: 10 kg

Pallet: 500 kg

® Marchio registrato.




Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (g/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>) Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>)	200-300	Applicare da germogliamento (Escoriosi) fino a che persistono le condizioni per lo sviluppo della peronospora.	28
PATATA	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>) Alternaria	250-350	Impiegare le dosi più alte con pressione della malattia più elevata.	
POMODORO				
TABACCO	Peronospora (<i>Phytophthora tabacina</i>)	300-350		

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI


- ✓ Compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina.





INDICE ERBICIDI

	Bentador®	68
	Callicore®	70
NEW	Drone	72
	Extensor® OD	74
	Hereu®	76
	Hereu® SC	78
NEW	High® Top	80
	Joystick®	82
	Matsuda® 25 WG	84
	Mohican® 500 SC	86
	Nicozea® OD	88
NEW	Nirvana®	90
	Plaza®	92
NEW	Pendi® 40	94
	Sudoku®	96
NEW	Taisen® 800 EC	98





Bentador®

Erbicida selettivo di post-emergenza per il mais.

Composizione:

Bentazone puro 40,8 (= 480 g/l)

Gruppo HRAC:

C3

Formulazione: Concentrato solubile (SL)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 16419 del 16/06/2016



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 800 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Bentador® è un'erbicida selettivo di contatto per il controllo di infestanti dicotiledoni e ciperacee del mais.
- ✓ L'assorbimento della sostanza attiva avviene prevalentemente per via fogliare, secondariamente per via radicale, nel giro di poche ore.

VANTAGGI:

1. Bentador® è l'alternativa su mais per un efficace controllo delle ciperacee e numerose altre infestanti a foglia larga.
2. La formulazione SL permette un agevole dosaggio e miscelazione del prodotto.
3. Maggiore sicurezza per l'operatore grazie alla bassa concentrazione del principio attivo.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili: Anagallide (*Anagallis arvensis*), Amaranto (*Amaranthus spp*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Chenopodio (*Chenopodium spp*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Ravanella selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Stramonio (*Datura stramonium*), Senape (*Sinapis arvensis*), Zigolo (*Cyperus esculentus*).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)
MAIS	Applicare in post emergenza della coltura fino ad un massimo di 5-6 foglie di altezza	2,5-3

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Si consigliano volumi d'acqua compresi fra i 200 e 400 litri/ha.





Callicore®

Erbicida di post emergenza selettivo per il mais.

Composizione:

Mesotrione puro g 9,22 (= 100 g/l)

Gruppo HRAC:

F2

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:



Registrazione n°: 16381 del 20/12/2017



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Callicore® è un erbicida selettivo di post emergenza per il mais in sospensione concentrata, attivo nei confronti di numerose infestanti di difficile controllo.
- ✓ Agisce prevalentemente per via fogliare e parzialmente per via radicale.
- ✓ Una volta assorbito viene traslocato sia in modo ascendente che discendente diffondendosi rapidamente all'interno della pianta infestante.
- ✓ I sintomi compaiono in genere 3-4 giorni dopo il trattamento.

VANTAGGI:

1. Callicore® è efficace nei confronti delle infestanti resistenti alle triazine (Es. Terbutilazina) e Solfoniluree (Gruppo degli ALS), risultando un prodotto fondamentale nell'ottica di una strategia antiresistenza mirante a preservare integra l'efficacia degli erbicidi esistenti.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili:

Dicotiledoni: Amaranto (*Amaranthus hybridus*, *Amaranthus retroflexus*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Forbicina comune (*Bidens tripartita*), Farinello (*Chenopodium album*), Stramonio (*Datura stramonium*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Persicaria (*Persicaria maculosa*), Solano o erba morella (*Solanum nigrum*), Stellaria (*Stellaria media*), Nappola (*Xanthium strumarium*).

Graminacee: Digitaria (*Digitaria sanguinalis*), Giavone (*Echinochloa crusgalli*), Cipero o cipollino (*Cyperus rotundus*).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)
MAIS (da granella e da insilato)	Dicotiledoni: applicare su infestanti già emerse o in via di emergenza, fra le 2 e le 8 foglie del mais.	0,75-1,5
	Graminacee: applicare nei primi stadi di sviluppo delle infestanti (2-3 foglie).	1-1,5
	In presenza di Cipero.	1,5

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Applicazioni di **Callicore®** dopo geoinsetticidi contenenti Fosfororganici o Carbammati applicati in fase di semina del mais o in miscela con insetticidi fogliari a base Fosfororganici o Carbammati potrebbero interferire negativamente con il normale sviluppo del mais.
- ✓ Alcuni giorni dopo il trattamento si possono manifestare sulla coltura alcune lievi decolorazioni o imbianchimenti fogliari, sintomi transitori che non hanno conseguenze nei confronti dello sviluppo e della produzione del mais. Il prodotto è fitotossico per le colture non presenti in etichetta.
- ✓ Non applicare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme o mais dolce.
- ✓ Se applicato in miscela o su secondi raccolti si consiglia di utilizzare le dosi più basse.





Drone®

Erbicida sistemico selettivo per il trattamento fogliare su mais per il controllo delle malerbe dicotiledoni annuali e perenni.

Composizione:

Dicamba puro g 42,1 (= 480 g/l)

Gruppo HRAC:

O

Formulazione: Concentrato solubile (SL)

Classificazione CLP: NC

Registrazione n°: 16831 del 20/12/2017

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Drone® è un erbicida sistemico di post-emergenza che svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe.
- ✓ Viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica. Il prodotto è in grado di controllare malerbe dicotiledoni perenni ed annuali.

VANTAGGI:

1. Drone® è un'erbicida utile a completare una strategia di post-emergenza per il controllo totale delle infestanti presenti, sia dicotiledoni perenni che annuali.



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

© Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili:

Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranti (*Amaranthus spp.*), Forbicina (*Bidens spp.*), Vilucchione (*Calystegia sepium*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Farinello (*Chenopodium album*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio (*Convolvulus arvensis*), Stramonio (*Datura stramonium*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Attaccamano (*Galium aparine*), Uva turca (*Phytolacca decandra*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Con-volvolò nero (*Fallopia convolvulus*), Romice (*Rumex spp.*), Sicio (*Sicyos angulatus*), Senecione (*Senecio vulgaris*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Spergola (*Spargula arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Soffione (*Taraxacum officinalis*), Vecce (*Vicia spp.*), Nappola italiana (*Xanthium spp.*).

Infestanti mediamente sensibili:

Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Crisantemo selvatico (*Chrysanthemum segetum*), Cocomero asinino (*Echallium elaterium*), Papaveri (*Papaver spp.*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape comune (*Sinapis arvensis*), Ortica (*Urtica urens*), Veronica (*Veronica spp.*).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	VOLUME D'ACQUA	DOSE (l/ha)
MAIS	BBCH 12-15	200-400 litri/ha	0,6 litri/ha

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Applicare in post-emergenza con infestanti già nate e quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di 40 cm.
- ✓ Non sono previsti impatti nelle normali colture a rotazione.
- ✓ Drone® non può essere applicato su mais dolce e mais destinato alla produzione di semi.





Extensor® OD

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais.

Composizione:	Gruppo HRAC:
Nicosulfuron puro g 1,9 (=20 g/l)	B
Sulcotrione g 14,3 (=150 g/l)	F2

Formulazione: Dispersione oleosa (OD)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 15746 del 31/03/2016

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Extensor® OD** l'unica formulazione in dispersione oleosa a base di Nicosulfuron e Sulcotrione sul mercato italiano.
- ✓ Ideale per gli interventi di post emergenza sul mais, da solo o in associazione con graminicidi residuali, ad ampio spettro d'azione per il controllo di infestanti graminacee e dicotiledoni, compresa la sorghetta da seme e da rizoma.
- ✓ Agisce in modo sistemico per via fogliare e radicale.
- ✓ Totale selettività per il mais.

VANTAGGI:

1. Attivo anche in presenza di condizioni sfavorevoli per le applicazioni di pre-emergenza (siccità, terreni organici, etc.).
2. Efficacia su graminacee e dicotiledoni, grazie alla sinergia tra sulcotrione e nicosulfuron, esaltata dalla speciale formulazione in dispersione oleosa.
3. Perfetta stabilità e miscibilità del prodotto.
4. La formulazione OD garantisce efficacia e selettività senza l'aggiunta di bagnanti o additivi.



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 800 L



Tanica: 10 L

Pallet: 500 L

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili:

Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Farinello con foglie di viburno (*Chenopodium opulifolium*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*) (max 2-3 foglie), Giavone (*Echinochloa crus-galli*) (max 2-3 foglie), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Fienarola comune (*Poa annua*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Porcellana comune (*Portulaca oleracea*), Setaria (*Setaria spp.*) (max 2-3 foglie), Morella comune (*Solanum nigrum*).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)
MAIS	Applicare con infestanti allo stadio di 2-3 foglie massimo. Applicare tra le 2 e le 8 foglie della coltura.	Trattamento unico: 2 l/ha Trattamento frazionato: 2 interventi da 1 l/ha ogni 14 gg

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Non impiegare su mais dolce, su linee di mais per la produzione di seme.
- ✓ Applicare con mais in buono stato vegetativo. Non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per freddo, ristagni d'acqua o siccità.
- ✓ Nella rotazione colturale dopo l'utilizzo di **Extensor® OD** evitare di seminare piselli proteici, piselli da conserva, spinaci, barbabietole, fagioli o trifoglio





Hereu®

Erbicida selettivo ad ampio spettro in emulsione concentrata.

Composizione: Oxyfluorfen puro g 22 (= 240 g/l) Gruppo HRAC: E

Formulazione: Concentrato emulsionabile (EC)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 12961 del 26/10/2005



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L


CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Hereu® è un erbicida selettivo adatto per applicazioni in pre e post-emergenza delle infestanti.
- ✓ È attivo su un ampio spettro di infestanti annuali, sia dicotiledoni che graminacee.
- ✓ Agisce per contatto sulle infestanti presenti ma anche sulle plantule in via di emergenza.

VANTAGGI:

1. Hereu® è una soluzione di riferimento nel controllo delle infestanti del girasole in pre-emergenza.
2. È il diserbante ideale nella miscelazione con Glifosate per il controllo totale di un ampio spettro di infestanti.

© Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili:

Coda di topo (*Alopecurus spp.*), Fienarola annua (*Poa annua*), Zizzania (*Lolium temulentum*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Centocchio (*Stellaria spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Peverina (*Cerastium spp.*), Ranuncolo (*Ranunculus spp.*), Veccia (*Vicia app.*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Vilucchio bianco (*Calystegia sepium*).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)
VITE POMACEE DRUPACEE NOCCIOLO ARANCIO LIMONE POMPELMO	- pre-emergenza delle infestanti: applicare tra il tardo autunno e l'inizio dell'inverno su terreno pulito. - post-emergenza delle infestanti: applicare ai primi stadi di sviluppo delle malerbe. Consigliata la miscela con erbicidi sistemici e residuali.	1,875
GIRASOLE	Applicare in pre-emergenza delle infestanti.	1
CARCIOFO	Utilizzare sulla fila della coltura.	1 - 1,5 (pre-emergenza) 1,875 (post-emergenza)
VIVAI FORESTALI ED ORNAMENTALI	Applicare in pre-emergenza delle infestanti.	1,875

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Compatibile con altri principi attivi erbicidi.
- ✓ Per tutte le indicazioni trattare il prodotto alla dose prevista con volumi di acqua pari a 400 - 800 l/ha.
- ✓ L'applicazione del prodotto è consentita unicamente in bande lungo la fila tra l'ultima decade di settembre e la prima di maggio.
- ✓ L'area delle bande (area trattata) non deve superare il 30% della superficie totale.
- ✓ La dose minima efficace riportata in etichetta si intende per ettaro.
- ✓ L'applicazione della dose da etichetta lungo la banda permette di rispettare il limite di 150 g/ha di Oxyfluorfen imposto dalla normativa vigente.





Hereu® SC

Erbicida selettivo ad ampio spettro in sospensione concentrata.

Composizione: Oxyfluorfen puro g 42,9 (= 500 g/l) Gruppo HRAC: E

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 16033 del 04/06/2014



Flacone: 500 ml

Cartone: 12x500 ml

Pallet: 510 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Hereu® SC è un erbicida selettivo adatto per applicazioni in pre e post-emergenza delle infestanti.
- ✓ È attivo su un ampio spettro di infestanti annuali, sia dicotiledoni che graminacee.
- ✓ Agisce per contatto sulle infestanti presenti ma anche sulle plantule in via di emergenza.

VANTAGGI:

1. Hereu® SC è una soluzione di riferimento nel controllo delle infestanti del girasole in pre-emergenza.
2. È il diserbante ideale nella miscelazione con altri principi attivi per il controllo totale di un ampio spettro di infestanti.




Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

© Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Principali infestanti sensibili:

Monocotiledoni annuali: Digitaria (*Digitaria sanguinalis*), Orzo (*Hordeum vulgare*), Panico (*Panicum dichotomiflorum*), Coda di topo (*Alopecurus spp.*), Setaria (*Setaria spp.*), Zizzania (*Lolium temulentum*).

Dicotiledoni annuali: Amaranto (*Amaranthus spp.*), Centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), Papavero (*Papaver spp.*), Poligoni (*Polygonum spp.*), Senape (*Sinapis arvensis*) e Crucifere in genere, Datura (*Datura stramonium*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Betonica (*Stachys annua*).

Dicotiledoni perenni: (nei trattamenti di post emergenza): Acetosella (*Oxalis spp.*), Artemisia (*Artemisia spp.*), Malva (*Malva spp.*), Ortica (*Urtica dioica*), Romici (*Rumex spp.*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio (*Convolvulus arvensis*).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI
POMACEE DRUPACEE ARANCIO LIMONE POMPELMO VITE NOCCIOLO MANDORLO	In pre-emergenza contro specie annuali. In post-emergenza consultare l'etichetta per i casi specifici.	0,9	-
OLIVO	Su impianti in produzione fino a 7gg prima del raccolto.	0,9	7
GIRASOLE	Su colture con file di 70-75cm trattare con banda di 20-25cm.	0,5	-
VIVAI DI FORESTALI E ORNAMENTALI	Impiegare solo sulla fila della coltura.	0,5-0,75	
CARCIOFO	- pre-emergenza.	0,5-0,75	
	- post-emergenza.	0,75-0,9	
AREE INCOLTE e SEDI FERROVIARE	Applicare in pre-emergenza o con infestanti presenti o in post-emergenza precoce.	0,5-0,9	

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Compatibile con Glifosate.
- ✓ Per tutte le indicazioni trattare la coltura alla dose prevista con volumi di acqua pari a 400 - 800 l/ha.
- ✓ L'applicazione del prodotto è consentita unicamente in bande lungo la fila tra l'ultima decade di settembre e la prima di maggio.
- ✓ L'area delle bande (area trattata) non deve superare il 30% della superficie totale.
- ✓ La dose minima efficace riportata in etichetta si intende per ettaro.





High® TOP

Erbicida selettivo contro infestanti annuali e poliannuali.

Composizione:

Quizalofop-p-ethyl: g 12 (120 g/l) Idrocarburi;
C10-C13, aromatici (<1% naftalene) Idrocarburi;
C9; Aromatici

Gruppo HRAC:

A

Formulazione: Concentrato Emulsionabile (EC)

Classificazione CLP:



PERICOLO

Registrazione n°: 17306 del 05/09/2018



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ High® TOP è un erbicida attivo contro infestanti annuali e poliannuali. Risulta rapidamente assorbito dall'apparato fogliare delle infestanti bloccandone lo sviluppo.

VANTAGGI:

1. High® TOP è un erbicida utile a completare uno spettro d'azione in miscela con altri erbicidi dicotiledonici autorizzati sulle diverse colture.

© Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili:

Alopecurus myosuroides (coda di volpe), *Avena spp.* (avena selvatica), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella comune), *Phalaris spp.* (falaridi), *Echinochloa crusgalli* (giavone comune), *Lolium multiflorum* (loglio italico), *Setaria spp.* (pabbio), *Sorghum halepense* (sorghetta), *Panicum miliaceum* (miglio), *Hordeum vulgare* (orzo), *Elytrigia repens* (gramigna), *Cynodon dactylon* (gramigna), *Agropyrum repens* (falsa gramigna), *Poa spp.*, *Bromus spp.*
Semi di: *Triticum spp.*, *Paspalum spp.*, *Panicum spp.*, *Eleusine indica*, *Dactylis spp.*

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	VOLUME DI ACQUA litri/ha	Tempo de carenza giorni
FRUTTIFERI (Melo, Pero, Pesco)	0,83-1,25	Infestante: 3-4 foglie	300-400	35
VITE	1,25			35
FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI (mirtilli, lamponi, ribes)	0,83-1,25			42
PATATA	0,83-1,25			56
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	0,83-1,25			60
GIRASOLE	0,83-1,25			84
TABACCO	0,83-1,25			30
BARBABIETOLA	1,25			60
ERBA MEDICA, TRIFOGLIO	0,83-1,25			21
SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana,)	0,83-1,25			15
ORTAGGI A FOGLIA (Lattuga, Scarola, Radicchio, Spinacio, Erbe Aromatiche)	0,83-1,25			28
LEGUMINOSE (Piselli, Fagioli, Lenticchie, Cece)	0,83-1,25			23
OLEAGINOSE (Colza, Lino, Soia, Cotone)	0,83-1,25			84
ORNAMENTALI	0,83-1,25			NA
FORESTALI, VIVAI	0,83-1,25			NA

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione, può portare alla selezione di infestanti resistenti.
- ✓ Appropriate pratiche agronomiche e l'utilizzo del prodotto alternato ad altri erbicidi con differente meccanismo d'azione possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.





Joystick®

Il nuovo erbicida di post-emergenza precoce per i cereali autunno vernini.

Composizione:	Gruppo HRAC:
Diflufenican 40%	F1
Florasulam 2%	B2
Iodosulfuron 5%	B2

Formulazione: Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 16744 del 21/02/2018

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Joystick® è un erbicida selettivo di contatto e residuale, per il controllo di infestanti dicotiledoni e monocotiledoni di frumento tenero e duro, orzo, triticale e segale a base di tre differenti sostanze attive.
- ✓ Diflufenican esplica la sua azione sulle infestanti a foglie larghe in via di germinazione.
- ✓ Si pone come un importante alleato nella prevenzione delle resistenze ai più comuni erbicidi solfonilureici.
- ✓ Florasulam è un erbicida di post-emergenza attivo nei confronti delle infestanti a foglie larghe.
- ✓ Iodosulfuron è un erbicida sistemico di post-emergenza con azione sulle infestanti monocotiledoni.

VANTAGGI:

1. Controllo completo delle principali infestanti dicotiledoni dei cereali, includendo anche le più difficili quali: Veronica, Fumaria, Cardo mariano, Papavero.
2. Azione sinergica con i principali graminicidi di post emergenza, favorendo un aumento dell'efficacia su Loietto, Avena, Alopecuro e Falaride.
3. Registrato su tutti i cereali vernini (esclusa avena): frumento tenero e duro, orzo, segale, triticale, garantendo la massima flessibilità d'uso all'azienda cerealicola.
4. Prima miscela a base di iodosulfuron registrata su orzo.
5. Attivo anche a basse temperature.
6. Altamente sostenibile nella prevenzione dell'insorgenza di popolazioni resistenti, grazie alla combinazione di diversi meccanismi di azione (ALS e PDS - inibizione della biosintesi dei carotenoidi).
7. Joystick® è un prodotto a bassa volatilità e quindi non è soggetto a potenziali problemi di contaminazione da deriva di altre colture (a differenza di MCPA).

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.



Tanica: 0,2 kg

Cartone: 12x0,2 kg

Pallet: 204 kg



Tanica: 1 kg

Cartone: 6x1 kg

Pallet: 216 kg

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili:

Anagallide (*Anagallis arvensis*), Attaccamani (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Soffione minore (*Picris echioides*), Poa (*Poa annua*), Correggiola (*Polygonum aviculare*) Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Veronica (*Veronica spp.*).

Moderatamente sensibili:


Avena selvatica (*Avena fatua*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Loglio rigido (*Lolium rigidum*), Nontiscordardimé minore (*Myosotis arvensis*).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)
FRUMENTO TENERO FRUMENTO DURO ORZO SEGALE TRITICALE	Applicare in post-emergenza precoce delle infestanti dalla terza foglia della coltura fino a fine accestimento (BBCH 13-29).	150-200

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Non impiegare su colture sofferenti da stress idrico, basse temperature, carenze nutrizionali o altri fattori che ne possono deprimere lo sviluppo.
- ✓ Su varietà di frumento di recente introduzione si consigliano saggi preliminari di selettività.
- ✓ Si sconsiglia la trasemina di leguminose dopo il trattamento.
- ✓ E' indispensabile l'abbinamento ad un bagnante per stabilizzare l'efficacia.





Matsuda® 25 WG

Erbicida selettivo per il diserbo di vite, agrumi, olivo e aree non coltivate.

Composizione:

Flazasulfuron puro g 25

Gruppo HRAC:

B2

Formulazione: Granuli Idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione: n° 16474 del 29/03/2018



Flacone: 100 g

Cartone: 10x0,1 kg

Pallet: 144 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Matsuda® 25 WG** è un erbicida sistemico e residuale ad ampio spettro per il controllo in pre-emergenza e post-emergenza precoce delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni.
- ✓ Il prodotto viene assorbito rapidamente attraverso le radici e le foglie e traslocato per via floematica e xilematica in senso ascendente e discendente.

VANTAGGI:

1. **Matsuda® 25 WG** controlla un ampio spettro di infestanti graminacee e dicotiledoni annuali e perenni.
2. Ha una doppia modalità di azione: sistemica e residuale.
3. È efficace contro alcune malerbe difficili come *Lolium* e *Conyza*.
4. È dotato di flessibilità di impiego: perfetta compatibilità con altri principi attivi erbicidi.
5. Formulazione granulare di alta qualità in grado di controllare efficacemente anche le infestanti più difficili.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili:

Amaranto (*Amaranthus* spp.), Farinello (*Chenopodium album*), Coniza (*Conyza canadensis*), Rucola selvatica (*Diplotaxis eruroides*), Loiessa (*Lolium multiflorum*), Malva (*Malva* spp.), Portulaca (*Portulaca oleracea*), Senecione (*Senecio vulgaris*).

Moderatamente sensibili:


Geranio selvatico (*Geranium dissectum*).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)	PHI
VITE DA TAVOLA	Applicare fra fine inverno e inizio primavera, su infestanti che hanno sviluppato al massimo 4 foglie.	60-200	-
VITE DA VINO			
AGRUMI			
OLIVO		oppure in primavera: 60-200 in autunno: 60-100	45
AREE NON COLTIVATE	Con infestanti che hanno sviluppato al massimo 4 foglie.	60-200	-

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ **Avvertenze agronomiche:** in post-emergenza delle infestanti intervenire nei primi stadi di sviluppo (massimo 4 foglie e 10 cm di altezza). Si consiglia l'aggiunta di un coadiuvante tensioattivo non ionico per migliorare l'assorbimento del prodotto.
- ✓ **Numero massimo di applicazioni:** 1 per ciclo colturale/anno.





Mohican® 500 SC

Erbicida selettivo per il controllo delle infestanti a foglia larga su colture arboree e cereali.

Composizione:

Diflufenican puro 42 g (= 500 g/l)

Gruppo HRAC:

F1

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione: n° 16395 del 18/02/2016



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Mohican® 500 SC è un erbicida selettivo ad azione fogliare e residuale.
- ✓ Controlla numerose infestanti a foglia larga.
- ✓ Si applica in pre-emergenza o in post-emergenza precoce delle infestanti.

VANTAGGI:

1. Mohican® 500 SC ha un meccanismo d'azione differente dai principali erbicidi per il controllo della foglia larga in post-emergenza.
2. È un ottimo strumento antiresistenza per la lotta alle dicotiledoni difficili.
3. Abbinato ad altri principi attivi erbicidi permette un ottimale controllo delle erbe infestanti.
4. È l'unico Diflufenican puro sul mercato registrato sulle colture arboree.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili:

Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), Farinello (*Chenopodium album*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Poligonum aviculare*), Silene (*Silene gallica*), Ravanella selvatica (*Raphanus raphanistrum*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Veronica (*Veronica spp.*), Crisantemo delle messi (*Chrysanthemum segetum*), Romice (*Rumex spp.*).

Mediamente sensibili:

Attaccamani (*Galium aparine*), Falsa camomilla (*Anthemis spp.*), Borsa del Pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Spergola (*Spergula arvensis*), Giunco (*Juncus bufonius*).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI
FRUMENTO DURO FRUMENTO TENERO ORZO SEGALE TRITICALE	In pre o post-emergenza fino a inizio accestimento (BBCH 0-29), su infestanti fino a 2-4 foglie vere.	0,33	-
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Applicare durante il riposo vegetativo fino a un mese prima del germogliamento su infestanti fino a 2 - 4 foglie vere.	0,5-0,6	-
DRUPACEE (Pesco, Nettarina, Susino, Albicocco, Ciliegio, Mandorlo)	Applicare in pre-emergenza o su infestanti in fase di primo sviluppo (2-4 foglie)	0,5-0,56	35 giorni prima della raccolta
OLIVO			
AGRUMI		0,5-0,6	-
POMACEE (Melo, Pero)			

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Su colture arboree utilizzare volumi d'acqua compresi fra 200 e 600 litri/ha. Per i cereali a paglia invece si consigliano volumi fra 300 e 600 litri/ha. Tutto ciò al fine di garantire un'ottimale distribuzione del prodotto sulla superficie che ne garantisca l'efficacia.
- ✓ Per tutte le colture effettuare al **massimo 1 applicazione per ciclo culturale**.





Nicozea® OD

Erbicida sistemico di post-emergenza selettivo per il mais.

Composizione: Nicosulfuron puro g 4,18 (= 40 g/l) Gruppo HRAC: B

Formulazione: Dispersione oleosa (OD)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione: n° 13471 del 27/04/2010

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Nicozea® OD possiede un ampio spettro d'azione che comprende la sorghetta da seme e da rizoma, le principali graminacee annuali e numerose dicotiledoni.
- ✓ Agisce in modo sistemico portando al disseccamento delle infestanti dopo alcuni giorni dal trattamento.

VANTAGGI:

1. Nicozea® OD grazie alla speciale formulazione consente un rapido e completo assorbimento del Nicosulfuron nella pianta.
2. La formulazione OD garantisce efficacia e selettività senza l'aggiunta di bagnanti o additivi.



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 800 L

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

GRAMINACEE

Infestanti sensibili: Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Setaria (*Setaria spp.*), Sorghetta (*Sorghum halapense*) da seme e da rizoma.

Mediamente sensibili: Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Panico (*Panicum spp.*).


DICOTILEDONI

Infestanti sensibili: Amaranto (*Amaranthus spp.*), Crespigno (*Sonchus oleraceus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*).

Mediamente sensibili: Stramonio (*Datura stramonium*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*), Persicaria maculosa (*Polygonum persicaria*), Morella comune (*Solanum nigrum*), Centocchio comune (*Stellaria media*).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)
MAIS	Applicare in post-emergenza del mais e delle infestanti. Applicare con il mais tra le 2 e le 6 foglie sviluppate, le dicotiledoni tra le 2 e le 4 foglie e le graminacee da 2 foglie a inizio accestimento.	Trattamento unico: 1-1,5 l/ha Trattamento frazionato: 1+0,5 l/ha





Nirvana

Erbicida selettivo di post-emergenza per il mais
per il controllo delle malerbe dicotiledoni e
graminacee.

Composizione:

Dicamba puro g 55,0

Nicosulfuron g 9,2

Rimsulfuron g 2,3

Gruppo HRAC:

O

B

B

Formulazione: Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione n°: in corso di registrazione



Flaconcino: 440 g

Cartone: 12x440 g

Pallet: 443,52 g

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Nirvana è un erbicida di post-emergenza del mais per il controllo di malerbe dicotiledoni e graminacee.
- ✓ Agisce per assorbimento fogliare e non ha attività residuale, quindi è efficace solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

VANTAGGI:

1. Nirvana la miscela "one-pass" di post emergenza per il controllo completo ed efficace delle infestanti del mais.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti dicotiledoni sensibili:

Amaranthus blitoides, *Amaranthus chlorostachys*, *Amarantus retroflexus* (Amaranti), *Chenopo-dium album* (Farinello), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Senecio vulgaris* (Senecione), *Sola-num nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio).

Infestanti graminacee sensibili:


Echinochloa crus-galli (giavone comune), *Poa annua* (fienarola), *Sorghum halepense* (sorghetta), *Setaria spp.* (pabbio), *Lolium multiflorum* (loglio italico).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)	VOLUME D'ACQUA	NOTE
MAIS	BBCH 13-19 (mais con 3-9 foglie). Post-emergenza della coltura e delle infestanti.	440	200-400/ha	Applicare una sola volta all'anno.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Non utilizzare su mais dolce.
- ✓ Non miscelare con altri prodotti fitosanitari.





Pendi® 40

Diserbante per il controllo di mono e dicotiledoni.

Composizione:

Pendimethalin puro g 38 (= 400 g/L)

Gruppo HRAC:

K1

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione n°: 17203 del 12/04/2018



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Pendi® 40 è un diserbante che agisce nei confronti della germinazione dei semi delle comuni infestanti mono e dicotiledoni.

VANTAGGI:

1. Controllo delle nascite scalari dei giovani.
2. Ampia finestra applicativa.
3. Perfetta selettività della coltura.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Monocotiledoni:

Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Setaria spp.* (Pabbio), *Sorghum halepense* (Sorghetta), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano).

Dicotiledoni:

Amaranthus spp. (Amaranto), *Atriplex spp.* (Atriplice), *Heliotropium europaeum* (Ellotropio selvatico), *Cardaminehirsuta* (Dentaria), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Fumaria spp.* (Fumaria), *Myosotis arvensis*, *Mercurialis annua* (Mercorella), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Portulaca oleracea* (Erba cipollina), *Polygonum spp.* (Poligono), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Thlaspi arvenses* (Erba storna), *Urtica urens* (Ortica comune), *Veronica spp.* (Veronica).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI
MAIS	Applicare in pre-emergenza.	4,4	-
GIRASOLE			
FAGIOLI E FAGIOLINI		3,3	
FAVA E FAVINO			
PISELLO		3,3 - 4,1	
CECE			
CAROTA		3,3	28
ASPARAGO	Applicare durante la fase di riposo vegetativo.		
PATATA	Applicare in pre-emergenza.	4,4	-
PEPERONE	Applicare alla fase di pre emergenza o pre trapianto.	3,3	
CAVOLFORE	Applicare alla fase di pre-trapianto.	3-3,3	
SOIA	Applicare in pre-emergenza o pre trapianto.	3	
LATTUGHE E SIMILI (eccetto Rucola)			75
VITE	Applicare il prodotto lungo l'interfila durante il riposo vegetativo.	3,3	-
MELO, PERO	Applicare il prodotto lungo l'interfila tra il periodo della raccolta e la formazione dei nuovi frutti.		
ALBICOCCO, NETTARINA, PESCO	Applicare il prodotto lungo l'interfilatra tra periodo della raccolta e la formazione dei nuovi frutti.		
ARACHIDE	Applicare in pre-emergenza.		
PIANTE ORNAMENTALI ANCHE IN VIVAIO	Applicare in post- trapianto.	3-3,3	
PIOPPO	Applicare il prodotto lungo l'interfila durante la fase di post-trapianto.	2,3-3	
TABACCO	Applicare alla fase di pre-trapianto.	4,4	
TAPPETI ERBOSI	Applicare durante il periodo autunnale o primaverile, in post-emergenza.	2,6-3,3	

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Effettuare il trattamento su terreno ben livellato e lavorato. In assenza di pioggia dopo 7-10 giorni dal trattamento irrigare in modo da favorire la penetrazione del prodotto nei primi strati superficiali del terreno.
- ✓ Seminare in modo uniforme ad una profondità di 3-4 cm, evitando che alcuni semi rimangano scoperti in superficie.





Plaza®

Erbicida selettivo per mais, patata e pomodoro.

Composizione:
Rimsulfuron puro g 25

Gruppo HRAC:
B

Formulazione: Microgranuli Idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 16701 del 20/07/2016



Flacone: 100 g

Cartone: 10x0,1 kg

Pallet: 144 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Plaza® è un erbicida selettivo non residuale di post-emergenza per mais, pomodoro e patata.
- ✓ È in grado di controllare efficacemente numerose graminacee annuali e perenni e infestanti a foglia larga.
- ✓ Viene assorbito a livello fogliare e successivamente traslocato nella pianta.
- ✓ Completamente selettivo per la coltura e ha una rapida degradazione nel suolo.

VANTAGGI:

1. Può essere miscelato con altri erbicidi per ampliare la gamma di infestanti controllate.
2. Completamente selettivo per la coltura e ha una rapida degradazione nel suolo.
3. Agisce inattivando la crescita dell'infestante entro poche ore dall'applicazione (il completo disseccamento avviene in due - tre settimane).

© Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili:

Giavane comune (*Echinochloa crus-galli*), Fienarola annuale (*Poa annua*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Gramigna comune (*Elytrigia repens*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Persicaria (*Poligonum persicaria*).

Mediamente sensibili:

Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Portulaca (*Portulaca oleracea*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Viperina piantaginea (*Echium plantagineum*).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)
MAIS	Applicare in post-emergenza della coltura entro la 4°-5° foglia. In caso di infestazioni di dicotiledoni applicare 2 volte a 8-15 gg.	Trattamento unico: 50 g/ha Trattamento frazionato: 30 + 20 g/ha
POMODORO	Applicare in post-trapianto nel periodo fra 3°-8° foglia. In caso di infestanti ad emergenza scalare e graminacee perenni fare 2 applicazioni a 8-15 gg.	Trattamento unico: 60 g/ha Trattamento frazionato: 60 + 40-50 g/ha
PATATA	Applicare con la coltura alta fra 10-20cm. In caso di infestazione scalare applicare 2 volte a 8-15 gg.	Trattamento unico: 60 g/ha Trattamento frazionato: 60 + 30 g/ha

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Si consiglia un volume d'acqua fra i 200 e 300 l/ha su colture maggiormente sviluppate aumentare il volume a 400 l/ha.
- ✓ Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 10-12 gradi o superiori a 25-26 gradi.
- ✓ Non applicare su patate destinate alla produzione di seme.
- ✓ Utilizzare sempre in miscela con il bagnante specifico Pottok®.





Sudoku®

Erbicida selettivo di pre e post-emergenza per il mais.

Composizione:

Sulcotrione puro 26,6 (= 300 g/l)

Gruppo HRAC:

F2

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione: n° 14527 del 13/01/2011

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Sudoku® è un erbicida di pre e post-emergenza che garantisce un ampio spettro di controllo delle infestanti dicotiledoni oltre ad una attività contro alcune graminacee.
- ✓ Gli effetti dell'azione sono visibili in 3-4 giorni.
- ✓ Agisce prevalentemente per assorbimento fogliare ma mostra anche un complementare assorbimento radicale.

VANTAGGI:

1. Sudoku® consente di intervenire in vari stadi della coltura, garantendo un'elevata flessibilità di utilizzo.
2. La miscela con Nicozea® OD completa lo spettro d'azione di Sudoku® permettendo un controllo pressoché totale delle infestanti tipiche del mais.



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 800 L

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE PRE - EMERGENZA

Infestanti sensibili:

Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Xanthium* spp (Lappola).

INFESTANTI CONTROLLATE IN POST-EMERGENZA

Infestanti sensibili:

Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Helianthus annuus* (Girasole), *Matricaria chamamilla* (Camomilla), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Sinapis arvensis* (Senapeselvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Crespino), *Veronica* spp (Veronica), *Xanthium* spp (Lappola).

Infestanti sensibili nei primi stadi di sviluppo:

Amaranthus spp (Amaranto), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum* spp (Panico).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	(DOSE l/ha)
MAIS	Pre emergenza: in miscela con altri erbicidi selettivi per il mais.	1,5 l
	Post emergenza: applicare da 2 fino a 8 foglie del mais con infestanti dicotiledoni allo stadio 2-4 foglie e graminacee 2-3 foglie.	1-1,5 l

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Il trattamento deve essere eseguito su coltura in buone condizioni vegetative.
- ✓ È compatibile con i principali erbicidi di post-emergenza presenti sul mercato quali Dicamba, Fluroxipir, Bentazone, Nicosulfuron, Rimsulfuron.
- ✓ Non impiegare su linee pure per la produzione di mais da seme.





Taisen® 800 EC

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce per il controllo delle infestanti che danneggiano frumento e orzo.

Composizione:

Prosulfocarb puro g 78,9 (=800 g/l)

Gruppo HRAC:

N

Formulazione: Concentrato emulsionabile (EC)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione n°: 17624 del 21/07/2020



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 880 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Taisen® 800 EC** è un erbicida con ampia flessibilità d'impiego e caratterizzato da una spiccata attività nei confronti di *Galium aparine* (attaccamani) ed altre malerbe che infestano i cereali.
- ✓ Distribuito in pre-emergenza od in post-emergenza precoce della coltura, **Taisen® 800 EC** viene assorbito dalle radici e dall'apice vegetativo delle infestanti in germinazione o delle plantule; la sua azione si manifesta a livello del meristema apicale, determinando un arresto della crescita ed, in seguito, la morte dei tessuti.

VANTAGGI:

1. **Taisen® 800 EC** applicato in pre-emergenza o in post-emergenza precoce, rappresenta la soluzione ideale per il controllo di infestanti difficili come *Lolium spp* e *Galium aparine*, soprattutto in zone dove sono presenti fenomeni di resistenza. L'utilizzo da solo o in miscela con diflufenican dipende dal tipo di infestanti da controllare.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Monocotiledoni:

Lolium sp. (loglio), *Poa annua* (fienarola annuale), *Poa trivialis* (fienarola comune).

Dicotiledoni:


Galium aparine (attaccamani), *Capsella bursa-pastoris* (borsa del pastore), *Fumaria officinalis* (feccia), *Buglossoides arvensis* (erba-perla comune), *Descurainia sophia* (erba sofia), *Hypocotum procumbens* (cornacchina comune), *Papaver rhoeas* (papavero), *Veronica hederaefolia* (veronica a foglia d'edera), *Veronica persica* (veronica comune).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	(DOSE l/ha)
FRUMENTO DURO	In pre-emergenza applicare su terreno ben preparato, con il seme della coltura coperto ed interrato in maniera uniforme alla profondità di almeno 3-5 centimetri. In post-emergenza precoce impiegare fino a 30-50 giorni dalla semina (in ogni caso non oltre la seconda foglia della coltura) su piante ben radicate ed in buone condizioni, quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo.	4-5
FRUMENTO TENERO		
ORZO		

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Su letti di semina zollosi o compattati.
- ✓ Su terreni fortemente sabbiosi o ricchi di scheletro.
- ✓ In tutti quei casi (es. semina diretta) in cui non è possibile assicurare un'adeguata protezione del terreno ai germinelli della coltura.
- ✓ In caso di interruzione della coltivazione con perdita di raccolto, si raccomanda di ripiantare solo patata, orzo o grano.






INDICE

INSETTICIDI E

ACARICIDI

Atlas®	102
Deltasap®	104
Expedient® 10 EC	106
Stiker® Flow	108
Toreador®	110
Vasco®	112





Atlas®

Insetticida ad ampio spettro di azione
in formulazione microincapsulata.

Composizione:

Lambda-Cialotrina pura g 9,4 (= 100 g/l)

Gruppo IRAC:

3 A

Formulazione: Sospensione di microcapsule (CS)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 15433 del 22/06/2012



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L


CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Atlas® è un insetticida piretroide fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia.
- ✓ Agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione.
- ✓ Possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo.

VANTAGGI:

1. Atlas® è dotato di un ampio spettro d'azione ed è efficace sugli insetti nei diversi stadi di sviluppo: uova mature, larve e adulti.
2. La formulazione microincapsulata assicura elevata efficacia e persistenza garantendo massima sicurezza per l'utilizzatore.
3. Unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva.

© Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	PARASSITI	DOSE		N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
		(ml/100 l)	(ml/ha)		
DRUPACEE (Pesco, Nettarina)	Afidi (foglie non accartocciate)	10-15	100-150	1	7
	Mosca della frutta	15-17,5	150-175	1-2. Ogni 14 gg.	
DRUPACEE (Albicocco)	Afidi (foglie non accartocciate)	15-25	150-250	1	
	Mosca della frutta				
POMACEE (Melo, Pero)	Afidi (foglie non accartocciate)	15	150	1	
	Carpocapsa			1-2. Ogni 14 gg.	
	Psilla del pero			1-2. Ogni 14 gg.	
NOCCIOLO	Balanino	20-25	200-250	1	
VITE DA VINO	Tignola e tignoletta	25-30	250-300	1	21
	Cicaline	15-25	150-250		
VITE DA TAVOLA	Cicaline	15	150	1	
CEREALI (Avena, Frumento, Orzo)	Afidi	15-20	150-200	1	30
MAIS	Piralide	20-25	200-250	1	28
	Afidi	15-20	150-200		
	Nottue	10-12,5	100-125		
ZUCCHINE	Afidi	10-15	100-150	1	3
POMODORO (pieno campo)	Lepidotteri	15-20	150-200	1-2. Ogni 14 gg.	
	Afidi	10-15	100-150		
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125		
PATATA	Dorifora	15-20	150-200	1-2. Ogni 14 gg.	15
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1	
BRASSICACEE (Cavolfiore, Cavolo broccolo)	Lepidotteri	15-20	150-200	1	7
	Afidi	10-15	100-150		
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125		
FLOREALI E ORNAMENTALI	Afidi	20-15	100-150	1	/

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Il prodotto si impiega ai primi attacchi, quando le foglie non sono accartocciate e in assenza di melata. Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo.





Deltasap®

Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione a base di deltametrina.

Composizione:

Deltametrina g 2,8 (= 25 g/l)

Gruppo IRAC:

3 A

Formulazione: Concentrato emulsionabile (EC)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione: n° 15402 del 10/05/2012



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Deltasap® è un insetticida ad ampio spettro d'azione che agisce per contatto e ingestione.

VANTAGGI:

1. Deltasap® è dotato di un elevato potere abbattente e di una rapida azione iniziale.
2. Permette di proteggere le colture in modo duraturo e con una grande sicurezza di impiego.
3. Ha breve tempo di carenza su numerose colture.
4. Massima selettività per la coltura.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	FITOFAGO	DOSE		N° TRATTAMENTI	PHI (gg)	
		(ml/hl)	(l/ha)			
POMACEE (Melo, Pero)	Afide verde del melo	30-50	0,3-0,7	3	7	
	Cydia pomonella					
	Afidi della frutta					
	Lepidotteri					
	Coleotteri					
	Psilla	75	1			
DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio)	Cydia pomonella	30-50	0,3-0,7			
	Afidi della frutta					
	Coleotteri					
	Lepidotteri					
	Psilla	75	1			
VITE	Tignole	40-60	0,4-0,7			
	Cicaline	30-50	0,3-0,6			
OLIVO	Tignola (Prays oleae)	40-60	0,4-0,9			
	Mosca delle olive					
PATATA (pieno campo)	Dorifora della patata	30-50	0,3-0,5			
	Lepidotteri					
	Cavolaia					
ZUCCHINO (pieno campo)	Nottue	50	0,5		3	
	Afidi					
	BRASSICACEE PIENO CAMPO (Cavolfiori, Broccoli e Cavoli a testa)	Lepidotteri	30-50	0,3-0,5		2
Cavolaia						
Nottue						
	Afidi	50	0,5			
LATTUGA E INSALATE*	Lepidotteri	30-50	0,3-0,5	3 (pieno campo) 2 (serra)	7 (serra) 3 (pieno campo)	
	Cavolaia					
	Nottue					
POMODORO	Lepidotteri	30-50	0,3-0,5	3 (pieno campo) 2 (serra)	3	
	Cavolaia					
	Nottue					
	Afidi	50	0,5			
MAIS	Piralide	/	0,5	3		
	Diabrotica		0,3			
	Nottue					
CEREALI (no riso)	Lepidotteri	/	0,3		3	30
	Afidi					
NOCCIOLO	Afidi	50	0,5			
ORNAMENTALI IN CAMPO	Afidi	50	0,5			3

* esclusa la scarola e le baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ In pieno campo applicare a intervalli di 14 giorni, in serra a 7 giorni.
- Non è miscibile con prodotti a reazione acida/alcalina.





Expedient® 10 EC

Insetticida specifico per la lotta a cocciniglie e mosche bianche.

Composizione:

Pyriproxyfen puro g 10 (=100 g/l)

Gruppo IRAC:

7C

Formulazione: Emulsione concentrata (EC)

Classificazione CLP:



PERICOLO

Registrazione: n° 16420 del 16/06/2016



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Expedient® 10 EC è un prodotto ovo-larvicida con azione indiretta sugli adulti.
- ✓ E' un prodotto analogo dell'ormone giovanile (JHM) attivo principalmente contro il genere Homoptera.

VANTAGGI:

1. E' caratterizzato da una lunga durata d'azione prolungando l'attività di protezione.
2. Azione indiretta sugli stadi adulti grazie alla riduzione della fertilità.
3. La specificità di azione permette una elevata selettività verso gli artropodi ausiliari e gli impollinatori. In particolare la sostanza attiva si può applicare anche in presenza di colonie di bombi.

© Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	FITOFAGO	DOSE		EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
		(ml/hl)	(l/ha)			
POMACEE (Melo, Pero)	Cocciniglia di San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	40-50	0,5	Applicare ad inizio primavera in pre-floritura sulle forme giovanili svernanti	1	-
DRUPACEE (Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino, Ciliegio)	Cocciniglia di San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)					
AGRUMI	Cocciniglia dell'olivo (<i>Saissetia oleae</i>), Cocciniglia bianca del limone (<i>Aspidiotus neri</i>), Cocciniglia grigia degli agrumi (<i>Parlatoria pergandei</i>), Cocciniglia rossa della California (<i>Aonidella aurantii</i>), Cocciniglia a virgola degli agrumi (<i>Lepidosaphes spp.</i>)	50-75	1,25	Applicare alla comparsa delle prime forme larvali, preferibilmente della prima generazione	1	30
POMODORO (in serra)	Mosca bianca (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporarum</i>)	75	1,25	Applicare alla comparsa delle primissime forme adulte	2	3

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

✓ Il prodotto si impiega da solo.





Stiker® Flow

Acaricida ovo-larvicida per la lotta contro gli acari.

Composizione:

Exitiazox puro g 24 (= 258,7 g/l)

Gruppo IRAC:

10A

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 16083 del 21/05/2014



Flacone: 250 ml

Cartone: 40x250 ml

Pallet: 500 L


CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Il prodotto possiede un'azione translaminare e agisce sulle uova e sulle larve nei vari stadi di sviluppo dei Ragnetti rossi (es. *Panonychus citri*, *Tetranychus urticae*) e di quelli gialli (es. *Eotetranychus carpini*)
- ✓ Esplica un'azione sterilizzante sulle femmine bloccando lo sviluppo della progenie.

VANTAGGI:

1. Lunga persistenza d'azione.
2. Selettivo nei confronti degli insetti utili.

© Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.


EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	FITOFAGO	DOSE (ml/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	PHI (gg)
AGRUMI (Pompelmo, Tangelo, Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola)	<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i> , <i>Eotetranychus carpini</i>	4-6 (max 40-150 ml/ha)	Inizio dell'infestazione	14
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	<i>Tetranychus urticae</i>	20-30 (max 100-300 ml/ha)	Inizio dell'infestazione	21
POMACEE (Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo)		20-30 (max 160-300 ml/ha)	Inizio dell'infestazione	28
FLOREALI ED ORNAMENTALI (campo e serra)		20 (max 100-200 ml/ha)	Inizio dell'infestazione	-

Sulle colture in etichetta è ammesso un solo trattamento.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Uso consentito in pieno campo e serra.
- ✓ Il prodotto non è miscibile con miscele alcaline come Polisolfuri e Calce.





Toreador®

Insetticida-aficida sistemico per serre permanenti.

Composizione:

Imidacloprid puro g 17,1 (= 200 g/L)

Gruppo IRAC:

4A

Formulazione: Concentrato Solubile (SL)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione: n° 13477 del 31/07/2009

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Il prodotto ha un'azione persistente nel tempo.
- ✓ Agisce principalmente per ingestione ed è efficace nei confronti di alcuni fitofagi quali Afidi e Aleurodidi

VANTAGGI:

1. Selettivo verso numerosi insetti utili.



Flacone: 0,25 L

Cartone: 40x0,25 L

Pallet: 500 L



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

© Marchio registrato.




Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	FITOFAGO	DOSE (ml/hl)	PHI (gg)
POMODORO (in serra)	Afidi (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aulacorthum solani</i>), Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	50 (Max 0,5 l/ha)	3

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.





Vasco®

Insetticida acaricida ad azione translaminare ad ampio spettro d'azione.

Composizione:

Abamectina g 1,89 (= 18 g/L)

Gruppo IRAC:

6

Formulazione: Concentrato Emulsionabile (EC)

Classificazione CLP:



PERICOLO

Registrazione: n° 16492 del 24/11/2015

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Vasco® è un insetticida-acaricida che agisce per contatto e ingestione.
- ✓ Penetra rapidamente con movimento translaminare formando una riserva attiva il cui deposito superficiale (prodotto non assorbito) si degrada alla luce solare quindi non interferisce con gli insetti utili.
- ✓ Persiste all'interno della vegetazione prolungando il periodo utile di attività.
- ✓ Agisce contro Acari, Eriofidi, Minatrici e Psilla.
- ✓ Principio attivo di derivazione naturale.
- ✓ Controlla i parassiti su entrambe le pagine fogliari.

VANTAGGI:

1. Nessuna resistenza incrociata con altri insetticidi e acaricidi.
2. Compatibile con altri prodotti in miscela.
3. Rispetta insetti pronubi, antocoridi e fitoseidi (applicato a fine caduta petali).
4. Non ha fasce di rispetto su orticole per la tutela degli organismi acquatici e artropodi non bersaglio, segno dell'elevata qualità della formulazione.
5. Ampio spettro d'azione.
6. Ridotti tempi di carenza su pero, melo, melanzana, fragola, lattughe, vite e pomodoro.
7. Pesco, zucchini e zucca in etichetta.

© Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 600 L

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	FITOFAGO	DOSE		EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI PHI (gg)		
		(ml/hl)	(l/ha)				
AGRUMI (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone)	Minatrice serpentina (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	40	0,3-0,8	Intervenire alla comparsa delle mine sui primi getti. Ogni 7gg.	1-3	10	
	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i> , <i>Aceria sheldoni</i>)		0,4-0,8	Intervenire alla comparsa delle forme mobili da allegagione a ingrossamento frutto. Ogni 7gg.			
MELO	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> e <i>Panonychus ulmi</i>)	80	0,60-0,96	Intervenire da fine caduta dei petali alla comparsa dei fitofagi. Ogni 15gg.	1-2	3	
PERO	Psylla (<i>Psylla spp.</i>)	50-100	0,375-1,2	Intervenire a fine caduta petali o nelle generazioni successive alla comparsa delle prime neanidi. Ogni 15gg.		3	
	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> e <i>Panonychus ulmi</i>)	80	0,60-0,96	Intervenire a fine caduta petali oppure alla comparsa delle prime forme mobili. Ogni 15gg.			
PESCO	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i> , <i>Bryobia rubricolus</i>)	50-100	0,5-1,2	Intervenire a fine caduta petali oppure alla comparsa delle prime forme mobili.	1	14	
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i>)		0,25-1,0 (vite da vino) 0,5-1,2 (vite da tavola)	Intervenire a fine caduta petali oppure alla comparsa delle prime forme mobili. Non trattare durante la fioritura.		10	
POMODORO (pieno campo)	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Polyphagotarsonemus latus</i>)		0, 15-1	Intervenire alla comparsa delle prime forme mobili. Ogni 7gg.		1-3	3
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza spp.</i>)			Intervenire alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.			
POMODORO (in serra)	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Polyphagotarsonemus latus</i>) Eriofide (<i>Aculus lycopersici</i>)	Intervenire alla comparsa delle prime forme mobili. Ogni 7gg.					
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza spp.</i>)	Intervenire alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Ogni 7gg.					
MELANZANA	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	50-80	0,15-0,8	Intervenire alla comparsa delle prime forme mobili. Ogni 7gg.	1-2	5 (pieno campo) 3 (in serra)	
MELONE ZUCCA COCOMERO	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	50-100	0, 15-1	Intervenire alla comparsa delle prime forme mobili. Ogni 7gg.			
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza spp.</i>)			Intervenire alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Ogni 7gg.			
CETRIOLO CETRIOLINO ZUCCHINO (in serra)	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)			Intervenire alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Ogni 7gg.		3	
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza spp.</i>)			Intervenire alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Ogni 7gg.			
FRAGOLA (in serra)	Ragnetti rossi e gialli (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Phytonemus pallidus</i>)	100	0,3-0,4	Intervenire alla comparsa delle prime forme mobili. Ogni 7gg.	1-2	7	
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza spp.</i>)			Intervenire alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Ogni 7gg.			
LATTUGHE e INSALATE* (pieno campo)	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Phytonemus pallidus</i>)			Intervenire alla comparsa delle prime forme mobili. Ogni 7gg.	1-3		
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza spp.</i>)			Intervenire alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Ogni 7gg.			
MAIS	Ragnetti rossi (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>)	100	0,3-0,4	Intervenire alla comparsa delle prime forme mobili fino alla 6° foglia distesa.	1	-	

* escluse crescione ed altri germogli e gemme, barbabarea, rucola, senape juncea.





INDICE


NEMATODICIDI E COAUDIVANTI


Nemadate®

116

Pottok®

118





Nemadate®

Nematocida liquido solubile in acqua.

Composizione:
Oxamyl 9,62% (100 g/l)

Gruppo IRAC:
1A

Formulazione: Liquido Solubile (SL)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 16088 del 24/12/2015

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Nemadate® esplica un'azione sistemica ed efficace contro nematodi galligeni *Meloidogyne spp.* e *Ditylenchus spp.*
- ✓ Utile nel contenimento di altri insetti quali aleurodidi, *Lyriomiza* e *Tuta absoluta*.

VANTAGGI:

1. Nemadate® è rispettoso dell'ambiente in quanto non percola nelle acque di falda e non si accumula nel terreno, grazie al fatto che si decompone completamente in anidride carbonica e acqua.
2. Ha un intervallo di sicurezza ridotto.
3. Non è dannoso per i nematodi entomopatogeni.
4. La sua sostanza attiva incentiva il vigore vegetativo.



Tanica: 5 L

Cartone: 2x5 L

Pallet: 680 L



Tanica: 10 L

Pallet: 500 L

© Marchio registrato.




Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	FITOFAGO	DOSE (l/ha)	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
POMODORO (serra)	Nematodi Galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp. e <i>Ditylenchus</i> spp.)	10	3 ogni 20 gg	21
PEPERONE (serra)				
MELANZANA (serra)				
CETRIOLO (serra)				
CETRIOLINO (serra)				
ZUCCHINO (serra)				

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Il prodotto va disciolto nell'acqua di irrigazione e deve essere distribuito al terreno mediante gli impianti di irrigazione a goccia.
- ✓ In talune condizioni la diluizione e la distribuzione del prodotto in acqua irrigua acidificata ad un valore di pH di circa 5,5 ne migliorano l'assorbimento e la disponibilità per l'apparato radicale.
- ✓ Esplica il proprio massimo potenziale con un uso preventivo e associato ad altre pratiche agronomiche di contenimento dei nematodi (come per esempio la solarizzazione).
- ✓ Non impiantare colture in successione prima che siano passati 120 gg.





Pottok®

Coadiuvante per l'applicazione di erbicidi.

Composizione:

Alcool grasso alcossilato 99,8 %

Formulazione: Liquido solubile (SL)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione: n° 16131 del 15/09/2016



Flacone: 0,4 L

Cartone: 12x0,4 L

Pallet: 408 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Pottok® è un coadiuvante specificamente indicato per l'impiego in associazione con erbicidi solfonilureici.
- ✓ Sviluppato e testato insieme all'erbicida Plaza®, ne potenzia l'effetto mantenendo una piena selettività.

VANTAGGI:

1. Pottok® incrementa l'adesività del prodotto e l'assorbimento del prodotto all'interno delle infestanti, incrementandone l'efficacia erbicida.

© Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	METODI APPLICATIVI	DOSE (l/ha)
MAIS	Come coadjuvante di PLAZA	0,2
PATATA		0,2
POMODORO		0,2

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Non esporre a temperature inferiori a -10°C e superiori a 40°C.






INDICE

BIO

SOLUZIONI

NEW	Carpet	122
NEW	Equiset	124
NEW	Prevatect	126
NEW	Valesco	128





Carpet

Sostanza di base per il controllo di oidio, ticchiolatura e muffe.

Composizione:

Idrogenocarbonato di sodio 990 g/Kg (pH: 8)

Formulazione: Polvere solubile (SP)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Carpet è un prodotto a base di Idrogenocarbonato di sodio, utile per il controllo di oidio, ticchiolatura e muffe.
- ✓ Attraverso una variazione del pH e dell'equilibrio osmotico, l'idrogenocarbonato di sodio dissecca le ife e le spore del patogeno e inibisce la loro germinazione e l'allungamento del tubulo germinativo.
- ✓ La sostanza di base "Idrogenocarbonato di sodio" è stata approvata tramite Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- ✓ Carpet non è un prodotto fitosanitario.

VANTAGGI:

1. Ideale in strategia e/o in miscela ad altri prodotti fungicidi.
2. Impiego autorizzato in Agricoltura Biologica ed Integrata.
3. Esentato da Limiti Massimi dei Residui (presente in Allegato IV del Reg. (CE) 396/2005).



Sacco: 5 kg

Cartone: 4x5 kg

Pallet: 1.000 kg



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
ORTICOLE BACCHE ED ORNAMENTALI (campo e serra)	Peronospora (<i>Sphaerotheca spp</i>) Oidio (<i>Oidium spp</i>)	2- 5 kg/ha (333- 1000 g/hL)	BBCH 12 - 89.	1 - 8 applicazioni fogliari distanziate di 10 giorni.	1
VITE	Oidio della vite (<i>Uncinula necator</i>)	2,5- 5 kg/ha (420- 2000 g/hL), concentrazione non superiore al 2%	Dalla seconda foglia distesa fino a maturazione grappolo. BBCH 12 - 89.	Polverizzazione / aspersione: 1-8 applicazioni distanziate di 8 giorni.	
MELO	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>)	2,5- 5 kg/ha (500-1000 g/hL), concentrazione non superiore al 2%	Da orecchiette di topo alla pre raccolta. BBCH 10 - 85.	Polverizzazione / aspersione: 1-8 applicazioni distanziate di 8 giorni.	
ARANCIO, CILIEGIO, MELO, PAPAYA	Muffa azzurra (<i>Penicillium italicum</i>) e muffa verde (<i>Penicillium digitatum</i>)	1-4 kg in 100L acqua	Sul raccolto.	Trattamento per immersione o superficiale. 1 o 2 applicazioni distanziate di 10 giorni.	
PIANTE IN VASO (serra)	Epatica / Briofita (<i>tallo Lunularia cruciata</i>) Tallo verde di epatiche più corpi fruttiferi	122 kg/ha in post-emergenza * (fitotossicità non testata)	Post-emergenza fine estate o inverno.	Applicazione diretta in polvere.	-



Equiset

Sostanza di base per il controllo di oidio, peronospora e altre malattie fungine.

Composizione:

Equisetum arvense L. 0,2 % p/p (pH: 6.8)

Formulazione: Concentrato Dispersione (DC)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Equiset®**, a base di estratto di equiseto grazie al suo "elicitor effect" stimola la difesa naturale delle piante ed interviene nel controllo di diverse malattie fungine, quali Oidio, Peronospora, Venturia, Alternaria, Septoria, Bolla del pesco, Botrite ed altre.
- ✓ La sostanza di base "Equisetum arvense" è stata approvata tramite Regolamento di esecuzione (UE) 462/2014 della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- ✓ **Equiset®** non è un prodotto fitosanitario.

VANTAGGI:

1. Ampio spettro d'azione su diverse malattie fungine che colpiscono varie colture di interesse.
2. Rappresenta un partner efficace all'interno di programmi di controllo biologico e di difesa integrata.
3. Esentato da Limiti Massimi dei Residui (presente in Allegato IV del Reg. (CE) 396/2005).



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 480 L



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 680 L


© Marchio registrato.



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
MELO E PESCO	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>)	200 ml/hl	Dai primi stadi di infiorescenza (BBCH 53) alla caduta dei fiori (BBCH 67).	2-6 applicazioni fogliari, distanziate di 7 giorni.	0
	Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)				
	Bolla (<i>Taphrina deformans</i>)				
VITE	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 ml/hl	Dal primo sviluppo fogliare (BBCH 10) alla fine dell'emergenza delle infiorescenze (BBCH 57).	2-6 applicazioni fogliari, distanziate di 7 giorni.	0
	Oidio (<i>Erysiphe necator</i>)				
CETRIOLO (serra)	Oidio (<i>Podosphaera xanthii</i>)	200 ml/hl	Da stadio di sviluppo fogliare a 9 foglie (BBCH 19) fino all'emersione dell'infiorescenza (BBCH 49).	2 applicazioni fogliari o dirette al suolo, distanziate di 3-4 giorni.	15
	Funghi del suolo (<i>Pythium spp.</i>)				
POMODORO (serra)	Marciume precoce (<i>Alternaria solani</i>)	200 ml/hl	Dalle prime infiorescenze visibili (BBCH 51) a 9 o più infiorescenze visibili (BBCH 59).	2 applicazioni fogliari, distanziate di 14 giorni.	15
	Septoria (<i>Septoria lycopersici</i>)				
	Marciume nero (<i>Alternaria solani</i>)				
	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)				





Prevatect

Sostanza di base, elicitore con stimolazione dei meccanismi di difesa naturali delle piante.

Composizione:

Chitosano Cloridrato 5.0 % p/p (pH: 2.5 (1%))

Formulazione: Concentrato Solubile (SL)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Prevatect** è un prodotto a base di Chitosano cloridrato, ottenuto dalla chitina contenuta nell'esoscheletro di crostacei e molluschi.
- ✓ **Prevatect** è un elicitore con effetto fungicida e battericida grazie alla stimolazione dei meccanismi di difesa naturali della pianta.
- ✓ Il Chitosano cloridrato è naturale, biodegradabile e ammesso in agricoltura biologica ed integrata.
- ✓ La sostanza di base "Chitosano cloridrato" è stata approvata tramite Regolamento di esecuzione (UE) 563/2014 della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- ✓ **Prevatect** non è un prodotto fitosanitario.

VANTAGGI:

1. Applicato preventivamente, attiva i meccanismi di difesa della pianta prima che batteri e funghi patogeni possano infettarla, senza il rischio che si sviluppino resistenze.
2. Esentato da Limiti Massimi dei Residui (presente in Allegato IV del Reg. (CE) 396/2005).



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 480 L



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 640 L

® Marchio registrato.



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
BACCHE E PICCOLI FRUTTI		2 - 16 l/ha	Dall'inizio del germogliamento fino allo sviluppo dei frutti.	4 - 8 applicazioni con un intervallo tra le applicazioni di 14 giorni.	0
ORTICOLE		2 - 8 l/ha			
CEREALI					
SPEZIE					
FORAGGERE					
CEREALI (trattamento delle sementi)	Batteri e funghi patogeni	1 - 2 l/hl	Prima della semina.	1 applicazione.	
PATATE (trattamento delle sementi)					
BARBABIETOLA (trattamento delle sementi)					





Valesco

Sostanza di base per il controllo di insetti, acari e funghi.

Composizione: (Urtica spp.) 15 g/L, pH: 10

Formulazione: Concentrato Dispersione (DC)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Valesco**, a base di estratto acquoso di ortica, grazie alla sua triplice azione insetticida, acaricida e fungicida, rappresenta una soluzione ottimale nel controllo di diversi fitofagi e avversità comuni su numerose colture di interesse.
- ✓ La sostanza di base "*Urtica spp.*" è stata approvata tramite Regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- ✓ **Valesco** non è un prodotto fitosanitario.

VANTAGGI:

1. Rappresenta un partner efficace all'interno di programmi di controllo biologico e di difesa integrata.
2. Applicato nell'ambito delle diverse strategie permette di amplificare e migliorare la performance prodotti fitosanitari utilizzati in campo, agendo direttamente sul patogeno e indirettamente stimolando le difese naturali della pianta.
3. Esentato da Limiti Massimi dei Residui (presente in Allegato IV del Reg. (CE) 396/2005).



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 480 L



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 640 L



COLTURA	AVVERSITA'	DOSE	EPOCA D'IMPIEGO	N°TRATTAMENTI	PHI (gg)	
CONTROLLO DI INSETTI						
ALBERI DA FRUTTO: MELO, PRUGNO, PESCO, RIBES, NOCE, CILIEGIO	Afide verde (<i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum rosae</i>), Afide del melo (<i>Eriosoma Lanigerum</i>), Afide del ribes (<i>Cryptomyzus ribis</i>), Afide del noce (<i>Callaphis juglandis</i>), Afide nero del ciliegio (<i>Myzus cerasi</i>)	1500 g/hL	Dalla primavera fino a BBCH 87 (frutti maturi).	1-5 applicazioni distanziate di 7-15 giorni.	7	
FAGIOLO	Afide del fagiolo nero (<i>Aphis fabae</i>)		Dalla primavera fino a BBCH 89 (a maturazione completa).			
PATATA	Afide verde (<i>Myzus persicae</i>)		Dalla primavera fino a BBCH 49 (completa formazione tuberi).			0
VEGETALI A FOGLIA: LATTUGA, CAVOLO	Afidi, ad esempio: Afide del cavolo (<i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Nasonovia ribisnigri</i>)		Applicazione dalla primavera-estate fino a BBCH19 (9 o più foglie vere).			
SAMBUCO	Afide del sambuco (<i>Aphis sambuci</i>)		Primavera-estate.			
ROSA (ROSA SP.)	Afide della rosa: <i>Macrosiphum rosae</i>		Primavera-estate.	7		
SPIRAEA SP.	<i>Aphis spiraeophaga</i>					
BRASSICACEE (CAVOLO, COLZA, RAVANELLO)	Scarafaggio (<i>Phyllotreta nemorum</i>)		Applicazione dalla primavera- estate fino a BBCH 19 (9 o più foglie vere.		1-6 applicazioni distanziate di 7-15 giorni	
	Falena del cavolo (<i>Plutella xylostella</i>)		Applicazione dalla primavera- estate fino a BBCH 49.			
MELO, PERO	Carpocapsa del melo (<i>Cydia pomonella</i>)		2 trattamenti ad aprile e 1 trattamento a maggio.		3 applicazioni ogni 15 giorni	
CONTROLLO DI ACARI						
FAGLIOLI	Acaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1500 g/hL	Applicazione dalla primavera-estate fino a BBCH 89 (completamente maturo).	1-6 applicazioni (normalmente 3) ogni 7-21 giorni, normalmente 2-3 settimane.	7	
VITE	Acaro (<i>Tetranychus urticae</i>) Acaro (<i>Tetranychus telarius</i>)		Applicazione dalla primavera-estate fino a BBCH 89. (maturazione grappoli)	1-6 applicazioni (3 prima della fioritura e 3 dopo la fioritura) ogni 7-21 giorni, normalmente 2-3 settimane.		
CONTROLLO DI FUNGHI						
BRASSICACEAE (famiglia del senape Brassica sp., Sinapis sp., Ravanello)	<i>Alternaria</i> sp.	1500 g/hL	Applicazione dalla primavera- estate fino a BBCH 49.	1-6 applicazioni ogni 7-15 giorni.	7	
CETRIOLO	Oidio (<i>Erysiphe polygoni</i>), <i>Alternaria alternata</i> f. <i>sp.cucurbitae</i>		Fino a BBCH 89			
ALBERI DA FRUTTO: MELO, PRUGNO, PESCO, RIBES, NOCE, CILIEGIO	Macchie nelle foglie (<i>Alternaria alternata</i>), Marciume del castagno/ marciume florale (<i>Monilinia laxa</i> , <i>Botrytis Cinerea</i>) Muffa nera (<i>Rhizopus stolonifer</i>)		Dalla primavera fino a BBCH 87 (frutti maturi).			
VITE	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)		Applicazione dalla primavera- estate fino a BBCH 89. (maturazione grappoli)			
PATATA	Peronospora della patata (<i>Phytophthora infestans</i>)		Dalla primavera fino a BBCH 49 (completa formazione tuberi).			



INFO UTILI

Miscibilità e compatibilità	132
Indice per coltura	134
Indice per principio attivo	142
Regolamento CLP e indicazioni di pericolo	158
Centri Antiveleni	164



Miscibilità e compatibilità

La miscelazione di agrofarmaci con differenti formulazioni è una pratica usuale e normalmente realizzata. In questi casi è comunque opportuno riferirsi alle apposite indicazioni riportate sulle etichette dei singoli prodotti. Tuttavia in mancanza di specifiche indicazioni è utile generalmente aggiungere i prodotti all'interno delle attrezzature per i trattamenti secondo una sequenza specifica.

I primi formulati da aggiungere sono i bagnanti e adesivanti, seguiti dai prodotti in microgranuli idrodispersibili (WGD/WG/DF/Estrusi), dalle polveri bagnabili (WP), le sospensioni concentrate (SC), i prodotti microincapsulati (CS o MCPS), le emulsioni acquose (EW), le dispersioni oleose (OD), i liquidi emulsionabili (EC) e i liquidi solubili (LS). In caso di utilizzo di formulazioni a base di Fosetyl Alluminio si consiglia di aggiungere i prodotti alla miscela solo al termine della preparazione, onde evitare problematiche di precipitazione. In genere l'utilizzo di dispersioni oleose non rende necessario l'impiego di bagnanti e adesivanti in quanto sono già presenti all'interno del formulato.

Nel caso di impiego di attrezzature tradizionali si consiglia di riempire parzialmente di acqua il serbatoio, aggiungere i formulati secondo le indicazioni consigliate, mantenendo sempre l'agitatore in funzione e successivamente portare a volume. L'utilizzo di premiscelatori facilita la solubilizzazione dei prodotti.


Dosi di formulato e volumi di irrorazione

L'acqua è un veicolo per solubilizzare e trasferire i prodotti alla opportuna concentrazione sulla vegetazione da trattare. I volumi di acqua sono in genere tarati in funzione della superficie da trattare e oggi, in virtù delle nuove normative europee, stabiliti anche nelle etichette dei singoli prodotti.

Nelle nuove etichette in commercio oggi sono presenti sia le dosi di formulato per ettaro che per ettolitro di acqua. Si consiglia sempre di riferirsi alle dosi per ettaro in particolare in caso di utilizzo di attrezzature a basso e ultrabasso volume, che consentono di ridurre i quantitativi di acqua impiegabili ma non i quantitativi di formulato in quanto questi devono essere sempre parametrati alla superficie da trattare.

In caso di etichette non ancora aggiornate si consiglia di riferirsi sempre al quantitativo di prodotto corrispondente a 10 hl di acqua per ettaro in caso di applicazioni su colture erbacee e Vite con forme di allevamento ridotto (Cordone speronato, Gnjot, Alberello, ecc.), e 15 hl di acqua per ettaro in caso di fruttiferi e vite con forme di allevamento espanso (Tendone, Pergoletta Romagnola, ecc.).

Nel caso di applicazione di insetticidi e di fungicidi di copertura sarebbe comunque opportuno non scendere mai al di sotto di un volume intermedio di acqua per consentire nel primo caso di penetrare opportunamente la vegetazione trattata e nel secondo di coprire omogeneamente le vegetazioni anche più compatte.



INDICE PER COLTURA

ERBACEE

CEREALI

AVENA

Atlas

CEREALI

Azox 25 SC

Deltasap

Prevatec

CEREALI TRATTAMENTO DALLE SEMENTI

Prevatec

FRUMENTO

Azox 25 SC

FRUMENTO DURO

Atlas

Joystick

Mohican 500 SC

Taisen 800 EC

FRUMENTO TENERO

Atlas

Joystick

Mohican 500 SC

Taisen 800 EC

MAIS

Atlas

Atlas

Bentador

Callicore

Deltasap

Drone

Extensor OD

Nicozea OD

Nirvana

Pendi 40

Plaza

Pottok

Sudoku

Vasco

ORZO

Atlas

Azox 25 SC

Joystick

Mohican 500 SC

Taisen 800 EC

RISO

Azox 25 SC

SEGALE

Joystick

Mohican 500 SC

TRITICALE

Joystick

Mohican 500 SC

FORAGGERE

ERBA MEDICA

High Top

FORAGGERE

Prevatec

TRIFOGLIO

High Top

INDUSTRIALI

ARACHIDE

Pendi 40

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

High Top

Shardif 50 EC

COLZA

High Top

Valesco

COTONE

High Top

GIRASOLE

Hereu

Hereu SC

High Top

Pendi 40

LINO

High Top

SOIA

Pendi 40

High Top

TABACCO

Douro 10 WG

Douro 100 EC

Drum

High Top

Kubik MCZ

Pendi 40

Vitipecc MZ

EXTRA AGRICOLO

AREE NON COLTIVATE

Matsuda 25 WG

AREE INCOLTE E
SEDI FERROVIARIE

Hereu SC

FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI

FLOREALI

COLTURE FLOREALI

Tribasic Flow New

ROSA

Valesco

FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI

COLTURE FLOREALI E
ORNAMENTALI

Douro 10 WG

Douro 100 EC

Stiker Flow

FLOREALI E
ORNAMENTALI

Atlas

ROSA

Drum

PIANTE IN VASO

Carpet

PIANTE ORNAMENTALI
ANCHE IN VIVAIO

Pendi 40

PIOPPA

Pendi 40

VIVAI

High Top

VIVAI FORESTALI ED
ORNAMENTALI

Hereu

Hereu SC

FORESTALI

FORESTALI

High Top

CIPRESSO

Tribasic Flow New

FLOREALI

GAROFANO

Shardif 50 EC

ROSA

Drum

Shardif 50 EC

ORNAMENTALI

ORNAMENTALI

Deltasap

High Top

SPIRAEA

Valesco

FRUTTICOLE

AGRUMI

AGRUMI

Expedient 10 EC

Medeiro 80 WG Advance

Mohican 500 SC

Ossiram 70 Flow

Tribasic Flow New

ARANCIO

Carpet

Expedient 10 EC

Hereu

Hereu SC

Matsuda 25 WG

Medeiro 80 WG Advance

Mohican 500 SC

Ossiram 70 Flow

Stiker Flow

Tribasic Flow New

Vasco

ARANCIO AMARO

Medeiro 80 WG Advance

Stiker Flow

BERGAMOTTO

Matsuda 25 WG

Medeiro 80 WG Advance

Mohican 500 SC

Ossiram 70 Flow

CEDRO

Matsuda 25 WG

Medeiro 80 WG Advance

Mohican 500 SC


CHINOTTO

Expedient 10 EC

Matsuda 25 WG

Medeiro 80 WG Advance

Mohican 500 SC



INDICE PER COLTURA

Ossiram 70 Flow
Stiker Flow

CLEMENTINO

Expedient 10 EC
Matsuda 25 WG
Medeiro 80 WG Advance
Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow
Stiker Flow
Tribasic Flow New
Vasco

LIMETTA

Medeiro 80 WG Advance
Stiker Flow

LIMONE

Expedient 10 EC
Hereu
Hereu SC
Matsuda 25 WG
Medeiro 80 WG Advance
Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow
Stiker Flow
Tribasic Flow New
Vasco

MANDARINO

Expedient 10 EC
Matsuda 25 WG
Medeiro 80 WG Advance
Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow
Stiker Flow
Tribasic Flow New
Vasco

MAPO

Expedient 10 EC
Matsuda 25 WG
Medeiro 80 WG Advance
Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow

MINEOLA

Stiker Flow

POMELO

Medeiro 80 WG Advance
Stiker Flow

POMPELMO

Hereu
Hereu SC
Medeiro 80 WG Advance
Stiker Flow

TANGELO

Medeiro 80 WG Advance
Stiker Flow

TANGERINO

Medeiro 80 WG Advance
Stiker Flow

UGLI

Stiker Flow

ALTRE

PAPAYA

Carpet
Tribasic Flow New

DRUPACEE

ALBICOCCO

Atlas

Cardinal 50 WG
Deltasap
Expedient 10 EC
Hereu
Hereu SC
Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow
Pendi 40
Tribasic Flow New

CILIEGIO

Cardinal 50 WG
Carpet
Deltasap
Expedient 10 EC
Hereu
Hereu SC
Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow
Tribasic Flow New
Valesco

DRUPACEE

Cardinal 50 WG
Hereu
Hereu SC
Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow

NETTARINE

Atlas
Cardinal 50 WG
Douro 10 WG
Expedient 10 EC
Hereu
Hereu SC
Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow
Pendi 40

PESCO

Atlas
Deltasap
Douro 10 WG
Douro 100 EC
Equiset
Expedient 10 EC
Hereu
Hereu SC
High Top
Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow
Pendi 40
Shardif 50 EC
Tribasic Flow New
Valesco
Vasco

PRUGNO

Valesco

SUSINO

Deltasap
Expedient 10 EC
Hereu
Hereu SC
Mohican 500 SC
Tribasic Flow New

FRUTTA A GUSCIO

CASTAGNO

Tribasic Flow New

MANDORLO

Cardinal 50 WG
Hereu SC
Mohican 500 SC

Tribasic Flow New

NOCCIOLO

Atlas
Deltasap
Hereu SC
Tribasic Flow New

NOCE

Valesco
Tribasic Flow New

OLIVO

OLIVO DA OLIO

Deltasap
Hereu SC
Kresostar
Matsuda 25 WG
Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow
Tribasic Flow New
Vegas 50 WG

OLIVO DA TAVOLA

Deltasap
Hereu SC
Kresostar
Matsuda 25 WG
Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow
Tribasic Flow New
Vegas 50 WG

PICCOLI FRUTTI E BACCHE

BACCHE

Prevatec

Carpet

LAMPONE

Equiset
High Top

MIRTILLO

High Top

PICCOLI FRUTTI

Tribasic Flow New

RIBES

High Top
Valesco

SAMBUCO

Valesco


POMACEE

COTOGNO

Stiker Flow
Tribasic Flow New

MELO

Atlas
Cardinal 50 WG
Carpet
Deltasap
Douro 10 WG
Douro 100 EC
Equiset
Expedient 10 EC
Hereu
Hereu SC
High Top
Kresostar
Medeiro 80 WG Advance



INDICE PER COLTURA

Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow
Pendi 40
Shardif 50 EC
Stiker Flow
Tribasic Flow New
Valesco
Valesco
Vasco
Vegas 50 WG

NASHI

Stiker Flow

NESPOLO

Tribasic Flow New

PERO

Atlas
Cardinal 50 WG
Deltasap
Douro 10 WG
Douro 100 EC
Expedient 10 EC
Hereu
Hereu SC
High Top
Kresostar
Medeiro 80 WG Advance
Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow
Pendi 40
Shardif 50 EC
Stiker Flow
Tribasic Flow New
Valesco
Vasco
Vegas 50 WG

POMACEE

Cardinal 50 WG
Hereu
Hereu SC
Kresostar
Medeiro 80 WG Advance
Ossiram 70 Flow

VITE

VITE DA TAVOLA

Actlet C
Actlet C
Actlet EVO
Actlet F
Almada 50 SC
Almada F
Almada Hydro
Almada MZ
Atlas
Azupec 80 WG
Back 100 SC
Cardinal 50 WG
Carpet
Deltasap
Douro 10 WG
Douro 100 EC
Equiset
Hereu
Hereu SC
Kubik MCZ
Matsuda 25 WG
Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow
Pendi 40
Stiker Flow
Tokra
Tribasic Flow New
Valesco
Vasco
Vegas 50 WG

Vitipec MZ
Vitipec R WDG

VITE DA VINO

Actlet C
Actlet EVO
Actlet F
Almada 50 SC
Almada F
Almada Hydro
Almada MZ
Almada Trio
Atlas
Azupec 80 WG
Back 100 SC
Cardinal 50 WG
Carpet
Deltasap
Douro 10 WG
Douro 100 EC
Equiset
Folpec 50 SC
Folpec 80 WG Advance
Hereu
Hereu SC
Kubik MCZ
Matsuda 25 WG
Medeiro 80 WG Advance
Mohican 500 SC
Ossiram 70 Flow
Pendi 40
Spyrit Gold
Stiker Flow
Tokra
Tribasic Flow New
Valesco
Vasco
Vegas 50 WG
Vitipec MZ
Vitipec R WDG

ORTICOLE

ALTRE

BARBABIETOLA - TRATTAMENTO DALLE SEMENTI

Prevatec

FRAGOLA

High Top

Tribasic Flow New

Vasco

BRASSICACEE

CAVOLFIORE

Atlas

Deltasap

Pendi 40

Shardif 50 EC

Tribasic Flow New

CAVOLI A TESTA

Deltasap

CAVOLI AD INFIORESCENZA

Tribasic Flow New

CAVOLO

Valesco

CAVOLO BROCCOLO

Atlas

Deltasap

Tribasic Flow New

CUCURBITACEE

CETRIOLINO

Azox 25 SC

Nemadate

Tribasic Flow New

Vasco

CETRIOLO

Azox 25 SC

Douro 10 WG

Douro 100 EC

Douro 100 EC

Drum

Equiset

Nemadate

Shardif 50 EC

Tribasic Flow New

Vasco

COCOMERO

Azox 25 SC

Tribasic Flow New

Vasco

CUCURBITACEE

Azox 25 SC

Tribasic Flow New

CUCURBITACEE A BUCCIA COMMESTIBILE

Tribasic Flow New

MELONE

Azox 25 SC

Douro 10 WG

Douro 100 EC

Drum

Tribasic Flow New

Vasco

ZUCCA

Azox 25 SC

Douro 10 WG

Douro 100 EC

Tribasic Flow New

Vasco

ZUCCHINO

Atlas

Azox 25 SC

Deltasap

Douro 10 WG

Douro 100 EC

Drum

Nemadate

Tribasic Flow New

Vasco

ERBE AROMA- TICHE ED ERBE FRESCHE

ERBE AROMATICHE

High Top

ERBE FRESCHE

Almada 50 SC

LEGUMINOSE

CECE

High Top

Pendi 40

FAGIOLI

High Top

Pendi 40

INDICE PER COLTURA

FAGIOLINI

Tribasic Flow New
Pendi 40

FAGIOLO

Tribasic Flow New
Valesco

FAVA

Pendi 40

FAVINO

Pendi 40

LENTICCHIE

High Top
Tribasic Flow New

PISELLO

Drum
High Top
Pendi 40
Tribasic Flow New

PISELLO MANGIATUTTO

Tribasic Flow New

ORTAGGI A BULBO

AGLIO

Tribasic Flow New
CIPOLLA
Tribasic Flow New

ORTAGGI A BULBO

Tribasic Flow New

ORTAGGI A STELO

ASPARAGO

Tribasic Flow New

CARCIOFO

Tribasic Flow New

ORTICOLE

ORTICOLE

Carpet
Prevatec

ORTICOLE A BULBO

AGLIO

Drum
Tribasic Flow New

CIPOLLA

Drum
Tribasic Flow New

PORRO

Drum

ORTICOLE A FOGLIA

CICORIA

Almada 50 SC

CRESCIONE

Almada 50 SC

DENTE DI LEONE

Almada 50 SC

INDIVIA

Almada 50 SC

INSALATE BABY LEAF

Almada 50 SC

LATTUGA

Almada 50 SC
Drum
High Top
Valesco

LATTUGA E ALTRE INSALATE

Almada 50 SC
Almada MZ
Atlas
Coimbra
Deltasap
Vasco

LATTUGA E SIMILI

Pendi 40

RADICCHIO

Almada 50 SC
High Top

SCAROLA

Almada 50 SC
High Top

SPINACIO

Drum
High Top

VALERIANELLA

Almada 50 SC

ORTICOLE A RADICE E TUBERO

CAROTA

Pendi 40

Shardif 50 EC

PATATA

Actlet C

Almada 50 SC

Almada MZ

Atlas

Atlas

Back 100 SC

Coimbra

Deltasap

Drum

Equiset

High Top

Ossiram 70 Flow

Pendi 40

Plaza

Pottok

Shardif 50 EC

Tribasic Flow New

Valesco

Vitipec MZ

PATATA - TRATTAMENTO DALLE SEMENTI

Prevatec

RAVANELLO

Valesco

ORTICOLE A STELO

ASPARAGO

Pendi 40

Shardif 50 EC

CARCIOFO

Hereu

Hereu SC

SEDANO

Shardif 50 EC

SOLANACEE

MELANZANA

Actlet C

High Top

Nemadate

Tribasic Flow New

Vasco

PEPERONE

Douro 10 WG

Douro 100 EC

Nemadate

Pendi 40

POMODORO

Actlet C

Almada F

Atlas

Azox 25 SC

Azupec 80 WG

Back 100 SC

Deltasap

Douro 10 WG

Douro 100 EC

Drum

Equiset

Expedient 10 EC

Folpec 50 SC

Folpec 80 WG Advence

High Top

Kubik MCZ

Nemadate

Ossiram 70 Flow

Plaza

Pottok

Shardif 50 EC

Toreador

Tribasic Flow New

Vasco

Vitipec MZ

SPEZIE

SPEZIE

SPEZIE

Prevatec

INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA
Insetticidi e Acaricidi	Vasco	Arancio
		Cetriolino
		Cetriolo
		Clementino
		Cocomero
		Fragola
		Lattuga e altre insalate
		Limone
		Mais
		Mandarino
		Melanzana
		Melo
		Melone
		Pero
		Pesco
		Pomodoro
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Zucca
		Zucchini
Nematocidi e Coadiuvanti	Pottok	Mais
		Patata
		Pomodoro
Fungicidi	Azox 25 SC	Cereali
		Cetriolino
		Cetriolo
		Cocomero
		Cucurbitacee
		Frumento
		Melone
		Orzo
		Pomodoro
		Riso
		Zucca

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA
 Azoxystrobin	Azox 25 SC	Zucchini
 Azoxystrobin + Dimetomorf + Folpet	Spyrit Gold	Vite da vino
 Bentazone	Bentador	Mais
 Ciazofamid	Back 100 SC	Patata Pomodoro Vite da tavola Vite da vino
 Cimoxail	Drum	Aglione Cetriolo Cipolla Lattuga Melone Patata Pisello Pomodoro Porro Rosa Spinacio Tabacco Zucchini
 Cimoxail	Vitipec MZ	Patata Pomodoro Tabacco Vite da tavola Vite da vino
 Cimoxanil + Ossicloruro di rame	Vitipec R WDG	Vite da tavola Vite da vino
 Cloridrato chitosano	Prevatec	Bacche Barbabietola - trattamento dalle sementi Cereali Cereali - trattamento dalle sementi Foraggiere Orticole Patata - trattamento dalle sementi

INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO

Fungicidi

Erbicidi

Insetticidi e
Acaricidi

Nematocidi e
Coadiuvanti

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA
Cloridrato chitosano	Prevatec	Spezie
Cyprodinil	Cardinal 50 WG	Albicocco
		Ciliegio
		Drupacee
		Mandorlo
		Melo
		Nettarine
		Pero
		Pomacee
		Vite da tavola
		Vite da vino
Deltametrina	Deltasap	Albicocco
		Cavolfiore
		Cavoli a testa
		Cavolo broccolo
		Cereali
		Ciliegio
		Lattuga e altre insalate
		Mais
		Melo
		Nocciolo
		Olivo da olio
		Olivo da tavola
		Ornamentali
		Patata
		Pero
		Pesco
		Pomodoro
		Susino
		Vite da tavola
		Vite da vino
Dicamba	Drone	Mais
Dicamba + Nicosulfuron + Rimsulfuron	Nirvana	Mais

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA
Difenoconazolo	Shardif 50 EC	Asparago
		Barbabietola da zucchero
		Carota
		Cavolfiore
		Cetriolo
		Garofano
		Melo
		Patata
		Pero
		Pesco
		Pomodoro
		Rosa
		Sedano
Difenoconazolo + Kresoxym	Kresostar	Melo
		Olivo da olio
		Olivo da tavola
		Pero
		Pomacee
Diflufenican	Mohican 500 SC	Agrumi
		Albicocco
		Arancio
		Bergamotto
		Cedro
		Chinotto
		Ciliegio
		Clementino
		Drupacee
		Frumento duro
		Frumento tenero
		Limone
		Mandarino
		Mandorlo
		Mapo
		Melo

INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO



Fungicidi



Erbicidi



Insetticidi e
Acaricidi



Nematocidi e
Coadiuvanti

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA
 Diflufenican	Mohican 500 SC	Nettarine Olivo da olio Olivo da tavola Orzo Pero Pesco Segale Susino Triticale Vite da tavola Vite da vino
		Frumento duro Frumento tenero Orzo Segale Triticale
 Dimetomorf	Almada 50 SC	Cicoria Crescione Dente di leone Erbe fresche Indivia Insalate Baby leaf Lattuga Lattuga e altre insalate Patata Radicchio Scarola Valerianella Vite da tavola Vite da vino
		Pomodoro Vite da tavola Vite da vino
		Vite da vino
 Dimetomorf + Folpet	Almada F	
 Dimetomorf + Folpet + Fosetil alluminio	Almada Trio	Vite da vino

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA	
	Dimetomorf + Mancozeb	Almada MZ	Lattuga e altre insalate
			Patata
			Vite da tavola
			Vite da vino
	Dimetomorf + Propamocarb	Coimbra	Lattuga e altre insalate
			Patata
	Dimetomorf + Rame idrossido	Almada Hydro	Vite da tavola
			Vite da vino
	Equisetum arvense	Equiset	Cetriolo
			Melo
			Pesco
			Pomodoro
			Vite da tavola
			Vite da vino
	Exitiazon	Stiker Flow	Arancio
			Arancio amaro
			Chinotto
			Clementino
			Colture floreali e ornamentali
			Cotogno
			Limetta
			Limone
			Mandarino
			Melo
			Mineola
			Nashi
			Pero
			Pomelo
			Pompelmo
			Tangelo
			Tangerino
			Ugli
			Vite da tavola
			Vite da vino

INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO



Fungicidi



Erbicidi



Insetticidi e
Acaricidi



Nematocidi e
Coadiuvanti

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA	
	Flazasulfuron	Matsuda 25 WG	Arancio
			Aree non coltivate
			Bergamotto
			Cedro
			Chinotto
			Clementino
			Limone
			Mandarino
			Mapo
			Olivo da olio
			Olivo da tavola
			Vite da tavola
			Vite da vino
	Folpet	Folpec 50 SC	Pomodoro
			Vite da vino
		Folpec 80 WG Advence	Pomodoro
			Vite da vino
	Fosetil alluminio	Medeiro 80 WG Advance	Agrumi
			Arancio
			Arancio amaro
			Bergamotto
			Cedro
			Chinotto
			Clementino
			Limetta
			Limone
			Mandarino
			Mapo
			Melo
			Pero
			Pomacee
			Pomelo
			Pompelmo
			Tangelo

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA
Fosetil alluminio	Medeiro 80 WG Advance	Tangerino
		Vite da vino
Idrogenocarbonato di sodio	Carpet	Arancio
		Bacche
		Ciliegio
		Melo
		Piante in vaso
		Orticole
		Papaya
		Vite da tavola
		Vite da vino
Imidacloprid	Toreador	Pomodoro
Kresoxim-metile	Vegas 50 WG	Melo
		Olivo da olio
		Olivo da tavola
		Pero
		Vite da tavola
		Vite da vino
Kresoxym-metile + Penconazolo	Tokra	Vite da tavola
		Vite da vino
Lambda-cialotrina	Atlas	Albicocco
		Avena
		Cavolfiore
		Cavolo Broccolo
		Floreali e Ornamentali
		Frumento duro
		Frumento tenero
		Lattuga e altre insalate
		Mais
		Melo
		Nettarine
		Nocciolo
		Orzo
		Patata

INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO

 Fungicidi  Erbicidi  Insetticidi e Acaricidi  Nematocidi e Coadiuvanti

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA
	Lambda-cialotrina Atlas	Pero
		Pesco
		Pomodoro
		Zucchini
		Vite da tavola
		Vite da vino
	Mesotrione Callicore	Mais
	Metalaxil + Mancozeb Kubik MCZ	Pomodoro
		Tabacco
		Vite da tavola
		Vite da vino
	M-Metalax + Cimoxanil + Folpet Actlet EVO	Vite da tavola
		Vite da vino
	M-Metalax + Folpet Actlet F	Vite da tavola
		Vite da vino
	M-Metalax + Rame Idrossido Actlet C	Melanzana
		Patata
		Pomodoro
		Vite da tavola
		Vite da vino
	Nicosulfuron Nicozea OD	Mais
	Nicosulfuron + Sulcotrione Nicozea OD	Mais
	Ortica Valesco	Cavolo
		Ciliegio
		Colza
		Fagiolo
		Lattuga
		Melo
		Melo
		Noce
		Patata
		Pero
		Pesco
		Prugno

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA	
	Ortica	Valesco	Ravanello
			Ribes
			Rosa
			Sambuco
			Spiraea
			Vite da tavola
			Vite da vino
	Ossicloruro di rame	Ossiram 70 Flow	Agrumi
			Albicocco
			Arancio
			Bergamotto
			Chinotto
			Ciliegio
			Clementino
			Drupacee
			Limone
			Mandarino
			Mapo
			Melo
			Nettarine
			Olivo da olio
			Olivo da tavola
			Patata
			Pero
			Pesco
			Pomacee
			Pomodoro
Vite da tavola			
Vite da vino			
	Oxamil	Nemadate	Cetriolino
			Cetriolo
			Melanzana
			Peperone
			Pomodoro

INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO

Fungicidi


Erbicidi

Insetticidi e
Acaricidi

Nematocidi e
Coadiuvanti

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA
Oxamil	Nemadate	Zucchini
	Hereu	Albicocco Arancio Carciofo Ciliegio Drupacee Girasole Limone Melo Nettare Pero Pesco Pomacee Pompelmo Susino Vite da tavola Vite da vino
Oxyfluorfen	Hereu SC	Vivai Forestali ed ornamentali Albicocco Arancio Aree incolte e sedi ferroviarie Carciofo Ciliegio Drupacee Girasole Limone Mandorlo Melo Nettare Nocciolo Olivo da olio Olivo da tavola Pero Pesco

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA
 Oxyfluorfen	Hereu SC	Pomacee Pompelmo Susino Vite da tavola Vite da vino Vivai Forestali ed ornamentali
	Douro 10 WG	Cetriolo Colture floreali e ornamentali Melo Melone Nettarine Peperone Pero Pesco Pomodoro Tabacco Vite da tavola Vite da vino Zucca Zucchini
 Penconazolo	Douro 100 EC	Cetriolo Colture floreali e ornamentali Melo Melone Peperone Pero Pesco Pomodoro Tabacco Vite da tavola Vite da vino Zucca Zucchini
	Pendi 40	Albicocco



INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO

Fungicidi Erbicidi Insetticidi e Acaricidi Nematocidi e Coadiuvanti	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA
	Pendimethalin	Pendi 40	Arachide Asparago Carota Cavolfiore Cece Fagioli Fagiolini Fava Favino Girasole Lattuga e simili Mais Melo Nettarine Patata Peperone Pero Pesco Piante Ornamentali anche in vivaio Pioppo Pisello Soia Tabacco Vite da tavola Vite da vino
	Prosulfocarb	Taisen 800 EC	Frumento duro Frumento tenero Orzo
	Pyriproxyfen	Expedient 10 EC	Agrumi Albicocco Arancio Chinotto Ciliegio Clementino

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA
Pyriproxyfen	Expedient 10 EC	Limone
		Mandarino
		Mapo
		Melo
		Nettarine
		Pero
		Pesco
		Pomodoro
Quizalofop-p-ethyl	High Top	Susino
		Barbabietola da zucchero
		Cece
		Colza
		Cotone
		Erba medica
		Erbe aromatiche
		Fagioli
		Forestali
		Fragola
		Girasole
		Lampone
		Lattuga
		Lenticchie
		Lino
		Melanzana
		Melo
		Mirtillo
		Ornamentali
		Patata
		Pero
		Pesco
		Pisello
		Pomodoro
		Radicchio
		Ribes

INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO



Fungicidi



Erbicidi



Insetticidi e
Acaricidi



Nematocidi e
Coadiuvanti

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA	
	Quizalofop-p-ethyl	High Top	Scarola
			Soia
			Spinacio
			Tabacco
			Trifoglio
			Vivai
	Rimsulfuron	Plaza	Mais
			Patata
			Pomodoro
	Solfato di Rame tribasico	Tribasic Flow New	Actinidia/Kiwi
			Aglione
			Agrumi
			Albicocco
			Arancio
			Asparago
			Carciofo
			Castagno
			Cavolfiore
			Cavoli ad infiorescenza
			Cavolo broccolo
			Cetriolino
			Cetriolo
			Ciliegie
			Cipolla
			Cipresso
			Clementino
			Cocomero
			Colture floreali
			Cotogno
			Cucurbitacee
			Cucurbitacee a buccia commestibile
			Fagiolino
			Fagiolo
			Fragola

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO	COLTURA
	Solfato di Rame tribasico Tribasic Flow New	Lenticchia
		Limone
		Mandarino
		Mandorlo
		Melanzana
		Melo
		Melone
		Nespolo
		Nocciolo
		Noce
		Olivo da olio
		Olivo da tavola
		Ortaggi a bulbo
		Patata
		Pero
		Pesco
		Piccoli Frutti
		Pisello
		Pisello mangiatutto
		Pomodoro
		Susino
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Zucca
		Zucchini
	Sulcotrione	Sudooku
	Zolfo	Mais
		Pomodoro
		Vite da tavola
	Azupec 80 WG	Vite da vino

Il Regolamento (CE) 1272/2008 - CLP



FEDERCHIMICA

AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci



Sigla: GHS02

Descrizione:
Infiammabile



Sigla: GHS05

Descrizione:
Corrosivo



Sigla: GHS06

Descrizione:
Tossicità acuta



Sigla: GHS07

Descrizione:
Pericolo per la salute



Sigla: GHS08

Descrizione:
Grave pericolo per la salute



Sigla: GHS09

Descrizione:
Pericoloso per l'ambiente

Sigla: Nc

Descrizione:
Non classificato

Le principali novità per il settore degli agrofarmaci

Il CLP è il nuovo regolamento Europeo su classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; è entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009; è rivolto a tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele, inclusi i biocidi e gli agrofarmaci, indipendentemente dal loro quantitativo; sostituisce gradualmente le attuali normative di riferimento per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele, abrogandole completamente a partire dal 1 giugno 2015. Il CLP recepisce nell'Unione Europea quanto previsto dal Sistema Globale Armonizzato GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, voluto dalle Nazioni Unite con lo scopo di armonizzare i criteri di classificazione ed etichettatura, favorendo così la libera circolazione delle merci e garantendo, al contempo, un elevato livello di protezione per l'uomo e l'ambiente.

Il CLP si applica a tutte le sostanze chimiche e le miscele; a queste ultime appartengono anche i biocidi e gli agrofarmaci, nella loro forma commerciale (confezione di vendita).

Novità per gli agrofarmaci

L'applicazione del CLP comporta cambiamenti significativi per la classificazione e l'etichettatura degli agrofarmaci e introduce importanti novità:

Nuovi criteri di classificazione per i pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente;

Avvertenze che indicano il grado relativo del pericolo ('Pericolo' o 'Attenzione');

Nuovi Pittogrammi (simboli riquadrati a forma di diamante o rombo);

Nuova codifica delle indicazioni di pericolo (Frase H) e dei consigli di prudenza (Frase P) che andranno a sostituire rispettivamente le attuali Frasi R e Frasi S;

Introduzione di informazioni supplementari (Frase EUH).

Le schede di sicurezza (SDS)

L'applicazione del CLP non modifica gli obblighi di fornitura della scheda dati di sicurezza (SDS), che rimangono invariati; a partire dal 1 giugno 2015 la SDS viene compilata con i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP; per gli agrofarmaci già immessi sul mercato prima del 1 giugno 2015, è previsto un periodo transitorio di 2 anni (fino al 31 Maggio 2017) in cui il vecchio formato dove compare ancora la classificazione anche secondo la DPD potrà essere comunque utilizzato, a patto che non vi intervengano modifiche registrative che prevedono l'obbligo di etichettatura e reimballaggio o revisioni.

Acquisto di agrofarmaci

L'attuale normativa in materia di acquisto di agrofarmaci (art. 25 del DPR 29072001) prevede che i prodotti classificati molto tossici, tossici o nocivi possano essere venduti per l'impiego diretto, per sé o conto terzi, soltanto a soggetti muniti dell'apposita autorizzazione (patentino).

Considerando che:

non è sempre possibile una conversione diretta tra la classificazione DPD e la nuova classificazione CLP; il patentino è diventato obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali solo a partire dal 26 novembre 2015 (in base a quanto previsto dal D. L. 150/2012, attuazione della direttiva sull'uso sostenibile degli agrofarmaci); la Scheda Dati di Sicurezza fino al 31 maggio 2015 riporterà la doppia classificazione (DPD e CLP); non esiste una specifica previsione normativa;

La posizione di Agrofarma, in attesa di un opportuno e risolutivo chiarimento da parte delle Autorità Competenti, è che fino alla data del 31 maggio 2015 (salvo l'esaurimento delle scorte dei prodotti già immessi sul mercato), in caso di commercializzazione di prodotti con etichetta CLP, si faccia riferimento alla Scheda Dati di Sicurezza (SDS) per la gestione delle attività di vendita/acquisto e stoccaggio.

Impatto su altre normative correlate

Le nuove disposizioni introdotte dal CLP vedono una ricaduta su ulteriori normative correlate che fanno riferimento ai criteri di classificazione ed etichettatura; ed in particolare: Seveso (D. Lgs. 334/199 e s.m.i.), Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), Rifiuti (Allegati D e I alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), Contributo per la sicurezza alimentare (Circolare Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali del 6 febbraio 2001, n. 1), Archivio Preparati Pericolosi (art. 45 CLP e D. Lgs. 65/2003).

Pubblicazione Agrofarma

Al fine di garantire un adeguato supporto alla filiera e rendere disponibile uno strumento di facile lettura sulle principali caratteristiche e sugli adempimenti derivanti dall'applicazione del Regolamento CLP e dall'impatto sulle normative correlate, Agrofarma ha pubblicato il libretto 'La classificazione e l'etichettatura degli Agrofarmaci. Le nuove regole sono indirizzate ai rivenditori e distributori di agrofarmaci, tecnici e consulenti, vari interlocutori di filiera.



Regolamento (CE) N. 1272/2008

Indicazioni di pericolo

Pericoli fisici

H200	Esplosivo instabile.
H201	Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
H202	Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
H203	Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H204	Pericolo di incendio o di proiezione.
H205	Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
H220	Gas altamente infiammabile.
H221	Gas infiammabile.
H222	Aerosol altamente infiammabile.
H223	Aerosol infiammabile.
H224	Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H228	Solido infiammabile.
H240	Rischio di esplosione per riscaldamento.
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242	Rischio d'incendio per riscaldamento.
H250	Spontaneamente infiammabile all'aria.
H251	Autoriscaldante; può infiammarsi.
H252	Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
H260	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente
H261	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
H270	Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H271	Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
H272	Può aggravare un incendio; comburente.
H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H281	Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.

Pericoli per la salute

H300	Letale se ingerito.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.

H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H340	Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H350	Può provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H351	Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370	Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H371	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H372	Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H373	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

Regolamento (CE) N. 1272/2008

Indicazioni di pericolo

Pericoli per l'ambiente

H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Informazioni supplementari sui pericoli

Proprietà fisiche

EUH 001	Esplosivo allo stato secco.
EUH 006	Esplosivo a contatto con l'aria.
EUH 014	Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH 018	Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/inflammabile.
EUH 019	Può formare perossidi esplosivi.
EUH 044	Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

Proprietà pericolose per la salute


EUH 029	A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH 031	A contatto con acidi libera gas tossici.
EUH 032	A contatto con acidi libera gas molto tossici.
EUH 066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH 070	Tossico per contatto oculare.
EUH 071	Corrosivo per le vie respiratorie.

Proprietà pericolose per l'ambiente

EUH 059	Pericoloso per lo strato di ozono.
	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
	Tossico per contatto oculare. Corrosivo per le vie respiratorie.

Elementi dell'etichetta e informazioni supplementari per talune sostanze e miscele

EUH 201	Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.
EUH201A	Attenzione! Contiene piombo.
EUH 202	Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
EUH 203	Contiene Cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.
EUH 204	Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
EUH 205	Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
EUH 206	Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).
EUH 207	Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.
EUH 208	Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una Reazione allergica.
EUH 209	Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.
EUH209A	Può diventare infiammabile durante l'uso.
EUH 210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH 401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



I centri antiveleno in Italia

Di seguito si riportano le principali strutture antiveleno presenti in Italia, operative 24 ore su 24, con indirizzi e numeri telefonici utili per contattarle tempestivamente:

Bologna

Ospedale Maggiore

Via Largo Negrisoni 2 - tel. 051/6478955

Catania

Ospedale Garibaldi Centro Rianimazione

Piazza S. Maria Gesù - tel. 095/7594120

Cesena

Ospedale Maurizio Bufalini

Viale Ghirotti - tel. 0547/352612

Chieti

Ospedale Sant.ma Annunziata

tel. 0871/345362

Genova

Ospedale Gaslini - 010/3760873

Ospedale San Martino

Via Benedetto XV, n. 10 - tel. 010/352808

La Spezia

Ospedale Civile S. Andrea

Via Vittorio Veneto - tel. 0187/533296

Lecce

Ospedale Regionale Vito Fazzi

Via Moscati - tel. 0832/351105

Messina

Università degli Studi di Messina

Villag. Santissima Annunziata - tel. 090/2212451

Milano

Ospedale Niguarda Ca' Grande

Piazza Ospedale Maggiore 3 - tel. 02/66101029

Napoli

Ospedali Riuniti Cardarelli

Via Antonio Cardarelli 9 - tel. 081/5453333

Istituto Farmacologia e Tossicologia

Via Costantinopoli 16 - tel. 081/459802

Padova

Istituto di Farmacologia Universitaria

Largo Egidio Meneghetti 2 - tel. 049/931111

Pordenone

Ospedale Civile Centro Rianimazione

Via Montereale 24 - tel. 0434/399698

Reggio Calabria

Centro Rianimazione Azienda Ospedaliera "Bianchi - Melacrino - Morelli"

Via G. Melacrino - tel. 0965/811624

Roma

Policlinico Agostino Gemelli

Istituto di Anestesiologia e Rianimazione

Largo Agostino Gemelli 8 - tel. 06/3054343

Policlinico Umberto I

Viale del Policlinico - tel. 06/490663

Torino

Università di Torino

Via Achille Mario Dogliotti - tel. 011/6637637

Trieste

Istituto per l'Infanzia

Via dell'Istria 65/1 - tel. 040/3785373

AVVERTENZA

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta, prestando attenzione alle frasi, ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto.

Il presente catalogo riporta le indicazioni tecniche dei prodotti fitosanitari autorizzati con decreto dal Ministero della Salute, o in fase di decretazione, aggiornati alla data di stampa del catalogo stesso (2019).

Le informazioni contenute in questo catalogo si intendono a titolo indicativo. ASCENZA Italia S.r.l. declina ogni responsabilità per un uso improprio dei prodotti.

Per il loro corretto utilizzo si rimanda a quanto riportato in etichetta.





Stop agli agrofarmaci illegali

L'importanza della lotta agli agrofarmaci illegali, le regole da seguire.

I rischi legati al commercio ed all'utilizzo di agrofarmaci contraffatti, realizzati senza seguire le regolari procedure di sicurezza stabilite dalla legge, rubati o introdotti illegalmente nel nostro paese, sono i temi sui quali Agrofarma invita alla riflessione con la campagna "Stop agli agrofarmaci illegali" lanciata nel 2005. Da più di 10 anni Federchimica-Agrofarma è attivamente impegnata nel contrastare tale fenomeno, potenzialmente pericoloso tanto per gli agricoltori, quanto per l'ambiente, con l'obiettivo di sostenere tutti gli operatori della filiera agricola.

Il progetto ha promosso la realizzazione e distribuzione, presso rivenditori e agricoltori, di materiali informativi al fine di divulgare le buone regole di comportamento per contrastare il commercio illegale di agrofarmaci:

- Assicurarsi di acquistare agrofarmaci solo da operatori in possesso dei requisiti necessari per la vendita degli stessi;
- Diffidare della vendita di prodotti a prezzi significativamente più bassi della media;
- Segnalare tempestivamente alle autorità competenti coloro che propongono l'acquisto di agrofarmaci al di fuori dei canali certificati;
- Ricordare che chi vende e chi compra agrofarmaci rubati, importati illegalmente o contraffatti è perseguibile dalla legge.

Stop agli agrofarmaci illegali, ha inoltre avuto un importante impulso grazie alla collaborazione avviata tra Agrofarma e i Carabinieri del Nucleo Anti Sostituzioni a partire dal 2007: è stato infatti realizzato un Numero Verde (800 91 30 83) al quale può chiamare chi entra in contatto con agrofarmaci illegali o con prodotti che presentano caratteristiche sospette (prezzo insolitamente basso, distribuzione fuori dai canali tradizionali, confezioni non chiaramente identificabili o non integre, scarsa efficacia o danni alla coltura trattata, tra altri).

Il contributo di ognuno, infatti, può essere estremamente prezioso per l'efficace contrasto a questo fenomeno criminoso.



www.ascenza.it

visita i nostri social



Salvo errori e omissioni, i dati riportati in questo catalogo fanno riferimento a quanto in vigore
al momento della conclusione del progetto grafico.
19/11/2020





Via Varese, 25/G - 21047 Saronno (VA) - Italia

Phone +39 02 8494 4669

Fax +39 02 9621 685

Consulta il tuo distributore ASCENZA o visita www.ascenza.it

