


# **Folpec® 50 SC**

**Fungicida antiperonosporico di contatto per la difesa di vite e pomodoro in sospensione concentrata.**

**Folpec® 50 SC** è un fungicida multisito ad azione preventiva dotato di tre diversi meccanismi di azione: inibizione della respirazione cellulare, azione sulla divisione cellulare e interferenza con la permeabilità delle membrane. Attivo contro peronospora, escoriosi e botrite e manifesta inoltre un'attività collaterale su oidio e marciume nero.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Folpet puro 40% (500 g/l)	M 04	Sospensione Concentrata (SC)	 <b>ATTENZIONE</b> Registrazione n°: 13714 del 09/11/2007



Flacone: 1 L  
 Cartone: 12x1 L  
 Pallet: 600 L



Tanica: 10 L  
 Pallet: 500 L



Accedi al  
**Volantino**



Accedi alla  
**SDS**



Accedi  
all'**Etichetta**

## EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Escoriosi ( <i>Phomopsis viticola</i> )	0,5-1,5 max 3 l/hl	A partire dal germogliamento	2	28
	Peronospora ( <i>Plasmopara vitivinicola</i> )	0,2-2 max 2 l/hl	In condizioni favorevoli alla malattia	10	
POMODORO (campo)	Alternaria ( <i>Alternariosi spp.</i> ) Cladosporiosi ( <i>Cladosporium fulvum</i> )	0,25-0,5 max 2,5 l/hl	Intervenire dallo stadio di 3-4 foglie	4	7
POMODORO (serra)	Antracnosi ( <i>Colletotrichum coccodes</i> ) Septoriosi ( <i>Septoria lycopersici</i> ) Muffa grigia ( <i>Botrytis cinerea</i> )	0,25-0,32 max 3,2 l/hl		3	

## VANTAGGI

- **Folpec® 50 SC** è il partner ideale di fungicidi sistemici o citotropico-translaminari.
- È indicato all'interno di strategie antiresistenza in virtù dell'azione multisito.
- Inserito nei disciplinari di produzione integrata della vite.
- Selettivo nei confronti degli acari fitoseidi.
- La formulazione liquida di **Folpec® 50 SC** permette una maggiore rapidità di azione e una maggiore adesività per una migliore penetrazione del prodotto. La resistenza al dilavamento è ottimizzata dalla rapidità di assorbimento aumentata all'interno dei tessuti vegetali.
- L'ottimale coefficiente di ripartizione ottanolo acqua (Kow LogP= 3,11) di Folpet conferisce alta persistenza d'azione e forte resistenza al dilavamento.