

Actlet® C

Fungicida antiperonosporico sistemico per vite, patata, pomodoro, melanzana.

Actlet® C combina l'attività curativa sistemica del Metalaxil-M a quella preventiva di contatto del Rame idrossido. Svolge una triplice azione preventiva, curativa e antisporulante nei confronti della peronospora. Assorbito rapidamente a livello fogliare viene traslocato verso le parti della pianta in attiva crescita permettendo anche la protezione della vegetazione di nuova formazione.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Metalaxil-M puro 2,26% (28,5 g/l) Rame Idrossido 17,06% (215 g/l)	4 gruppo A1 M01	Sospensione Concentrata (SC)	 PERICOLO Registrazione n°: 16660 del 19/12/2018



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 10 L
Pallet: 500 L



Accedi al
Volantino



Accedi alla
SDS



Accedi
all'**Etichetta**

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)	
VITE DA VINO	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	3,5	Dalla fase di allegazione a inviatura (BBCH 71-83)	2 Ogni 12-14 gg	28	
VITE DA TAVOLA			Dalla fase di allungamento dello stelo principale fino all'accrescimento dei tuberi (BBCH 36-81)	3 Ogni 7-10 gg	21	
PATATA	Dalla preforitura a inizio maturazione frutti (BBCH 29-81)		10 (campo) 3 (serra)			
POMODORO (campo e serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)		3,5			Dalla preforitura a inizio maturazione frutti (BBCH 29-81)
MELANZANA (campo e serra)						

VANTAGGI

- Il rame idrossido garantisce una più rapida azione contro la peronospora rispetto gli altri Sali di rame.
- Formulazione liquida più concentrata sul mercato.
- A parità di superficie trattata apporta più M-metalaxil e meno rame dei formulati liquidi in commercio.
- La formulazione liquida garantisce una migliore solubilità del prodotto e una migliore copertura grazie alla ottimale microionizzazione delle particelle.
- Rapido assorbimento e traslocazione per una maggiore resistenza al dilavamento.