

BECAUSE WE CARE

2022

CATALOGO PRODOTTI

ASCENZA®

— FARMING YOUR FUTURE —


ASCENZA®
— FARMING YOUR FUTURE —





STIAMO COLTIVANDO IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA

ASCENZA è un'affermata società portoghese specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per la protezione delle colture e delle piante basati su principi attivi *off-patent*. Leader in questo segmento di mercato da oltre 50 anni, la società si sta affermando anche nei mercati dell'Europa meridionale e del Sudamerica, dove è già presente in Messico e Brasile.

ASCENZA sviluppa i suoi prodotti attraverso un quotidiano confronto con agricoltori, tecnici e distributori, per offrire soluzioni in grado di rispondere in modo sostenibile alle esigenze di un'agricoltura italiana rispettosa dell'ambiente, fautrice di produzioni eccellenti, sane e sicure e competitive sui mercati.

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Farm to Fork (F2F), **ASCENZA** ha sviluppato blexia® una linea di prodotti innovativa dedicata alla BioProtezione delle piante. La sfida della società è quella di arricchire l'offerta dei mezzi tecnici a disposizione degli agricoltori che vogliono attuare strategie di difesa dall'approccio sempre più sostenibili, innovative e green.

FARMING YOUR FUTURE

"Ci prendiamo cura delle Piante, delle Persone e del Pianeta. Sviluppiamo soluzioni innovative per i nostri agricoltori per garantire un'alimentazione sana ed equilibrata, sempre nel rispetto dell'ambiente. Questo è ciò per cui lavoriamo ogni giorno".

BECAUSE WE CARE

ROVENSA
— WELL BALANCED AGRICULTURE —

ORGOGLIOSI DI ESSERE PARTE DI UN GRANDE GRUPPO

Il **GRUPPO ROVENSA** è leader mondiale in soluzioni sostenibili per l'agricoltura, includendo prodotti per la bionutrizione, il biocontrollo e la protezione delle colture, per sostenere gli agricoltori nella produzione di alimenti sani, nutrienti e sicuri.

Ogni giorno 2000 dipendenti, distribuiti in più di 30 Paesi, sostengono la mission del Gruppo di nutrire il pianeta e si impegnano a migliorare il sistema di produzione alimentare basato su un'agricoltura equilibrata, volta a preservare e migliorare la salute de suolo, dell'ambiente e delle persone.

Oggi **ROVENSA** è in grado di offrire soluzioni per la protezione delle piante innovative e rispettose dell'ambiente in più di 80 Paesi. Con 25 Laboratori e Centri Sperimentali di Ricerca e Sviluppo distribuiti nel mondo e più di 800 tecnici specializzati in campo è in grado di lavorare a stretto contatto con gli agricoltori per aiutarli a produrre di più ma con meno risorse.

ROVENSA riconosce la sua responsabilità che l'uso delle conoscenze ed esperienze in suo possesso contribuiranno a guidare il processo verso un'agricoltura sostenibile e ridurre la fame nel mondo.
La Commissione Europea ha inoltre riconosciuto ad una delle società del Gruppo il Premio Europeo 2020 - 2021 per l'Ambiente (EBAE)

Le Aziende del Gruppo sono operative all'interno di tre grandi divisioni:

CROP PROTECTION

ASCENZA® selectis

BIONUTRITION

tradecorp® — A ROVENSA COMPANY — ogt® — A ROVENSA COMPANY — RODEL® — A ROVENSA COMPANY — MICROQUIMICA® Juntos produzimos mais SDP®

BIOCONTROL

idainature® — A ROVENSA COMPANY — agrichem® — A ROVENSA COMPANY — ORO AGRI agro tecno logia — A ROVENSA COMPANY —

WELL BALANCED AGRICULTURE





MISSIONE, VISIONE, VALORI

La nostra **MISSIONE**:
nutrire il pianeta, attraverso soluzioni sane e sicure per un'agricoltura bilanciata e sostenibile.
Crediamo che il nostro contributo possa aiutare il mondo ad affrontare le sfide alimentari del futuro, a causa della sovrappopolazione, dei cambiamenti climatici e del declino delle risorse del pianeta. Il Gruppo **ROVENSA** vuole creare un modello di agricoltura sostenibile che "produca meglio con meno".

La nostra **VISIONE:**
diventare un riferimento mondiale nella proposta di soluzioni per la protezione e nutrizione delle piante, facendo leva sulla nostra vicinanza con l'agricoltura locale.

I nostri **VALORI**:

- ***SAFETY: OGNUNO DI NOI CONTA!***
  Garantire la salute e la sicurezza delle persone che lavorano all'interno del Gruppo.
- ***EMPOWERMENT: ACCRESCERE LA SICUREZZA IN NOI STESSI***
  A ciascun membro del Gruppo vengono forniti spazio e autonomia per portare a termine il loro lavoro ed essere responsabili dei risultati.
- ***ETICHS: FARE QUELLO CHE SI DICE E DIRE QUELLO CHE SI FA'***
  Rispettare le normative vigenti attraverso un comportamento etico nei confronti di tutti gli stakeholders.
- ***DEDICATION: DARE SEMPRE IL MEGLIO E GUARDARE SEMPRE OLTRE***
  Ci prendiamo cura del nostro Gruppo come se fosse il nostro.
- ***STRIVING: LA CAPACITÀ DI ESSERE RESILIENTI***
  Quando i problemi diventano sfide ed opportunità.






FUNGICIDI

Actlet® C	8
Actlet® F	9
Actlet Evo	10
Almada® F	11
Almada® 50 SC	12
Almada® Hydro	13
Almada® Trio	14
Azox® 25 SC	15
Azupec® 80 WG	16
Back® 100 SC	17
Broker NEW	18
Cardinal® 50 WG	19
Coimbra®	20
Douro® 10 WG	22
Douro® 100 EC	24
Drum®	26
Folpec® 50 SC	28
Folpec® 80 WG Advance	29
Gat Tessla 25 WG NEW	30
Kresostar®	32
Medeiro® 80 WG Advance	33
Ossiram® 70 Flow	34
Shardif® 250 EC	36
Tokra®	37
Tribasic® Flow New	38
Vegas® 50 WG	40

Actlet® C

Fungicida antiperonosporico sistemico per vite, patata, pomodoro, melanzana.

Actlet® C combina l'attività curativa sistemica del Metalaxil-M a quella preventiva di contatto del Rame idrossido. Svolge una triplice azione preventiva, curativa e antisporulante nei confronti della peronospora. Assorbito rapidamente a livello fogliare viene traslocato verso le parti della pianta in attiva crescita permettendo anche la protezione della vegetazione di nuova formazione.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Metalaxil-M puro 2,26% (28 g/l) Rame Idrossido 17,06% (215 g/l)	4 gruppo A1 M01	Sospensione Concentrata (SC)	 ***PERICOLO*** Registrazione n°: 16660 del 19/12/2018



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 10 L
Pallet: 500 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	3,5	Dalla fase di allegagione a invaiatura (BBCH 71-83)	2 Ogni 12-14 gg	28
VITE DA TAVOLA					
PATATA	Peronospora *(Phytophtora infestants)*		Dalla fase di allungamento dello stelo principale fino all'accrescimento dei tuberi (BBCH 36-81)	3 Ogni 7-10 gg	21
POMODORO (campo e serra)			Dalla prefioritura a inizio maturazione frutti (BBCH 29-81)		10 (campo) 3 (serra)
MELANZANA (campo e serra)					

VANTAGGI

- Il rame idrossido garantisce una più rapida azione contro la peronospora rispetto gli altri Sali di rame.
- Formulazione liquida più concentrata sul mercato.
- A parità di superficie trattata apporta più M-metalaxil e meno rame dei formulati liquidi in commercio.
- La formulazione liquida garantisce una migliore solubilità del prodotto e una migliore copertura grazie alla ottimale microionizzazione delle particelle.
- Rapido assorbimento e traslocazione per una maggiore resistenza al dilavamento.

Actlet® F

Fungicida antiperonosporico sistemico per la vite davino e vite da tavola.

Actlet® F è una miscela a base di due sostanze attive, studiata per combattere l'insorgenza delle resistenze, ad azione preventiva, curativa e anti-sporulante. Folpet manifesta un'ottima capacità di legarsi alle cere della pianta garantendo una protezione completa della vegetazione e del grappolo. Metalaxil-M è una sostanza attiva che penetra rapidamente nei tessuti della pianta, dotato di una buona persistenza d'azione, grazie all'elevata resistenza al dilavamento, in grado di proteggere la vegetazione in via di accrescimento.
È ideale per le fasi fenologiche iniziali e le fasi successive per la protezione del grappolo.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Metalaxil-M puro 5% Folpet puro 40%	4 gruppo A1 M4	Granuli Idrodisperdibili (WG)	 *ATTENZIONE* Registrazione n°: 16663 del 21/06/2019



Sacco: 6-12 Kg
Pallet: 600 kg



Sacchetto: 1 kg
Cartone: 12x1 kg
Pallet: 480 kg

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (g/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	200 (2 Kg/ha)	Da inizio sviluppo tralci fino a inizio maturazione (BBCH 18-85)	2 Ogni 12-14 gg	28
VITE DA TAVOLA			Da inizio sviluppo tralci fino a fine fioritura (BBCH 18-69)		fino a fine fioritura

VANTAGGI

- Questa particolare formulazione, esente da polvere, permette una dispersione delle sostanze attive in acqua più rapida, completa e stabile e quindi un miglioramento dell'efficacia del trattamento (indipendentemente dalle temperature); inoltre il prodotto risulta più comodo da utilizzare e più sicuro per l'operatore.
- Folpet è efficace su Escoriosi e ha azione collaterale su Muffa Grigia, Oidio, Black rot e Carie bianca (malattia di post-grandine).



Actlet® Evo

Fungicida antiperonosporico endoterapico e di contatto per la vite.

Actlet® Evo è una miscela fungicida a tre vie per la vite a base di Metalaxil-M, Cimoxanil e Folpet. Dotato di attività sistemica, translaminare e di contatto è in grado di offrire una protezione completa della vegetazione, sia presente sia in via di sviluppo, e del grappolo in virtù della sua azione preventiva, curativa e antisporulante.
La presenza di tre sostanze attive che agiscono su siti di azione differenti permettono di contrastare l'insorgenza di fenomeni di resistenza.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Metalaxyl-M 4% Cimoxanil 4,8% Folpet 40%	4 gruppo A1 27 M 04	Granuli Idrodispersibili (WG)	 ***PERICOLO*** Registrazione n°: 16960 del 05/06/2020



Sacco: 5 kg
Pallet: 600 kg



Sacchetto: 1 kg
Cartone: 12x1 kg
Pallet: 480 kg

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (g/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	250 (2,5 Kg/ha)	Da inizio sviluppo tralci fino a inizio maturazione del grappolo (BBCH 18-85)	2 Ogni 12-14 gg	28
VITE DA TAVOLA	Peronospora *(Plasmopara viticola)*		Da inizio sviluppo tralci fino a fine fioritura (BBCH 18-69)		fino a fine fioritura

VANTAGGI

- Un fungicida innovativo a tre vie, che combina le proprietà di tre sostanze attive a diverso meccanismo d'azione e pronto all'uso.
- Soluzione ottimale per la gestione delle resistenze anche nelle zone a più alta pressione della malattia.



Almada® F

Fungicida a sistemia locale e di copertura per pomodoro e vite da vino.

Almada® F è un fungicida antiperonosporico in microgranuli idrodispersibili dotato di attività translaminare, locosistemica e di contatto che agisce in via preventiva, curativa e antisporulante nei confronti della peronospora della vite e del pomodoro. I due componenti, Dimetomorf e Folpet, presentano una azione sinergica e complementare, sia in termini di modalità che di siti di azione.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Dimetomorf puro 11,3% Folpet puro 60%	40 gruppo H5 M 04	Granuli Idrodispersibili (WG)	***PERICOLO*** Registrazione n°: 16140 del 24/05/2019



Sacco: 8 kg
Pallet: 640 kg



Sacchetto: 4 kg
Pallet: 480 kg

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (g/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	160 - 200 (1,6 - 2 Kg/ha)	Da inizio sviluppo tralci fino a pre-chiusura grappolo (BBCH 18-72)	3 Ogni 10-12 gg	28
POMODORO (campo e serra)	Peronospora *(Phytophtora infestants)*	160 (1,6 Kg/ha)	Dalle prime fasi di sviluppo a inizio maturazione frutti (BBCH 12-81)		7

VANTAGGI

- Soluzione ottimale per la gestione delle resistenze.
- **Almada® F** permette una protezione completa e prolungata sia della vegetazione presente al momento del trattamento sia quella in via di formazione.
- Folpet è efficace su Escoriosi e ha azione collaterale su Muffa Grigia, Oidio, Black rot e Carie Bianca (malattia di post-grandine). E' il prodotto di copertura con la massima resistenza al dilavamento.



Almada® 50 SC

Fungicida antiperonosporico endoterapico per lattughe, baby leaf e erbe fresche, patate e vite.

Almada® 50 SC è un fungicida a base di Dimetomorf dotato di attività citotropica-translaminare e locosistemica, registrato su un ampio numero di colture.
Il prodotto è caratterizzato da un'attività curativa e antisporulante.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Dimetomorf puro 44,25% (500 g/l)	40 gruppo H5	Sospensione Concentrata (SC)	 *ATTENZIONE* Registrazione n°: 16277 del 08/03/2018



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	0,5	Dallo sviluppo vegetativo fino a chiusura grappolo (BBCH 18-77)	3 Ogni 10-12 gg	28
PATATA	Peronospora *(Phytophtora infestants)*	0,4	Dallo sviluppo vegetativo fino alla maturazione dei tuberi (BBCH 12-81)	3 Ogni 7-10 gg	21
LATTUGHE E ALTRE INSALATE* (campo e serra) (escluse brassicacee)	Peronospora *(Bremia lactucae)*		Dallo sviluppo vegetativo fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 12-49)		7
BABY LEAF (campo e serra) (escluse brassicacee)	Peronospora *(Bremia lactucae)*		Dalle 2-3 foglie fino alla raccolta (BBCH 12-25)	1	
BASILICO ED ERBE FRESCHE** (campo e serra)	Peronospore *(Peronospora behlbarii* e altre)		Dalle 2-3 foglie vere fino alla raccolta (BBCH 12-49)	3	

* *Lattuga, Cicoria, Radicchio, Indivia, Scarola, Dente di leone, Crescione, Valerianella, Dolcetta, altre*
** *Cerfoglio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Menta, Salvia, Salvia moscatella, Timo, Angelica, Melissa, Borragine, Pimpinella, Fieno greco, Matricale, Issopo, Calendula o Fiorrancio, Maggiorana, Nasturzio, Ortica, Origano, Rosmarino, Ruta, Santoreggia, Cerfoglio muschiato, Acetosa, Drangocello, Stellina odorosa, altre.*

VANTAGGI

- **Almada® 50 SC** è l'unico dimetomorf puro registrato su erbe fresche, basilico e baby leaf.
- Caratterizzato da un'ottima resistenza al dilavamento che permette una protezione della vegetazione e del grappolo prolungata.
- Si inserisce in differenti strategie di controllo della peronospora.

ASCENZA®

Almada® Hydro

Fungicida antiperonosporico endoterapico per la vite.

Almada® Hydro è un fungicida a base di Dimetomorf e Rame idrossido dotato di attività citotropica-translaminare, locosistemica e di contatto, specifico per il controllo della peronospora della vite.
Il Dimetomorf si ridistribuisce all'interno delle foglie ove esercita un'azione endoterapica nei confronti del fungo, mentre la componente rameica assicura un'azione di copertura nei confronti della vegetazione.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Dimetomorf puro 4,72% (60 g/l) Rame Idrossido 15,75% (200 g/l)	40 gruppo H5 M 01	Sospensione Concentrata (SC)	 ***PERICOLO*** Registrazione n°: 16280 del 20/12/2017



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L

Tanica: 10 L
Pallet: 500 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	3	Dallo sviluppo vegetativo fino alla chiusura grappolo (BBCH 18-77)	3 Ogni 10-12 gg	28

VANTAGGI

- La formulazione liquida permette una distribuzione più omogenea e un assorbimento del prodotto più rapida (1-2 ore).



Almada® Trio

Fungicida sistemico e di contatto per la vite da vino.

Almada® Trio è una miscela fungicida a base di tre sostanze attive complementari a differente meccanismo d'azione per il controllo della Peronospora della vite.
Fosetil Alluminio stimola le naturali difese della pianta, agisce rallentando lo sviluppo del fungo e potenzia l'effetto degli altri componenti della miscela.
Folpet svolge una fondamentale azione preventiva fissandosi sulla lamina fogliare e sul grappolo impedendo al fungo di penetrare.
Dimetomorf viene assorbito dalla foglia e si redistribuisce localmente proteggendo dall'interno la vegetazione nei confronti delle spore del fungo che hanno già iniziato il processo di germinazione e di penetrazione nella foglia.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Dimetomorf puro 6% Folpet puro 25% Fosetil alluminio 50%	40 gruppo H5 M 04 P 07 (33)	Granuli Idrodispersibili (WG)	 ***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 16204 del 21/12/2018



Sacco: 6 kg
Pallet: 600 kg

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (Kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	3	Dallo sviluppo vegetativo fino alla chiusura grappolo (BBCH 18-77)	2 Ogni 10-12 gg	28

VANTAGGI

- Formulazione esclusiva di ASCENZA, pronta all'uso.
- **Almada® Trio** è caratterizzata da un'elevata persistenza e resistenza al dilavamento.



ASCENZA®

Azox® 25 SC

Fungicida ad ampio spettro d'azione in sospensione concentrata.

Azox® 25 SC è un fungicida ad azione preventiva, curativa ed antisporulante appartenente alla famiglia chimica delle strobilurine. Agisce a livello dei mitocondri bloccando la respirazione e quindi la germinazione e la crescita di micelio e spore. Viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie con movimento translaminare sistemico, risultando efficace a basse dosi d'impiego.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Azoxystrobin puro 22,93% (250 g/l)	11 gruppo C3	Sospensione Concentrata (SC)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 15888 del 11/12/2017



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
FRUMENTO DURO FRUMENTO TENERO	Oidio *(Erysiphe graminis)* Ruggini *(Puccinia striiformis, Puccinia recondita)* Septoria *(Septoria spp.)*	1	Dalla fine della levata e prima della fine fioritura	2 almeno ogni 14 gg	35
ORZO	Oidio *(Erysiphe graminis)* Ruggini *(Puccinia Spp.)* Striatura bruna dell'orzo *(Helminthosporium graminea)*				
RISO	Brusone del riso *(Pyrocularia orizae)* Elmintosporiosi *(Helminthosporium spp.)*		Tra la fase di fine botticella e la fine della spigatura	1	28
MELONE, ZUCCA, COCOMERO ZUCCHINO, CETRIOLO, CETRIOLINO (serra)	Oidio *(Sphaerotheca fuliginea)*	0,8	A partire dall'inizio della fioritura al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.	3 Ogni 10 gg	3
POMODORO (serra)	Oidio *(Leveillula taurica)*			2 Ogni 10 gg	

VANTAGGI

- Efficacia consolidata di Azoxystrobin contro le patologie fungine della spiga e contro il Brusone del riso.
- Grazie al rapido assorbimento l'efficacia fungicida del prodotto non viene ridotta da piogge cadute due ore dopo l'applicazione
- **Azox® 25 SC** è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari predatori) e non favorisce lo sviluppo degli acari.

Azupec® 80 WG

Fungicida antioidico a base di zolfo.

Azupec®80 WG è indicato per il controllo di tutte le forme di Oidio/Mal Bianco.
Il prodotto va impiegato in modo preventivo o alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Zolfo puro (esente da Selenio) 80%	M 02	Microgranuli Idrodispersibili (WG)	NC Registrazione n°: 12949 del 28/05/2009



Sacchetto:1 Kg
Cartone: 18x1 Kg
Pallet: 720 Kg



Sacco: 5 Kg
Pallet: 500 Kg



Sacco: 25 Kg
Pallet: 1000 Kg

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (g/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Oidio	275-400	Applicare preventivamente dalla 5a - 8a foglia	8 Ogni 7 gg	5
VITE DA TAVOLA					
POMODORO		150-200	Applicare alla comparsa dei primi sintomi	6 Ogni 10 gg	3

VANTAGGI

- Zolfo selettivo nei confronti delle principali colture anche ad alti dosaggi.
- Microgranulo idrodisperdibile ad elevatissima solubilità, indicato anche in caso di miscele complesse con altri agrofarmaci o applicazioni a basso volume.
- **Ammesso in agricoltura Biologica ai sensi della normativa vigente.**



ASCENZA®

Back® 100 SC

Fungicida per il controllo della peronospora della vite, del pomodoro e della patata.

Back®100 SC è un fungicida ad azione preventiva per il controllo della peronospora della vite, del pomodoro e della patata. Dotato di elevata affinità alle cere cuticolari che conferiscono elevata resistenza al dilavamento.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Ciazofamid puro 9,5% (100 g/l)	11 gruppo C3	Sospensione Concentrata (SC)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 17065 del 26/06/2020



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	0,9-1,1	Dalla prefioritura alla maturazione (BBCH 11-89)	4 Ogni 8-10 gg a dose minima e 12-14 a dose massima	21
POMODORO (da industria e mensa) (campo e serra)	Peronospora *(Phytophtora infestans)*	0,8	Dalla prefioritura alla maturazione (BBCH 12-89)	6 Ogni 7-10 gg	3
PATATA			Dallo sviluppo fogliare alla pre-raccolta (BBCH 12-89)	Ogni 5-7 gg, fino a 10 in caso di basso rischio	7

VANTAGGI

- Tra gli antiperonosporici in commercio **Back®100 SC** è il prodotto più indicato per la protezione dei frutti, data la sua elevata lipofilia.
- **Back®100 SC** è miscibile con numerosi prodotti del Catalogo ASCENZA (AZOX® 25 SC, DRUM®, ALMADA®, ecc)
- Grazie al suo breve intervallo di sicurezza **Back®100 SC** è indispensabile nella difesa di ortaggi con raccolta scalare.
- Selettivo nei confronti degli insetti pronubi e utili.
- Inserito nelle Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture.

NEW

Broker®

Fungicida ad azione fogliare per applicazioni su frumento e orzo.

Broker® è un fungicida a base di protioconazolo destinata al controllo di alcuni agenti funginei su orzo e cereali.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Protioconazolo puro 25,38% (250 g/l)	G	Emulsione Concentrata (EC)	 ***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 17805 del 27/01/2021



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
FRUMENTO (TENERO E DURO)	*Puccinia spp.*	0,8 l/ha	1ª applicazione al primo al terzo nodo (BBCH 31-33)	2 Ogni 10-14gg	35
			2ª applicazione dalla foglia a bandiera completamente aperta fino alle ariste visibili (BBCH 39-49)		
ORZO	*Fusarium spp.*		1ª dalla foglia a bandiera completamente aperta fino al rigonfiamento appena visibile a livello della guaina della foglia a bandiera (BBCH 39-43)		
			2a dal 30 % della spiga emersa alla piena fioritura: 50 % antere mature (BBCH 53-65)		



ASCENZA®

Cardinal® 50 WG

Fungicida sistemico per la difesa contro la botrite della vite, la ticchiolatura delle pomacee e monilia delle drupacee.

Cardinal®50 WG è un fungicida attivo contro la botrite della vite, ticchiolatura delle pomacee e monilia delle drupacee. Ciprodinil agisce bloccando la biosintesi degli amminoacidi, in questo modo viene inibita la crescita del patogeno.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Ciprodinil puro 50%	9 gruppo D1	Microgranuli Idrodispersibili (WG)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 16249 del 18/12/2018



Sacchetto: 1 Kg
Cartone: 12x1 Kg
Pallet: 480 Kg

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (Kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Muffa Grigia *(Botritys cinerea)*	0,75	Tra la fioritura ed invaiatura (BBCH 60-83)	1	7
POMACEE	Ticchiolatura del melo e del pero *(Venturia spp.)*	0,5	Tra la fase di orecchiette di topo e pre-fioritura (BBCH 10-59)	3 Ogni 10-14 gg	60
DRUPACEE	Ticchiolatura del melo e del pero *(Venturia spp.)*		Tra lo sviluppo dei germogli e la fase di pre-raccolata	2 Ogni 10-14 gg	7



Coimbra®

Fungicida antiperonosporico endoterapico sistemico per lattuga e patata.

Coimbra® è una miscela ad attività citotropica-translaminare e sistemica che assicura il controllo preventivo, curativo e antisporulante delle peronospore. Resistente al dilavamento e garantice una protezione duratura della vegetazione. In virtù dei differenti meccanismi di azione, **Coimbra®** non presenta alcun rischio di resistenza incrociata e si inserisce perfettamente nei programmi di difesa integrata. Assicura una completa protezione della vegetazione esistente e quella in via di sviluppo o più nascosta. È selettivo nei confronti degli organismi utili e non bersaglio.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Dimetomorf puro 8% (90 g/l) Propamocarb 44,2% (500 g/l)	40 gruppo H5 28 gruppo F4	Sospensione Concentrata (SC)	NC Registrazione n°: 16278 del 03/07/2017



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
PATATA	Peronospora *(Phytophtora infestans)*	2	Dall'inizio dello sviluppo vegetativo fino ad inizio maturazione dei tuberi (BBCH 19-81)	3 Ogni 7-12 gg	21
LATTUGA (campo)	Peronospora *(Bremia lactucae)*		Dall'inizio dello sviluppo vegetativofino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 12-45)	3 Ogni 10-12 gg	7

VANTAGGI

- **Coimbra®** è una formulazione liquida esclusiva ASCENZA di facile utilizzo e priva di solventi nocivi.
- L'effetto sinergico fra le sostanze attive permette un importante incremento di efficacia e persistenza rispetto alla miscela estemporanea.
- Grazie al rapido assorbimento (2 ore) è resistente al dilavamento.
- Eccellente profilo ecotossicologico e tossicologico.


SAPPIAMO COME PRENDERCI CURA DELLE PIANTE, E CIÒ PER CUI LAVORIAMO OGNI GIORNO.
BECAUSE WE CARE
ASCENZA®
— FARMING YOUR FUTURE —

Douro® 10 WG

Fungicida sistemico ad azione preventiva, curativa e bloccante per colture arboree e orticole.

Douro® 10 WG è un fungicida appartenente alla famiglia chimica dei triazoli, dotato di attività sistemica con azione preventiva, curativa e bloccante.
Attivo nei confronti dell'oidio del melo, della vite e di numerose altre colture ed agisce anche nei confronti della ticchiolatura delle pomacee.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Penconazolo puro 10%	3 gruppo G1	Microgranuli Idrodispersibili (WG)	 ***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 13782 del 02/05/2007



Sacchetto: 1 Kg
Cartone: 10x1 Kg
Pallet: 500 Kg

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (g/hl) PREVENTIVI	DOSE (g/hl) CURATIVI	DOSE (g/hl) BLOCCANTI	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI /ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Oidio *(Uncinula necator)* Black rot (Guignardia bidwelii) *Pseudopezia spp.*	25-30	-	-	Pre e post fioritura	Ogni 14-16 gg	
VITE DA TAVOLA		15-20	-	-		Ogni 7-10 gg	
VITE DA VINO		-	50	-	Attacchi in atto alla comparsa dei primi sintomi	2 Ogni 5-7 gg	
MELO	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis)*	30-40	-	-	Fino alla fase di frutto noce	Ogni 7-8 gg	
		-	35-40	-	entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante	-	
		-	-	35-40	in presenza di sintomi	2 Ogni 7 gg	
	Odio *(Podosphaera leucotricha)*	30-40	-	-	in primavera in estate	Ogni 10 gg Ogni 10-14 gg	
		-	-	30-35	in presenza di sintomi	3 Ogni 7 gg	
	Malattie da conservazione *(Monilia fructigena, Penicillum spp., Muffa grigia)*	35-40			Pre-raccolta	Ogni 7 gg	
PERO	Ticchiolatura *(Venturia pyrina)* Ticchiolatura *(Venturia pyrina)*	25-35	-	-	In condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia	Ogni 10-12 gg	
		-	30-40	-	entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante	-	14
		-	-	30-40	-	2 Ogni 5-7 gg	
PESCO (incluso NETTARINE e IBRIDI SIMILI)	Oidio	40-50	-	-	Dalla caduta dei petali	Ogni 10-14 gg	
	Malattie da conservazione *(Monilia fructigena, Penicillum spp., Gloesporium, Muffa grigia)*	50			Pre-raccolta	2-3 Ogni 7 gg	
TABACCO	Oidio	35-50	-	-	Alla comparsa dei sintomi	2-4 Ogni 10-14 gg	
MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO, PEPERONE, POMODORO (campo)	Oidio	25-50	-	-	Applicare in via preventiva o alla comparsa dei primi sintomi	2-4 Ogni 12-14 gg	
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE	Oidio e Ruggini	25-50	-	-	-	Ogni 10-14 gg	

VANTAGGI

- La formulazione WG garantisce la perfetta miscibilità e selettività nei confronti di tutte le più comuni varietà di melo e pero.
- Su vite esplica una effetto collaterale a azione di contenimento contro Black rot (*Guignardia bidwelii*).
- Viene rapidamente assorbito anche in condizioni difficili (poche ore).
- Penconazolo è inserito in tutti i disciplinari di produzione integrata.

Douro® 100 EC

Fungicida sistemico ad azione preventiva, curativa e bloccante per colture arboree, orticole e ornamentali.

Douro®100 EC è un fungicida appartenente alla famiglia chimica dei triazoli, attivo nei confronti dell'Oidio della Vite e di numerose altre colture. Attivo nei confronti dell'oidio del melo, della vite e di numerose altre colture ed agisce anche nei confronti della ticchiolatura delle pomacee.
La sua attività sistemica ha un'azione preventiva, curativa e bloccante. Il prodotto viene assorbito in poche ore anche in condizioni ambientali difficili.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Penconazolo puro 10,20% (100 g/l)	3 gruppo G1	Concentrato Emulsionabile (EC)	 ***PERICOLO*** Registrazione n°: 16034 del 30/07/2014



Flaconcino: 0,25 L
Cartone: 24x0,25 L
Pallet: 500 L



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (ml/hl) PREVENTIVI	DOSE (ml/hl) CURATIVI	DOSE (ml/hl) BLOCCANTI	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI /ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Oidio *(Uncinula necator)* Black rot (Guignardia bidwelii) *Pseudopezia spp.*	25-30	-	-	Pre e post fioritura	Ogni 14-16 gg	
VITE DA TAVOLA		15-20	-	-		Ogni 7-10 gg	
VITE DA VINO		-	50	-	Attacchi in atto alla comparsa dei primi sintomi	2 Ogni 5-7 gg	
MELO	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis)*	30-40	-	-	Fino alla fase di frutto noce	Ogni 5-7 gg"	
		-	35-40	-	entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante	-	
		-	-	35-40	in presenza di sintomi	2 Ogni 7 gg	
	Odio *(Podosphaera leucotricha)*	30-40	-	-	in primavera in estate	Ogni 10 gg Ogni 10-14 gg	
		-	-	30-35	in presenza di sintomi	3 Ogni 7 gg	
	Malattie da conservazione *(Monilia fructigena, Penicillum spp., Muffa grigia)*	35-40			Pre-raccolta	3 Ogni 7 gg	
PERO	Ticchiolatura *(Venturia pyrina)*	25-35	-	-	In condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia	Ogni 10-12 gg	
	Ticchiolatura *(Venturia pyrina)*	-	30-40	-	entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante	-	14
		-	-	30-40	-	2 Ogni 5-7 gg	
PESCO (incluso NETTARINE e IBRIDI SIMILI)	Oidio	40-50	-	-	Dalla caduta dei petali	Ogni 10-14 gg	
	Malattie da conservazione *(Monilia fructigena, Penicillum spp., Gloesporium, Muffa grigia)*	50			Pre-raccolta	2-3 Ogni 7 gg	
TABACCO	Oidio	35-50	-	-	Alla comparsa dei sintomi	2-4 Ogni 10-14 gg	
MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO, PEPERONE, POMODORO (campo)	Oidio	25-50	-	-	Applicare in via preventiva o alla comparsa dei primi sintomi	2-4 Ogni 12-14 gg	
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE	Oidio e Ruggini	25-50	-	-	-	Ogni 10-14 gg	

VANTAGGI

- Su vite esplica una effetto collaterale a azione di contenimento contro Black rot (*Guignardia bidwelii*).
- E' inserito nei Disciplinari di produzione integrata.
- Grazie all'ottima miscibilità, **Douro®100 EC** è un partner ideale di prodotti ad azione specifica in strategie antiresistenza.
- L'efficacia del trattamento garantiscono una produzione di qualità per uve destinate alla vinificazione.

Drum®

Fungicida citrotropico translaminare ad azione preventiva e curativa nei confronti delle perenosporacee che attaccano vite, orticole, tabacco e rosa.

Drum® è un fungicida attivo nei confronti delle peronosporacee che attaccano diverse colture. Svolge una duplice azione: per contatto nei confronti degli elementi di propagazione della peronospora (zoospore) ed endoterapica nei confronti del micelio che si sviluppa all'interno della lamina fogliare.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Cimoxanil puro 45%	27	Granuli Idrodispersibili (WG)	 *ATTENZIONE* Registrazione n°: 15084 del 07/06/2011



Scatola: 0,5 Kg
Cartone: 20x0,5 Kg
Pallet: 450 Kg

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (g/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI /ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	40-50	Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione fino alla sfioritura	-	10
		30-35	Dall'allegagione fino alla chiusura del grappolo		
CARCIOFO	Peronospora *(Bremia lctucae)*	40-50	Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione fino alla raccolta dei capolini	6	21
LATTUGA (campo e semenzaio)			Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione	5	7
SPINACIO	Peronospora *(Peronospora farinosa)*		Trattare le piante quando ancora giovani; alla comparsa di sintomi	-	10
MELONE	Peronospora *(Pseudoperonospora cubensis)*		Dal post-trapianto fino allo stadio di giovane frutto	-	3
ZUCCHINA, CETRIOLO (serra)			Dal post-trapianto fino allo stadio di giovane frutto	5	
PISELLO (esclusi piselli da granella secchi e piselli con baccello)	Peronospora *(Peronospora pisi)*		Dallo stadio vegetativo fino alla fioritura	-	10
AGLIO, CIPOLLA	Peronospora *(Peronospora schleideni)*		Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione	4	7
PORRO	Peronospora *(Peronospora porri)*				
PATATA	Peronospora *(Phytophtora infestans)*		Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione fino alla raccolta	6	
POMODORO			Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione fino alla fruttificazione	-	10
TABACCO	Peronospora *(Peronospora tabacina)*		Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione in tutti gli stadi di accrescimento	-	
ROSA	Peronospora *(Peronospora sparsa)*		Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione	-	-

VANTAGGI

- **Drum®** si caratterizza per la sua formulazione di qualità nell'ambito dei prodotti a base di cimoxanil al 45%.
- È un partner valido nella gestione delle malattie fungine nell'ambito di un pragramma di difesa basato su strategie anti-resistenza.



Folpec® 50 SC

Fungicida antiperonosporico di contatto per la difesa di vite e pomodoro in sospensione concentrata.

Folpec® 50 SC è un fungicida multisito ad azione preventiva dotato di tre diversi meccanismi di azione: inibizione della respirazione cellulare, azione sulla divisione cellulare e interferenza con la permeabilità delle membrane.
Attivo contro peronospora, escoriosi e botrite e manifesta inoltre un'attività collaterale su oidio e marciume nero.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Folpet puro 40% (500 g/l)	M 04	Sospensione Concentrata (SC)	 *ATTENZIONE* Registrazione n°: 13714 del 09/11/2007



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 10 L
Pallet: 500 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Escoriosi *(Phomopsis viticola)*	0,5-1,5 max 3 l/hl	A partire dal germogliamento	2 Ogni 7 gg	28
	Peronospora *(Plasmopara vitivinicola)*	0,2-2 max 2 l/hl	In condizioni favorevoli alla malattia	2 Ogni 10 gg	
POMODORO (campo)	Alternaria *(Alternariosi spp.)* Cladosporiosi *(Cladosporium fulvum)* Antracnosi *(Colletotrichium coccodes)* Septoriosi *(Septoria lycopersici)* Muffa grigia *(Botrytis cinerea)*	0,25-0,5 max 2,5 l/hl	Intervenire allo stadio di 3-4 foglie fino a 7 gg prima della raccolta	4	3
POMODORO (serra)		0,25-0,32 max 3,2 l/hl		3	7

VANTAGGI

- **Folpec® 50 SC** è il partner ideale di fungicidi sistemici o citotropico-translaminari.
- È indicato all'interno di strategie antiresistenza in virtù dell'azione multisito.
- Inserito nei disciplinari di produzione integrata della vite.
- Selettivo nei confronti degli acari fitoseidi.
- La formulazione liquida di **Folpec® 50 SC** permette una maggiore rapidità di azione e una maggiore adesività per una migliore penetrazione del prodotto. La resistenza al dilavamento è ottimizzata dalla rapidità di assorbimento aumentata all'interno dei tessuti vegetali.
- L'ottimale coefficiente di ripartizione ottanolo acqua (Kow LogP= 3, 11) di Folpet conferisce alta persistenza d'azione e forte resistenza al dilavamento.

Folpec® 80 WG Advance

Fungicida antiperonosporico di contatto per la difesa di vite e pomodoro.

Folpec® 80 WG Advance è un fungicida multisito ad azione preventiva dotato di tre diversi meccanismi di azione sul patogeno: inibizione della respirazione cellulare, azione sulla divisione cellulare e interferenze con la permeabilità delle membrane. Attivo contro peronospora, escoriosi e botrite e manifesta inoltre un'attività collaterale su oidio e marciume nero.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Folpet puro 80%	M 04	Microgranuli Idrodispersibili (WG)	*ATTENZIONE* Registrazione n°: 13485 del 14/01/2013



Sacco: 10 Kg
Pallet: 500 Kg



Sacchetto: 1 Kg
Cartone: 12x1 Kg
Pallet: 480 Kg

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (g/hL)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Escoriosi *(Phomopsis viticola)*	150-175 max 1,5 Kg/ha	Dalla ripresa vegetativa fino alla comparsa delle prime foglioline	-	28
	Peronospora *(Plasmopara vitivinicola)* Black rot *(Guignardia bidwellii)* Muffa griga *(Botrytis cinerea)*		In condizioni favorevoli alla malattia	-	
POMODORO (campo)	Alternariosi *(Alternaria spp.)* Cladosporiosi *(Cladosporium fulvum)* Antracnosi *(Colletotrichium spp.)* Septoriosi *(Septoria lycopersici)* Muffa grigia *(Botrytis cinerea)*	150 max 1,5 Kg/ha	In condizioni favorevoli alla malattia	4	7
POMODORO (serra)		200 max 2 Kg/ha		3	

VANTAGGI

- **Folpec® 80 WG Advance** è il partner ideale all'interno di strategie antiresistenza in virtù dell'azione multisito.
- La formulazione in Microgranuli Idrodisperdibili (WG) garantisce l'assenza di polverosità, una perfetta solubilità e miscibilità in botte.
- Caratterizzato da una buona persistenza d'azione ed ottima resistenza al dilavamento.

NEW

Gat Tessla 25 WG®

Fungicida sistemico per susino, vite, zucchino, peperone, melone, carciofo, cereali e tappeti erbosi.

Gat Tessla® 25 WG è un fungicida sistemico a base Tebuconazolo in granuli idrodispersibili. Agisce in modo preventivo, curativo ed eradicante. Una volta assorbito, penetra rapidamente nei tessuti vegetali, questo permette di sfuggire all'azione dilavante delle pioggie e di proteggere la vegetazione sviluppatasi dopo il trattamento.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Tebuconazolo puro 25%	3 Gruppo G1	Granuli Idrodispersibili (WG)	 *ATTENZIONE* Registrazione n°: 14629 del 15/12/2010



Scatola: 1 Kg
Cartone: 10x1 Kg
Pallet: 300 Kg

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
SUSINO	*Monilia spp.* *Botrytis cinerea*	0,5-1,25 kg/ha	Trattamenti a cavallo della fioritura	2	7
			Trattamenti in pre-raccolta	2 ogni 7 gg	
	Mal bianco *(Sphaerotheca pannosa)*		-	-	
	Ruggine del susino	0,5-0,9 kg/ha	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia	2	
VITE DA VINO	Oidio *(Uncinula necator)*	40 g/hl	-	3 ogni 10-14 gg	14
FRUMENTO DURO FRUMENTO TENERO	Mal del piede *(Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis)*	1 kg/ha	In fase di accestimento-levata		28
	Oidio *(Erysiphe graminis)* Ruggini *(Puccinia spp.)* Rincosporiosi *(Rhynchosporium spp.)* Elmintosporiosi Septoria*(Septoria spp.)*	1 kg/ha	Da inizio levata a spigatura	1	
	Fusariosi della spiga *(Fusarium spp.)*	1 kg/ha	In fase di piena fioritura		
ORZO	Mal del piede *(Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis)*	1 kg/ha	In fase di accestimento-levata	1	fine fioritura
	Oidio *(Erysiphe graminis)* Ruggini *(Puccinia spp.)* Rincosporiosi *(Rhynchosporium spp.)* Elmintosporiosi Septoria*(Septoria spp.)*		Da inizio levata a spigatura		
	Fusariosi della spiga *(Fusarium spp.)*		In fase di piena fioritura		
MELONE ZUCCHINO	Oidio	50 g/hl	-	4 Ogni 7-10 gg	3
PEPERONE CARCIOFO			-	3 Ogni 7-10 gg	

Kresostar®

Fungicida ad azione multisito per il controllo della ticchiolatura delle pomacee, della maculatura bruna del pero e occhio di pavolne dell'olivo.

Kresostar® è una miscela innovativa a base di due sostanze attive.
Kresoxim-metile ostacola la germinazione delle spore e lo sviluppo dei miceli mentre Difenoconazolo agisce all'interno della pianta esplicando un'azione endoterapica contro il patogeno.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Difenoconazolo puro 12,5% (125 g/l) Kresoxym metile 25% (250 g/l)	3 gruppo G1 11 gruppo C3	Microgranuli Idrodisperdibili (WG)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 16301 del 23/10/2018



Flacone: 0,6 Kg
Cartone: 12 x 0,6 Kg
Pallet: 360 Kg

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
POMACEE	Ticchiolatura del melo *(Venturia inaequalis)* Ticchiolatura del Pero *(Venturia pirina)* Maculatura bruna del Pero *(Stemphylium vesicarium)*	0,25-0,30	Dalla fase punte verdi fino al completo sviluppo del frutto (BBCH 53-79)	3 Ogni12-14 gg	35
OLIVO DA OLIO	Occhio di pavone *(Cycloconium oleaginum)*		Dalla fase di differenziazione dei grappoli fiorali fino alla fase di apertura delle corolle (BBCH 50-59)	2 Ogni 14 gg	-
OLIVO DA TAVOLA					

VANTAGGI

- **Kresostar®** è una valida soluzione in quelle aree dove si sono manifestati fenomeni di resistenza a carico dei tradizionali fungicidi triazolici.
- Lunga persistenza sulla pianta anche in condizioni climatiche sfavorevoli.



Medeiro® 80 WG Advance

Fungicida sistemico per vite, pomacee ed agrumi.

Medeiro® 80 WG Advance è dotato di sistemia acropeta e basipeta, in grado di proteggere la vegetazione esistente e quella in via di formazione.
Una volta assorbito esercita una attività preventiva e di stimolo delle difese naturali della pianta con la produzione di Fitoalessine, sostanze in grado di potenziare la capacità di reazione contro le malattie fungine.
Particolarmente efficace nei confronti dei Fitomiceti, Peronospore e Fitoftore (marciumi radicali).

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Fosetil alluminio puro 80%	P 07 (33)	Granuli Idrodispersibili (WG)	NC Registrazione n°: 15363 del 15/03/2012



Sacco: 10 Kg
Pallet: 500 Kg



Sacchetto: 1 Kg
Cartone: 10x1 Kg
Pallet: 500 Kg

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (g/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	250-300	A partire dalla pre-fioritura	4 Ogni 10-14 gg	28
POMACEE	Fitoftora *(Phytophthora spp.)*		1° trattamento: aprile 2° trattamento: luglio 3° trattamento: settembre/ottobre	3	15
ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, LIMETTA, MANDARINO, CLEMENTINO, POMELO, BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO			1° trattamento: inizio fioritura 2° trattamento: luglio 3° trattamento: ottobre/novembre		

VANTAGGI

- **Medeiro® 80 WG Advance** è il partner ideale per numerose miscele in virtù della sinergia con numerosi principi attivi sia di contatto che citotropico-translaminari.
- È inserito in tutti i disciplinari di produzione integrata delle colture in etichetta.
- Microgranulo dotato di elevata solubilità e ridotta emissione di polveri.
- È particolarmente indicato in combinazione con prodotti a sito di azione specifico in chiave di strategia antiresistenza.

Ossiram® 70 Flow

Fungicida a base di ossicloruro di rame liquido.

Ossiram® 70 Flow è caratterizzato da una formulazione che garantisce una copertura uniforme, completa, un'alta adesività utile e resistenza ai dilavamenti.
La formulazione colloidale finissima una volta disciolta in acqua forma una sospensione uniforme che facilita la preparazione della miscela.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Ossicloruro di rame 36,7% (700 g/l)	M 01	Sospensione Concetrata (SC)	*ATTENZIONE* Registrazione n°: 9420 del 05/11/1997



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L
Cartone: 2x5 L
Pallet: 680 L

Visita la pagina prodotto!



ASCENZA®

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (ml/hl)	DOSE l/ha (dose max)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI /ANNO	PHI (gg)
AGRUMI	Peronospora *(Phytophtora spp.)*	75	0,75	Applicare durante la fase di maturazione	2 Ogni 14-21 gg	15
	Fumaggine ed altre alterazioni batteriche e fungine	125	1,25			
VITE DA VINO	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	100-150	1,5	Evitare la fase della fioritura	4	
VITE DA TAVOLA						
OLIVO DA TAVOLA	Occhio del pavone *(Cycloconium oleaginum)*	150-250	2,5	In primavera e/o autunno evitando la fase di fioritura	2	
OLIVO DA OLIO						
PATATA (campo)	Peronospora *(Phytophthora infestans)*	200	2	-	3 Ogni 7-10 gg	
POMACEE	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis, Venturia* pyrina)	150-250	2,5	Alla caduta delle foglie	3 Ogni 14 gg	-
DRUPACEE	Bolla *(Taphrina deformans)* Monilia *(Monilia fructigena)*	200	2	Alla caduta delle foglie e all'ingrossamento delle gemme	2	
POMODORO (campo e serra)	Peronospora *(Phytophthora infestans)*	200	2	Evitare la fase della fioritura	3 Ogni 7-10 gg	3 (serra) 10 (campo)

VANTAGGI

- **Ossiram® 70 Flow** è l'ossicloruro di rame liquido più concentrato in commercio.
- L'alto contenuto della sostanza attiva per litro permette la movimentazione di minori quantitativi di prodotto.
- Ha un'ampia etichetta su tutti i fruttiferi.
- **Consentito l'impiego in Agricoltura Biologica ai sensi della normativa vigente.**

Shardif® 250 EC

Fungicida sistemico per il controllo della ticchiolatura e oidio su melo e pero, bolla e monilia su pesco, cercosporiosi su barbabietola da zucchero e altre malattie delle colture orticole e floricole.

Shardif® 250 EC è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, sostanza attiva appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Difenoconazolo puro 23,23% (250 g/l)	3 gruppo G1	Concentrato Emulsionabile (EC)	 ***PERICOLO*** Registrazione n°: 16354 del 12/05/2015



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Cercosporiosi *(Cercospora beticola)*	0,2-0,3	-	3 Ogni 15-20 gg	21
MELO, PERO	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis)* Oidio *(Podosphaera leucotricha)*	15 ml/hl	-	4	14
ASPARAGO	Puccinia asparagi, *Stemphylium vesicarium*	0,5	-	3-4 Ogni 10-14 gg	7
SEDANO	*Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidii, Micosferella*	0,4-0,5	A seconda della pressione della malattia	3-4 Ogni 7-14 gg	21
CAROTA					7
CAVOLFIORE					14
PATATA					
POMODORO	Cladosporiosi	0,5	-	3-4 Ogni 10 gg	7
	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5	A seconda della pressione della malattia	3-4 Ogni 7-14 gg	
CETRIOLO	Oidi, Alternariosi	0,5	-	3-4 Ogni 10-14 gg	
PESCO	Bolla	20-30 ml/hl	Da inizio emissione foglie	2-3	
	Monilia		Pre-raccolta	1-2	
ROSA, GAROFANO	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml/hl	Effettuare saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici	2-3 Ogni 7-14 gg	-

ASCENZA®

Tokra®

Fungicida antioidico sistemico e di contatto per la vite.

Tokra® è una miscela innovativa a base di Kresoxim-metile e Penconazolo per il controllo di Oidio e Black rot della Vite.
Il Kresoxim-metile ostacola la germinazione delle spore e lo sviluppo dei miceli, mentre il Pencoconazolo agisce all'interno della pianta esplicando un azione endoterapica contro il patogeno.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Kresoxym-metile puro 25% Penconazolo puro 8,75%	11 gruppo C3 3 gruppo G1	Microgranuli Idrodispersibili (WG)	 ***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 16310 del 23/10/18



Flacone: 0,6 Kg
Cartone: 12 x 0,6 Kg
Pallet: 360 Kg

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (Kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO	Oidio *(Uninula necator)* Black-rot *(Guignardia bidwelli)*	0,3-04	Dalla fase di sviluppo vegetativo fino ad inizio maturazione (BBCH 15-85)	2 Ogni 12-14 gg	35
VITE DA TAVOLA				3 Ogni 12-14 gg	

VANTAGGI

- Grazie alla presenza di due diversi principi attivi, **Tokra®** non presenta rischi di resistenza incrociata, ponendosi come soluzione laddove si sono manifestati fenomeni di resistenza a carico dei tradizionali fungicidi triazolici.
- Il prodotto presenta un'ottima resistenza al dilavamento e permette una protezione della vegetazione del grappolo prolungata.



Tribasic® Flow New

Fungicida a base di solfato di rame tribasico.

Tribasic® Flow New ha una struttura molecolare tale da rendere subito disponibile parte del rame contenuto, mentre l'altra parte si solubilizza più lentamente garantendo una graduale liberazione degli ioni rame. La formulazione liquida garantisce una maggiore efficienza di assorbimento dello ione metallo grazie all'elevata adesività alla superficie fogliare.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Solfato di rame tribasico 15,2% (190 g/l)	M01	Sospensione Concentrata (SC)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 17479 del 19/09/2019



Flacone: 1 L
Cartone: 12 x 1 L
Pallet: 720 L



Tanica: 10 L
Pallet: 520 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE l/ha	DOSE l/hl	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI /ANNO	PHI (gg)
MELO, PERO, COTOGNO	Cancri rameali *(Nectria galligena, Sphaeropsis malorum, Phomopsis mali)*, Ticchiolatura *(Venturia inaequalis, Venturia pirina)* Muffa a circoli *(Monilia fructigena)* Colpo di fuoco batterico del pero *(Erwinia amylovora)*	5,16-6,45	0,43	Trattamenti al bruno	3-4 Ogni 7-8 gg	-
		3,3-5,25	0,28-0,35	Dall'ingrossamento delle gemme alla comparsa dei mazzetti fiorali	2-3 Ogni 7-8 gg	
NESPOLO	Ticchiolatura *(Fusicladium eriobotryae)*	2,73-3,3	0,27	Trattamenti al bruno	2-3 Ogni 7-8 gg	
PESCO, ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO	Bolla *(Taphrina deformans)* Cancro rameale *(Fusicoccum amygdali)* Corineo *(Stigminacarpophila =Coryneumbeijerinkii)* Moniliosi *(Monilia laxa, M. fructigena)* Nerume o Cladosporiosi *(Cladosporium carpophilum)* Cilindrosporiosi del ciliegio *(Cylindrosporium padi)* Scopazzi del ciliegio *(Taphrina cerasi)* Bozzacchioni del susino *(Taphrina pruni)* *Xanthomonas* spp, *Pseudomonas* spp (azione collaterale)	4-6	0,4-0,5	Trattamenti al bruno	3-4 Ogni 14-21 gg	-
VITE DA VINO	Peronospora *(Plasmopara viticola)* Escoriosi *(Phomopsis viticola)* Black-rot *(Guignardia biwelli)*	2,5-3,5	0,25-0,35	Terza foglia distesa fino a pre-fioritura	3-5 Ogni 7-8 gg	21
VITE DA TAVOLA				Chiusura del grappolo fino ad inizio invaiatura		
OLIVO DA OLIO	Occhio di pavone *(Spilocaea oleaginea)* Fumaggine *(Capnodium spp.)* Rogna *(Pseudomonas syringae subsp. savastanoi)*	4-4,5	0,4-0,45	Da stasi alla ripresa vegetativa	3-4 Ogni 7-8 gg	14
OLIVO DA TAVOLA				Da inizio maturazione drupe a raccolta		

ASCENZA®

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE L/ha	DOSE L/hL	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI / ANNO	PHI (gg)
AGRUMI	*Phytophthora spp.* Fumaggine *(Capnodium spp.)*	2,5-3	0,25-0,3	Pre-fioritura (dalla schiusura delle gemme fiorali)	3-4 Ogni 7-8 gg	-
ACTINIDIA	Marciume del colletto *(Phytophthora spp.)* Alternaria *(Alternaria alternata)* Maculatura batterica *(Pseudomonas viridiflava)* Cancro batterico *(Pseudomonas syringae pv, actinidiae)*	6-6,5	0,6-0,65	Da dormienza fino a ripresa vegetativa	1-3 Ogni 7-14 gg	
NOCE, NOCCIOLO, CASTAGNO, MANDORLO	Mal dello stacco *(Cytospora Corylicola)* Antracnosi del noce Fersa del castagno *(Mycosphaerella maculiformis)* Attività collaterale contro: Macchie nere del noce *(Xanthomonas campestris pv. juglandis)* Necrosi batterica del nocciolo *(Xanthomonas campestris pv. corylina)*, Cancro batterico del nocciolo (Pseudomonas syringae pv. avellanae)	6-6,5	0,6-0,65	Trattamenti al bruno	2-3 Ogni 7-8 gg	
PICCOLI FRUTTI (campo)	Micosferella *(Mycosphaerella rubi)* Cancri corticali *(Phomopsis cinerescens)*	2,4-3,5	0,3-0,35	Da dormienza fino a ripresa vegetativa	2-3 Ogni 7-14 gg	
FRAGOLA (campo)	Vaiolatura *(Mycosphaerella fragariae)* *Phytophthora spp.* e *Xanthomonas spp.* (azione collaterale)"	2-2,5	0,2-0,25	Al trapianto	3-4 Ogni 7-8 gg	7
POMODORO (campo e serra)	Peronospora *(Phytophthora infestans)* Marciume zonato *(Phytophthora nicotianae var. parasitica)* *Alternaria spp.* Attività collaterale su batteriosi	2,5-3,5	0,25-0,35	In vegetazione	3-4 Ogni 7-8 gg	3 (da mensa) 10 (da industria)
MELANZANA (campo e serra)	Cancro del pedale *(Phytophthora spp.)* Antracnosi *(Colletotrichum coccodes)* Attività collaterale su batteriosi	2,5-3	0,25-0,3		2-3 Ogni 7-8 gg	3
CUCURBITACE A BUCCIA COMMESTIBILE (campo e serra)	*Pseudoperonospora cubensis* *Colletotrichum lagenarium* Maculatura angolare (Pseudomonas syringae pv. *lachrymans*)	2-3	0,23-0,3		2-3 Ogni 7-8 gg	
CUCURBITACE A BUCCIA NON COMMESTIBILE (campo)						7
CARCIOFO	Peronospora *(Bremia lactucae)* Antracnosi *(Ascochyta spp.)* Septoria apiicola Batteriosi (attività collaterale)	1,5-3	0,25-0,3		2-3 Ogni 7-8 gg	3
ASPARAGO		1,5-3	0,25-0,3	Dopo la raccolta dei turioni	3-4 Ogni 7-8 gg	-
PISELLO, PISELLO MANGIATUTTO, FAGIOLO, FAGIOLINO, LENTICCHIA (campo e serra)	Peronospora *(Bremia lactucae, Peronospora schleideni, Peronospora pisi, Peronospora brassicae, Peronospora spp.)* Alternariosi *(Alternaria spp.)* Antracnosi *(Ascochyta spp. Colletotrichum spp.)* Batteriosi (attività collaterale)	2,5-3	0,25-0,3	In vegetazione	2-3 Ogni 7-8 gg	3
ORTAGGI A BULBO (campo)						
CAVOLI AD INFIORESCENZA (campo)						14
PATATA (campo)	Peronospora *(Phytophthora infestans)* Alternariosi *(Alternaria spp.)* Attività collaterale su Batteriosi	3-4	0,3-0,4		3-4 Ogni 7-8 gg	7
CIPRESSO	Cancro del cipresso *(Coryneum=Seiridium cardinale)*	2,8-3,5	0,35	-	2-3 Ogni 7-8 gg	-
COLTURE FLOREALI (campo e serra)	Peronospora, Alternariosi, Ruggini, *Diplocarpon rosae* Attività collaterale su batteriosi	1,35-2,25	0,23	Alla comparsa delle condizioni predisponenti allo sviluppo del patogeno	2-3 Ogni 7-8 gg	-

VANTAGGI

- **Tribasic® Flow New** è un prodotto selettivo, caratterizzato da un'ottima efficacia e persistenza d'azione prolungata.
- L'elevata micronizzazione delle particelle permette l'ottimo potere coprente del prodotto.
- **Consentito l'impiego in Agricoltura Biologica ai sensi della normativa vigente.**

Vegas® 50 WG

Fungicida preventivo per la difesa di olivo, vite e pomacee.

Vegas®50 WG è un fungicida di copertura dotato di attività transalminare. Ampio spettro d'azione su diversi patogeni di melo, pero, vite e olivo. Soluzione esclusiva ASCENZA per la difesa dell'Olivo per il controllo dell'Occhio di Pavone.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Kresoxym-metile puro 50%	11 gruppo C3	Granuli Idrodispersibili (WG)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 15986 del 30/11/2018



Flacone: 0,6 Kg
Cartone: 12 x 0,6 Kg
Pallet: 360 Kg

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (g/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
OLIVO	Occhio di pavone *(Spilocaea oleaginea)*	200	Dall'inizio dello sviluppo dei bottoni fiorali alla mignolatura	2 Ogni 14 gg	Non effettuare la raccolta prima dello stadio di piena maturazione
MELO	Ticchiolatura del melo *(Venturia inaequalis)* Oidio *(Podosphaera leucotricha)*		Intervenire in via preventiva allo sviluppo delle infiorescenze	3 Ogni 12-14 gg	35
PERO	Ticchiolatura del pero *(Venturia pyrina)* Maculatura bruna *(Stemphylium vesicarium)*				
VITE	Oidio *(Uncinula necator)*	300	Iniziare i trattamenti alla comparsa dei grappoli	2 Ogni 12-14 gg	
	Black rot *(Guidnardia bidwellii)*			3 Ogni 12-14 gg	

VANTAGGI

- **Vegas®50 WG** è selettivo per gli organismi utili (impollinatori).
- Non influenza la fermentazione e le caratteristiche organolettiche dei vini.




LE PERSONE
ED I LORO BISOGNI
SONO AL CENTRO
DEI NOSTRI
INVESTIMENTI
IN RICERCA E SVILUPPO.
BECAUSE WE CARE
ASCENZA®
— FARMING YOUR FUTURE —

ERBICIDI



Bentador®	44
Callicore®	45
Drone®	46
Extensor® OD	48
Grims® 10 NEW	49
Grims® Duo NEW	50
Hereu®	51
Hereu® SC	52
High® Top	54
Joystick®	56
Matsuda® 25 WG	57
Mohican® 500 SC	58
Nicozea® OD	59
Nirvana®	60
Orbiter® NEW	61
Pendi® 40	62
Plaza®	64
Stonic® NEW	66
Sudoku® Ultra OD NEW	68
Taisen® 800 EC	70

Bentador®

Erbicida selettivo di post-emergenza per il mais.

Bentador® è un erbicida selettivo di contatto per il controllo di infestanti dicotiledoni e ciperacee del mais. L'assorbimento della sostanza attiva avviene prevalentemente per via fogliare, secondariamente per via radicale, nel giro di poche ore.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Bentazone puro 40,8% (480)	C3	Concentrato Solubile (SL)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 16419 del 16/06/2016



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
MAIS	**Infestanti sensibili:** Anagallide *(Anagallis arvensis)* Amaranto *(Amaranthus spp)* Cencio molle *(Abutilon theophrasti)* Chenopodio *(Chenopodium spp)* Erba morella *(Solanum nigrum)* Erba porcellana *(Portulaca oleracea)* Persicaria *(Polygonum persicaria)* Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)* Stramonio *(Datura stromonium)* Senape *(Sinapis arvensis)* Zigolo *(Cyperus esculentus)*	Applicare in post emergenza della coltura fino ad un massimo di 5-6 foglie di altezza ed infestanti nei primi stadi di sviluppo	2,5-3	-

VANTAGGI

- **Bentador®** è l'alternativa su mais per un efficace controllo delle ciperacee e altre infestanti a foglia larga.
- La formulazione SL permette un'agevole dosaggio e miscelazione del prodotto, garantendo maggiore sicurezza per l'operatore.



Callicore®

Erbicida di post emergenza selettivo per il mais.

Callicore® è un erbicida selettivo di post emergenza per il mais in sospensione concentrata, attivo nei confronti di numerose infestanti di difficile controllo.
Agisce prevalentemente per via fogliare e parzialmente per via radicale. Una volta assorbito viene rapidamente traslocato all'interno dell'infestante determinando l'interruzione della sintesi della clorofilla, il progressivo sbiancamento dei tessuti fino al disseccamento completo. I sintomi sono visibili generalmente 3-4 giorni dopo il trattamento.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Mesotrione puro 9,22% (100 g/l)	F2	Sospensione Concentrata (SC)	***PERICOLO*** Registrazione n°: 16381 del 20/12/2017



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
MAIS DA GRANELLA MAIS DA INSILATO (escluso MAIS da seme e MAIS DOLCE)	**Dicotiledoni:** Amaranto *(Amaranthus hybridus, Amaranthus retroflexus)* Cencio molle *(Abutilon theophrasti)* Erba morella *(Solanum nigrum)* Farinello *(Chenopodium album)* Forbicina comune *(Bidens tripartita)* Galinsoga *(Galinsoga parviflora)* Nappola *(Xanthium strumarium)* Persicaria *(Polygonum persicaria)* Stellaria *(Stellaria media)* Stramonio *(Datura stromonium)*	Dicotiledoni: applicare su infestanti già emerse o invia di emergenza	0,75-1,5	-
	Graminacee: Digitaria *(Digitaria sanguinalis)* Giavone *(Echnochloa crus-galli)*	Graminacee: applicare su infestanti nei primi stadi di sviluppo (2-3 foglie)	1-1,5	
	Ciperace: Zigolo *(Cyperus esculentus)*	In presenza di Cipero	1,5	

VANTAGGI

- **Callicore®** è efficace nei confronti delle infestanti resistenti alle Triazine (Es. Terbutilazina) e Solfuniluree (Gruppo degli ALS), risultando un prodotto fondamentale nell'ottica di una strategia antiresistenza mirante a preservare integra l'efficacia degli erbicidi esistenti.

Drone®

Erbicida sistemico selettivo di post emergenza del mais per il controllo di dicotiledoni annuali e perenni.

Drone® è un erbicida sistemico di post-emergenza che svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe. Viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica.
Il prodotto è in grado di controllare malerbe dicotiledoni perennanti ed annuali.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Dicamba puro 42,1% (480 g/l)	O	Concentrato Solubile (SL)	NC Registrazione n°: 17749 del 22/12/20



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 1008 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE		EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
MAIS	**Infestanti sensibili:** Amaranti (*Amaranthus spp.*) Attaccamano (*Galium aparine*) Cencio molle (*Abutilon theophrasti*) Centocchio (*Stellaria media*) Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*) Correggiola (*Polygonum aviculare*) Erba morella (*Solanum nigrum*) Farinello (*Chenopodium album*) Fiordaliso (*Centaurea cyanus*) Forbicina (*Bidens spp.*) Fumaria (*Fumaria officinalis*) Nappola italiana (*Xanthium spp.*) Persicaria (*Polygonum persicaria*) Romice (*Rumex spp.*) Senecione (*Senecio vulgaris*) Sicio (*Sicyos angulatus*) Soffione (*Taraxacum officinalis*) Spergola (*Spergula arvensis*) Stoppione (*Cirsium arvense*) Stramonio (*Datura stramonium*) Vecce (*Vicia spp.*) Vilucchio (*Convolvulus arvensis*) Vilucchione (*Calystegia sepium*) Uva turca (*Phytolacca decamdra*)	**Infestanti mediamente sensibili:** Anagallide (*Anagallis arvensis*) Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*) Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*) Cocomero asinino (*Ecballium elaterium*) Crisantemo selvatico (*Chrysanthemum segetum*) Ortica (*Urtica urens*) Papaveri (*Papaver spp.*) Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*) Senape comune (*Sinapis arvensis*) Veronica (*Veronica spp.*)	BBCH 12-15	Trattamento unico: 0,6 Volume d'acqua: 200-400 L/ha	-

VANTAGGI

- **Drone®** è un'erbicida utile a completare una strategia di post-emergenza per il controllo totale delle infestanti presenti, sia dicotiledoni perennanti che annuali.

Extensor® OD

Erbicida di post emergenza selettivo per il mais.

Extensor® OD permette un efficace controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni del mais grazie alla sinergia tra sulcotrione e nicosulfuron, esaltata dalla speciale formulazione in dispersione oleosa. È Ideale per gli interventi di post emergenza sul mais, da solo o in associazione con graminicidi residuali, ad ampio spettro d'azione per il controllo di infestanti graminacee e dicotiledoni, compresa la sorghetta da seme e da rizoma. Agisce in modo sistemico per via fogliare e radicale.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Nicosulfuron puro 1,9% (20 g/l) Sulcotrione puro 14,3% (150 g/l)	B F2	Dispersione Oleosa (OD)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 15746 del 31/03/2016



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L



Tanica: 10 L
Pallet: 500 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
MAIS (escluso MAIS da seme e MAIS DOLCE)	**Infestanti sensibili:** Amaranto comune *(Amaranthus retroflexus)* Farinello comune *(Chenopodium album)* Farinello con foglie di viburno *(Chenopodium opulifolium)* Fienarola comune *(Poa annua)* Giavone *(Echinochloa crus-galli)* (max 2-3 foglie) Mercorella comune *(Mercurialis annua)* Morella comune *(Solanum nigrum)* Poligono persicaria *(Polygonum persicaria)* Porcellana comune *(Portulaca oleracea)* Sanguinella comune *(Digitaria sanguinalis)* (max 2-3 foglie) Setaria *(Setaria spp.)* (max 2-3 foglie)	Applicare con infestanti allo stadio di 2-3 foglie massimo	Trattamento unico: 2 l/ha Trattamento frazionato: 2 interventi da 1 l/ha ogni 14 gg	-

VANTAGGI

- Selettivo per la coltura.
- **Extensor® OD** l'unica formulazione in dispersione oleosa a base di Nicosulfuron e Sulcotrione sul mercato italiano.
- Attivo anche in presenza di condizioni sfavorevoli per le applicazioni di pre-emergenza (siccità, terreni organici, etc.).
- Perfetta stabilità e miscibilità del prodotto.
- La formulazione OD garantisce efficacia e selettività senza l'aggiunta di bagnanti o additivi.

NEW

ASCENZA®

Grims® 10

Graminicida di ost-emergenza per Frumento, Segale e Triticale.

Grims®10 è un erbicida selettivo di post emergenza attivo nei confronti delle principali infestanti graminacee di frumento tenero e duro, triticale e segale.
Assorbito per via fogliare viene traslocato nei tessuti in via di accrescimento delle infestanti.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Clodinafop propargyl puro 9,4% (100 g/l) Cloquintocet mexyl puro 2,4%	A	Emulsione Concentrata (EC)	 ***PERICOLO*** Registrazione n°: 16744 del 21/02/2018



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
FRUMENTO TENERO, FRUMENTO DURO, TRITICALE, SEGALE	**Fino alla fase di inizio accestimento:** Coda di volpe *(Alopecurus myosu-roides)* Falaride *(Phalaris paradoxa)* Loglio *(Lolium spp.)* Poa *(Poa annua)* **Fino alla fase di inizio levata:** Avena *(Avena spp.)*	Impiegare in post-emergenza della coltura in buono stato vegetativo a partire dalla terza foglia di sviluppo fino all'ultimo nodo di levata	Trattamento unico: 0,6 l/ha	-



NEW

Grims® Duo

Graminicida di post-emergenza per Frumento e Orzo.

Grims®Duo è un erbicida selettivo di post-emergenza attivo nei confronti delle principali infestanti graminacee di frumento tenero e duro.
Viene assorbito attraverso le foglie ed i germogli delle infestanti in fase di accrescimento provocando inizialmente un arresto dello sviluppo e la successiva morte.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Clodinafop propargyl puro 2,41% (25 g/l) Diclofop-methyl 23,5% (250 g/l) Cloquintocet mexyl puro 0,6% (6,25 g/l)	A A	Emulsione Concentrata (EC)	 ***PERICOLO*** Registrazione n°: 16994 del 28/01/2021



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
FRUMENTO TENERO, FRUMENTO DURO (invernale)	**Infestanti sensibili:** Avena *(Avena spp.)* Loglietto *(Lolium multiflorum)* **Infestanti mediamente senibili:** Coda di volpe *(Alopecurus myosu-roides)* Loglio rigido *(Lolium rigidum)* Scagliola *(Phalaris paradoxa)* Fienarola *(Poa annua)*	A partire dalla fase di due foglie dispiegate fino alla fase di accestimento (BBCH 12-29)	Trattamento unico: 1-1,5 l/ha	-



Hereu®

Erbicida selettivo ad ampio spettro d'azione in emulsione concentrata.

Hereu® è un erbicida selettivo a base di Oxyfluorfen per il controllo di un ampio spettro di infestanti annuali dicotiledoni e graminacee in applicazioni di pre e post-emergenza.
Agisce per contatto sulle infestanti presenti ma anche sulle plantule in via di emergenza.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Oxyfluorfern puro 22% (240 g/l)	E	Emulsione Concentrata (EC)	 ***PERICOLO*** Registrazione n°: 12961 del 26/10/2005



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
VITE POMACEE DRUPACEE NOCCIOLO ARANCIO LIMONE POMPELMO	**Infestanti sensibili:** Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)* Camomilla *(Matricaria spp.)* Centocchio *(Stellaria spp.)* Coda di topo *(Alopecurus spp.)* Fienarola annua *(Poa annua)* Papavero *(Papaver spp.)* Peverina *(Cerastium spp.)* Ranuncolo *(Ranunculus spp.)* Veccia *(Vicia app.)* Vilucchio bianco *(Calystegia sepium)* Vilucchio comune *(Convolvolus arvensis)* Zizzania *(Lolium temulentum)*	Pre-emergenza delle infestanti: applicare tra il tardo autunno e l'inizio dell'inverno su terreno pulito. Post-emergenza delle infestanti: applicare ai primi stadi di sviluppo delle malerbe. Consigliata la miscela con erbicidi sistemici e residuali.	1,875	-
GIRASOLE		Applicare in pre-emergenza delle infestanti	1	
CARCIOFO		Impiegare solo lungo la fila della coltura	Pre-emergenza: 1-1,5 Post-emergenza: 1,875	
VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI		Applicare in pre-emergenza delle infestanti	1,875	

VANTAGGI

- **Hereu®** è una soluzione di riferimento nel controllo delle infestanti del girasole in pre-emergenza.
- È il diserbante ideale nella miscelazione con Glifosate per il controllo totale di un ampio spettro di infestanti.

Hereu® SC

Erbicida selettivo ad ampio spettro d'azione in sospensione concentrata.

Hereu®SC è un erbicida selettivo a base di Oxyfluorfen per il controllo di un ampio spettro di infestanti annuali dicotiledoni e graminacee in applicazioni di pre e post-emergenza.
Agisce per contatto sulle infestanti presenti ma anche sulle plantule in via di emergenza.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Oxyfluorfern puro 42,9% (500 g/l)	E	Sospensione Concentrata (SC)	 ***PERICOLO*** Registrazione n°: 16033 del 04/06/2014



Flaconcino: 0,5 L
Cartone: 20x0,5 L
Pallet: 510 L



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
VITE POMACEE DRUPACEE NOCCIOLO ARANCIO LIMONE POMPELMO MANDORLO	**Infestanti sensibili:** Monocotiledoni annuali: Coda di topo *(Alopecurus spp.)* Digitaria *(Digitaria sanguinalis)* Orzo *(Hordeum vulgare)* Panico *(Panicum dichotomiflorum)* Setaria *(Setaria spp.)* Zizzania *(Lolium temulentum)* Dicotiledoni annuali: Amaranto *(Amaranthus spp.)* Betonica *(Stachys annua)* Centocchio dei campi *(Anagallis arvensis)* Crucifere in genere Datura *(Datura stramonium)* Papavero *(Papaver spp.)* Porcellana *(Portulaca oleracea)* Poligoni *(Polygonum spp.)* Senape *(Sinapis arvensis)* Dicotiledoni perenni (nei trattamenti di post emergenza): Acetosella *(Oxalis spp.)* Artemisia *(Artemisia spp.)* Malva *(Malva spp.)* Ortica *(Urtica dioica)* Romici *(Rumex spp.)* Stoppione *(Cirsium arvense)* Vilucchio *(Convolvulus arvensis)*	In pre-emergenza contro specie annuali In post-emergenza consultare l'etichetta per i casi specifici	0,9	-
OLIVO		Su impianti in produzione fino a 7gg prima del raccolto	0,9	7
GIRASOLE		Su colture con file di 70-75 cm trattare con banda di 20-25 cm	0,5	-
CARCIOFO		In pre-emergenza subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura	0,5-0,75	
		In post-emergenza	0,75-0,9	
VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI		Impiegare solo sulla fila della coltura	0,5-0,75	
AREE INCOLTE E SEDI FERROVIARIE		Applicare in pre-emergenza o con infestanti presenti o in post-emergenza recoce	0,5-0,9	

VANTAGGI

- **Hereu® SC** è una soluzione di riferimento nel controllo delle infestanti del girasole in pre-emergenza.
- È il diserbante ideale nella miscelazione con Glifosate per il controllo totale di un ampio spettro di infestanti.

High® TOP

Erbicida selettivo contro infestanti annuali e poliennali.

High® TOP è un erbicida attivo contro infestanti annuali e poliannuali.
Risulta rapidamente assorbito dall'apparato fogliare delle infestanti bloccandone lo sviluppo.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Quizalofop-p-ethyl 12% (g/l)	A	Concentrato Emulsionabile (EC)	 ***PERICOLO*** Registrazione n°: 17306 del 05/09/2018



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
MELO , PERO, PESCO	**Infestanti sensibili:** Avena selvatica *(Avena spp.)* *Bromus spp.* Coda di volpe *(Alopecorus myosuroides)* Falaridi *(Phalaris spp.)* Falsa gramigna *(Agropyrum repens)* Giavone comune *(Echinochloa crusgalli)* Gramigna *(Elytrigia repens, Cynodon dactylon)* Loglio italico *(Lolium multiflorum)* Miglio *(Panicum miliaceum)* Orzo *(Hordeum vulgare)* Pabbio *(Setaria spp.)* Sanguinella comune *(Digitaria sanguinalis)* Sorghetta *(Sorghum halepense)* **Semi di:** Triticum spp, Paspalum spp, Panicum spp, Eleusine indica, Dactylis spp.	Infestante 3-4 foglie	0,83-1,25	35
VITE DA VINO			1,25	
VITE DA TAVOLA				
FRAGOLA, MIRTILLO, LAMPONE, RIBES			0,83-1,25	42
PATATA				56
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO				60
GIRASOLE				84
TABACCO				30
BARBABIETOLA			1,25	60
ERBA MEDICA, TRIFOGLIO			0,83-1,25	21
POMODORO, MELANZANA				15
LATTUGA, SCAROLA, RADICCHIO, SPINACIO, ERBE AROMATICHE				28
PISELLO, CECE, FAGIOLO, LENTICCHIA				23
COLZA, LINO, SOIA, COTONE				84
ORNAMENTALI				-
FORESTALI, VIVAI				

VANTAGGI

- **High® TOP** è un erbicida utile a completare uno spettro d'azione in miscela con altri erbicidi dicotiledonicidi autorizzati sulle diverse colture.

Joystick®

Erbicida di post-emergenza precoce per i cereali autunno-vernini.

Joystick® è un erbicida selettivo di contatto e residuale, per il controllo di infestanti dicotiledoni e monocotiledoni di frumento tenero e duro, orzo, triticale e segale a base di tre differenti sostanze attive, Diflufenican, Florasulam e Iodosulfuron.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Didlufenican 40% Florasulam 2% Iodosulfuron 5%	F1 B2 B2	Granuli Idrodispersibili (WG)	 ***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 16744 del 21/02/2018



Flaconcino: 0,2 Kg
Cartone: 12x0,2 Kg
Pallet: 204 Kg



Flacone: 1 Kg
Cartone: 6x1Kg
Pallet: 216 Kg

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	Dose (kg/ha)	PHI (gg)
FRUMENTO TENERO, FRUMENTO DURO, ORZO, TRITICALE, SEGALE	**Infestanti sensibili:** Anagallide *(Anagallis arvensis)* Attaccamani *(Galium aparine)* Centocchio comune *(Stellaria media)* Camomilla *(Matricaria chamomilla)* Correggiola *(Polygonum aviculare)* Papavero *(Papaver rhoeas)* Poa *(Poa annua)* Senape selvatica *(Sinapis arvensis)* Soffione minore *(Picris echioides)* Veronica *(Veronica spp.)* **Moderatamente sensibili:** Avena selvatica *(Avena fatua)* Loglio rigido *(Lolium rigidum)* Nontiscordardimé minore *(Myosotis arvensis)* Vilucchio comune *(Convolvolus arvensis)*	Impiegare in post-emergenza della coltura dalla terza foglia di sviluppo a fine accestimento (BBCH 13-29)	0,15-0,2	-

VANTAGGI

- Controllo completo delle principali infestanti dicotiledoni dei cereali, includendo anche le più difficili quali: Veronica, Fumaria, Cardo mariano, Papavero.
- Azione sinergica con i principali graminicidi di post emergenza.
- Prima miscela a base di iodosulfuron registrata su orzo.
- Altamente sostenibile nella prevenzione dell'insorgenza di popolazioni resistenti, grazie alla combinazione di diversi meccanismi di azione (ALS e PDS - inibizione della biosintesi dei carotenoidi).
- Attivo anche a basse temperature.
- **Joystick®** è un prodotto a bassa volatilità e quindi non è soggetto a potenziali problemi di contaminazione da deriva di altre colture (a differenza di MCPA).

Matsuda® 25 WG

Erbicida selettivo per il diserbo di vite, agrumi, olivo e aree non coltivate.

Matsuda® 25 WG è un erbicida sistemico e residuale ad ampio spettro per il controllo in pre-emergenza e post-emergenza precoce delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni.
Il prodotto viene assorbito rapidamente attraverso le radici e le foglie e traslocato per via floematica e xilematica in senso ascendente e discendente.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Flazasulfuron puro 25%	B2	Granuli Idrodispersibili (WG)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 16474del 29/03/2018



Flaconcino: 0,1 Kg
Cartone: 10x0,1 Kg
Pallet: 144 Kg

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE		EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)	PHI (gg)
VITE DA VINO	**Infestanti sensibili:** Amaranto *(Amaranthus spp.)* Coniza *(Conyza canadensis)* Farinello *(Chenopodium album)* Loiessa *(Lolium multiflorum)* Malva *(Malva spp.)* Portulaca *(Portulaca oleracea)* Rucola selvatica *(Diplotaxis erucoides)* Senecione *(Senecio vulgaris)*	**Moderatamente sensibili:** Geranio selvatico *(Geranium dissectum)*	Applicare fra fine inverno e inizio primavera, su infestanti che hanno sviluppato al massimo 4 foglie.	60-200 1 trattamento/ciclo colturale	-
VITE DA TAVOLA					
ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, LIMETTA, MANDARINO, CLEMENTINO, POMELO, BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO					
OLIVO			In primavera	60-200 1 trattamento/ ciclo colturale	45
			In autunno	60-100 1 trattamento/ ciclo colturale	
AREE NON COLTIVATE				60-200 1 trattamento/ anno	-
AREE URBANE			Applicazione meccanica		

VANTAGGI

- **Matsuda® 25 WG** permette il controllo di infestanti difficili come Lolium, Conyza e Malva.
- Formulazione granulare di alta qualità.
- Flessibilità d'impiego: **Matsuda® 25 WG** è compatibile con altri principi attivi erbicidi.

Mohican® 500 SC

Erbicida per il controllo delle infestanti a foglia larga su colture arboree e cereali.

Mohican® 500 SC è un erbicida selettivo ad azione fogliare e residuale, in grado di controllare efficacemente numerose infestanti a foglia larga. Si applica in pre-emergenza e post-emergenza delle infestanti.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Diflufenican puro 42% (500 g/l)	F1	Sospensione Concentrata (SC)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 16395 del 18/02/2016



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
FRUMENTO DURO, FRUMENTO TENERO, ORZO, SEGALE, TRITICALE	**Infestanti sensibili:** Amaranto *(Amaranthus retroflexus)* Anagallide *(Anagallis arvensis)* Correggiola *(Poligonum aviculare)* Crisantemo delle messi *(Chrysanthemum segetum)* Farinello *(Chenopodium album)* Papavero *(Papaver rhoeas)* Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)* Romice *(Rumex spp)* Silene *(Silene gallica)* Veronica *(Veronica Spp.)* **Infestanti mediamente sensibili:** Attaccamani *(Galium aparine)* Borsa del Pastore *(Capsella bursa-pastoris)* Falsa Camomilla *(Anthemis spp.)* Giunco *(Juncus bufonius)* Senape selvatica *(Sinapis arvensis)* Spergola *(Spergula arvensis)*	Applicare in pre-emergenza o in post emergenza fino all'inizio accestimento (BBCH 0-29)	0,33	-
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA		Applicare nel período di riposo vegetativo della coltura fino a circa un mese prima del germogliamento	0,5-0,6	
PESCO, NETTARINA, CILIEGIO, SUSINO, ALBICOCCO, MANDORLO		Applicare in pre-emergenza delle infestanti o su infestanti in fase di primo sviluppo (2-4 foglie)	0,5-0,56	
OLIVO				35
MELO, PERO			0,5-0,6	-
AGRUMI				

VANTAGGI

- **Mohican® 500 SC** possiede un meccanismo d'azione differente dai principali erbicidi per il controllo della foglia larga in post-emergenza.
- Ottimo strumento in strategie antiresistenza per il controllo di dicodiledoni difficili.
- È possibile miscelarlo con altri erbicidi per completare lo spettro di infestanti da controllare.

Nicozea® OD

Erbicida sistemico di post-emergenza selettivo per il mais.

Nicozea®OD è un erbicida a base di Nicosulfuron in gradi di controllare un ampio spettro di infestanti Graminacee e Dicotiledoni, inclusa la sorghetta da seme e da rizoma. Agisce in modo sistemico portando al disseccamento delle infestanti dopo alcuni giorni dal trattamento.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Nicosulfuron puro 4,18% (40 g/l)	B	Dispersione Oleosa (OD)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 13741 del 27/04/2010



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE		EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
MAIS	**Infestanti sensibili** **Graminacee**: Giavone comune *(Echinochloa crus-galli)* Pani-castrella *(Setaria spp)* Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghum halepense)* **Dicotiledoni:** Amaranto *(Amaranthus spp)* Crespigno *(Sonchus oleraceus)* Fumaria *(Fumaria officinalis)*	**Infestanti mediamente sensibili:** **Graminacee**: Panico *(Panicum spp)* Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)* **Dicotiledoni:** Camomilla *(Matricaria camomilla)* Centocchio *(Stellaria media)* Erba morella *(Solanum nigrum)* Mercurella *(Mercurialis annua)* Persicaria *(Polygonum persicaria)* Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)* Stramonio *(Datura stramonium)*	Applicare in post-emergenza del mais e delle infestanti: - mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie sviluppate - infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie - infestanti graminacee: da 2 foglie ed inizio accestimento	Trattamento unico: 1-1,5 l/ha Trattamento frazionato: 1+0,5 l/ha	-

VANTAGGI

- La speciale formulazione OD permette il rapido e completo assorbimento del Nicosulfuron da parte della pianta, garantendo una grande efficacia e selettività del prodotti senza l'aggiunta di bagnanti o additivi.

Nirvana®

Erbicida selettivo di post emergenza del mais per il controllo delle malerbe dicotiledoni e graminacee.

Nirvana® erbicida di post-emergenza del mais per il controllo di infestanti dicotiledoni e graminacee. Agisce per assorbimento fogliare e non ha attività residuale, risultando efficace solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Dicamba puro 55% Nicosulfuron puro 9,2 % Rimsulfuron 2,3%	O B B	Granuli Idrodisperdibili (WG)	 ***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 17760 del 22/12/2020



Flacone: 0,44 Kg
Cartone: 12x0,44 Kg
Pallet: 443,52 Kg

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)	PHI (gg)
MAIS (escluso MAIS DOLCE)	**Infestanti dicotiledoni sensibili** Amaranti *(Amaranthus blitoides, Amaranthus chlorostachys, Amarantus retroflexus)* Centocchio *(Stellaria media)* Erba morella *(Solanum nigrum)* Farinello *(Chenopodium album)* Persicaria *(Polygonum persicaria)* Senecione *(Senecio vulgaris)* **Infestanti graminacee sensibili** Fienarola *(Poa annua)* Giavone comune *(Echinochloa crus-galli)* Loglio italico *(Lolium multiflorum)* Pabbio *(Setaria spp.)* Sorghetta *(Sorghum halepense)*	Applicare in post-emergenza del mais (BBCH 13-19) e delle infestanti.	Trattamento unico: 440 g/ha	-

VANTAGGI

- **Nirvana®** la miscela *one-pass* di post-emergenza per il controllo completo ed efficace delle infestanti del mais.



NEW

ASCENZA®

Orbiter®

Erbicida selettivo di post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni di Frumento e Orzo e Triticale.

Orbiter® è un erbicida di post-emergenza a base di Florasulam ed attivo nei confronti di infestanti dicotiledoni già emerse. Viene assorbito attraverso le foglie ed i germogli delle infestanti in fase di accrescimento. Il principio attivo interferisce con la biosintesi degli amminoacidi determinando un arresto dello sviluppo e la conseguente clorosi seguita da disseccamento.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Florasulam 5% (50 g/l)	B2	Sospensione Concentrata (SC)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 16811 del 25/05/2021



Flaconcino : 0,5 L
Cartone: 12x0,5 L
Pallet: 510 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (ml/ha)	PHI (gg)
FRUMENTO TENERO, FRUMENTO DURO	Anagallide *(Anagallis arvensis)* Attaccamani *(Galium aparine)* Camomilla *(Matricaria spp)* Centocchi *(Stellaria media)* Papavero *(Papaver rhoeas, Papaver hybridus)* Ranuncolo *(Ranunculus arvensis)* Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)* Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*	Fra la seconda-terza foglia vera ed il primo-secondo nodo di levata	Trattamento unico 80-150	-
TRITICALE				
ORZO		Fra la seconda-terza foglia vera e la fine levata		



Pendi®40

Diserbante per il controllo di mono e dicotiledoni.

Pendi®40 è un diserbante che agisce sulla germinazione dei semi delle comuni infestanti mono e dicotiledoni.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Pendimethalin puro 38%	K1	Sospensione Concentrata (SC)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 17203 del 12/04/2018



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
MAIS	**Monocotiledoni:** Coda di volpe *(Alopecorus myosuroides)* Giavone americano *(Panicum dichotomiflorum)* Giavone comune *(Echinochloa crus-galli)* Pabbio *(Setaria spp.)* Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)* Sorghetta *(Sorghum halepense)* **Dicotiledoni:** Amaranto *(Amaranthus spp.)* Atriplice *(Atriple xspp.)* Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)* Dentaria *(Cardamineh irsuta)* Ellotropio selvatico *(Heliotropium europaeum)* Erba cipollina *(Portulaca oleracea)* Erba morella *(Solanum nigrum)* Erba storna *(Thlaspi arvenses)* Euforbia *(Euphorbia spp.)* Farinaccio selvatico *(Chenopodium album)* Fumaria spp. *(Fumaria)* Mercorella *(Mercurialis annua)* Non ti scordar di mè *(Myosotis arvensis)* Papavero *(Papaver rhoeas)* Poligono *(Polygonum spp.)* Ortica comune *(Urtica urens)* Veronica *(Veronica spp.)*	Pre-emergenza	4,4	-
GIRASOLE				
FAGIOLO, FAGIOLINO			3,3	
FAVA, FAVINO				
PISELLO			3,3-4,1	
CECE				
CAROTA			3,3	
ASPARAGO		Riposo vegetativo		28
PATATA		Pre-emergenza	4,4	-
PEPERONE		Pre-emergenza o pre-trapianto	3,3	
CAVOLFIORE		Pre-trapianto	3-3,3	
SOIA		Pre-emergenza	3	
LATTUGA E SIMILI (eccetto RUCOLA)		Pre-emergenza o pre-trapianto		75
VITE DA VINO		Riposo vegetativo	3,3	-
VITE DA TAVOLA				
MELO, PERO		Tra la raccolta e la formazione di nuovi frutti		
ALBICOCCO, NETTARINA, PESCO				
ARACHIDE		Pre-emergenza		
PIANTE ORNAMENTALI (incluso in VIVAIO)		Post-trapianto	3-3,3	
PIOPPO			2,3-3	
TABACCO		Pre-trapianto	4,4	
TAPPETI ERBOSI		Post-emergenza in autunno ed in primavera	2,6-3,3	

VANTAGGI

- Controllo delle nascite scalari dei giavoni.
- Ampia finestra applicativa.
- Perfetta selettività sulla coltura.

Plaza®

Erbicida selettivo per il mais, pomodoro e patata.

Plaza® è un erbicida selettivo non residuale di post-emergenza per mais, pomodoro e patata. É in grado di controllare efficacemente numerose graminacee annuali e perenni e diverse infestanti a foglia larga. Viene assorbito a livello fogliare e successivamente traslocato nei tessuti in accrescimento della pianta provocando l'arresto della crescita.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Rimsulfuron puro 25%	B	Granuli Idrodispersibili (WG)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 16701 del 20/07/2016



Flaconcino: 0,1 Kg
Cartone: 10x0,1 Kg
Pallet: 144 Kg

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)	PHI (gg)
MAIS	**Infestanti sensibili:** Amaranto *(Amaranthus spp.)* Centocchio comune *(Stellaria media)* Fienarola annuale *(Poa annua)* Giavane comune *(Echinochloa crus-galli)* Gramigna comune *(Elytrigia repens)* Persicaria *(Poligonum persicaria)* **Mediamente sensibili:** Camomilla *(Matricaria chamomilla)* Erba morella *(Solanum nigrum)* Farinello comune *(Chenopodium album)* Portulaca *(Portulaca oleracea)* Viperina piantaginea *(Echium plantagineum)*	Prevalenza di graminacee: Applicare in post-emergenza della coltura entro la 4ª - 5ª foglia	Trattamento unico: 50	-
		Prevalenza di infestanti a foglia larga: intervenire in post-emergenza precoce con 2 interventi a distanza di 8-15 gg	Trattamento frazionato: 30 + 20	
POMODORO		Prevalenza di Solanum nigrum: Applicare in post-trapianto della coltura entro la 3ª - 8ª foglia	Trattamento unico: 60	
		Prevalenza di infestanti ad emergenza scalare e graminacee perenni: intervenire nella fase iniziale della coltivazione con due interventi a distanza di 8-15 gg	Trattamento frazionato: 60 + 40-50	
PATATA		Quando la coltura ha raggiunto i 10-20 cm	Trattamento unico: 60	
		Prevalenza di infestanti ad emergenza scalare: intervenire a partire nella fase di sviluppo dei germogli laterali	Trattamento frazionato: 60 + 30	

VANTAGGI

- Completamente selettivo per la coltura e ha una rapida degradazione nel suolo.
- Può essere miscelato con altri erbicidi per ampliare la gamma di infestanti controllate.
- Agisce inattivando la crescita dell'infestante entro poche ore dall'applicazione (il completo disseccamento avviene in due - tre settimane).

NEW

Stonic®

Erbicida selettivo ad azione residuale di pre e post-emergenza precoce per il controllo di infestanti annuali graminacee e dicotiledoni per riso, colza e patata.

Stonic® è un erbicida residuale a base di clomazone, principio attivo che esplica la propria attività inibendo la biosintesi dei carotenoidi e bloccando la produzione di clorofilla. Il prodotto è assorbito attraverso le radici e traslocato per via xilematica in senso acropeto fino ai giovani tessuti in via di accrescimento.
Le infestanti sensibili evidenziano un progressivo sbiancamento a partire dalle foglie apicali e successivamente il disseccamento.
È attivo nei confronti di numerose specie annuali a foglia larga in fase di pre-emergenza o in post emergenza precoce dell'infestante, entro le due foglie vere di sviluppo.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Clomazone puro 34,4 (=360 g/L)	F4	Sospensione in capsule (CS)	***ATTENZIONE*** Registrazione n. 16849 del 28/10/2021



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
PATATA	**Infestanti sensibili:** **GRAMINACEE** Alopecuro (*Alopecurus spp.*), Fienarola (*Poa annua*), Giavone americano (*Panicum dicothomiflorum*), Giavone comune (*Echinocloa crus-galli*), Pabbio (*Setaria viridis*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), **DICOTILEDONI** Attaccamani (*Galium aparine*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Centocchio (*Stellaria media*), Cicuta (*Aethusa cynapium*), Correggiol (*Polygonum aviculare*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Farinello (*Chenopodium album*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), Malva (*Malva spp.*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Nappola minore (*Xanthium strumarium*), Nappola italiana (Xanthium italicum), Papavero (Papaver rhoeas), Poligono (Polygonum spp.), Rucola selvatica (Diplotaxis erucoides), Senecione (Senecio vulgaris), Sida giallognola (Sidia spinosa), Stramonio (Datura stramo-nium), Veronica comune (Veronica persica), Vilucchio (Convulvus arvensis). **Infestanti mediamente sensibili:** **DICOTILEDONI** Amaranto (Amaranthus spp.), Forbicina (Bidens spp.), Convolvolo nero (Fallopia convolvolus)	Intervenire in pre-emergenza, entro una settimana prima dell'emergenza della coltura	0,25-0,3 volume acqua: 200-400 l/ha	-
COLZA		intervenire in pre-emergenza, entro 5 giorni dalla semina	0,33 volume acqua: 200-400 l/ha	
RISO		Intervenire in post-emergenza della coltura (entro 1-2 foglie vere del riso - BBCH 11-12)	0,5-0,7 Eseguire il trattamento su risaia sgrondata con volume d'acqua tra 200-400	

NEW

Sudoku® Ultra OD

Erbicida selettivo di pre e post emergenza per il mais e il sorgo.

Sudoku® Ultra OD è un erbicida a base di sulcotrione nella innovativa formulazione in olio dispersibile (OD) di pre e post-emergenza che garantisce un ampio spettro di controllo delle infestanti dicotiledoni oltre ad una attività contro alcune graminacee. Agisce prevalentemente per assorbimento fogliare ma mostra anche un complementare assorbimento radicale.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Sulcotrione puro 25% (250 g/l)	F2	Olio Disperdibile (OD)	 ***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 16756 del 25/05/2021



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
MAIS DA FORAGGIO E DA GRANELLA	**Infestanti sensibili:** Amaranto *(Amaranthus spp)* Cencio molle *(Abutilon theophrasti)* Erba morella *(solanum nigrum)* Farinello *(Chenopodium polyspermum, Chenopodium album)* Giavone americano *(Panicum dichotomiflorum)* Giavone comune *(Echinochloa crus-galli)* Mercorella comune *(Mercurialis annua)* Stramonio *(Datura stramonium)* Senape selvatica *(Sinapis arvensis)* Poligoni *(Polygonum spp.)*	Fra la seconda-terza foglia vera ed il primo-secondo nodo di levata	Trattamento unico 80-150	-
MAIS DOLCE				
SORGO	**Infestanti moderatamente sensibili:** Digitaria *(Digitaria sanguinalis)** Cipero *(Cyperus spp.)***	Fra la seconda-terza foglia vera e la fine levata		

* *dalla nascita fino a 3 foglie vere*
** *nelle primissime fasi di sviluppo*

VANTAGGI

- L'innovativa formulazione OD garantisce, rispetto alle formulazioni tradizionali, un miglior assorbimento anche in condizioni climatiche difficili. Il prodotto si applica pertanto senza l'aggiunta i bagnante o adesivanti specifici.


ABBIAMO A CUORE
LA SALUTE DEL NOSTRO
PIANETA, PER QUESTO
ABBIAMO CREATO NUOVE
SOLUZIONI SICURE E
SOSTENIBILI.
BECAUSE WE CARE
ASCENZA®
— FARMING YOUR FUTURE —

Taisen® 800 EC

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce per il controllo delle infestanti di orzo e frumento.

Taisen®800 EC è un erbicida con ampia flessibilità d'impiego e caratterizzato da una spiccata attività nei confronti di *Galium*, *Lolium* ed altre infestanti chiave dei cereali.
Distribuito in pre-emergenza od in post-emergenza precoce della coltura, **Taisen®800 EC** viene assorbito dalle radici e dall'apice vegetativo delle infestanti in germinazione o delle plantule; la sua azione si manifesta a livello del meristema apicale, determinando un arresto della crescita ed, in seguito, la morte dei tessuti.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Prosulfocarb puro 78,9% (800 g/l)	N	Concentrato Emulsionabile (EC)	*ATTENZIONE* Registrazione n°: 17624 del 21/07/2020



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
FRUMENTO DURO	**Monocotiledoni:** Lolium sp. *(loglio)*, Poa annua *(fienarola annuale)*, Poa trivialis *(fienarola comune)* **Dicotiledoni:** Galium aparine *(attaccamani)*, Capsella bursa-pastoris *(borsa del pastore)*, Fumaria officinalis *(feccia)*, Buglossoides arvensis *(erba-perla comune)*, Descurainia sophia *(erba sofia)*, Hypecoum procumbens *(cornacchina comune)*, Papaver rhoeas *(papavero)* Veronica hederaefolia *(veronica a foglia d'edera)*, Veronica persica *(veronica comune)*	In pre-emergenza applicare su terreno ben preparato, con il seme della coltura coperto ed interrato in maniera uniforme alla profondità di almeno 3-5 centimetri. In post-emergenza precoce inpiegare fino a 30-50 giorni dalla semina (in ogni caso non oltre la seconda foglia della coltura) su piante ben radicate ed in buone condizioni, quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo.	4,5	-
FRUMENTO TENERO				
ORZO				

VANTAGGI

- **Taisen® 800 EC** applicato in pre-emergenza o in post-emergenza precoce, rappresenta la soluzione ideale per il controllo di infestanti difficili come *Lolium* e *Galium*, soprattutto in zone dove sono presenti fenomeni di resistenza. L'utilizzo da solo o in miscela con diflufenican dipende dal tipo di infestanti da controllare.
- Può essere miscelato con altri erbicidi per ampliare la gamma di infestanti controllate.
- Completamente selettivo per la coltura e ha una rapida degradazione nel suolo.



INSETTICIDI, ACARICIDI E NEMATOCIDI

Atlas®	74
Deltasap®	76
Expedient® 10 EC	78
Nemadate®	80
Pireflor® NEW	82
Stiker® Flow	84
Vasco®	86

Atlas®

Insetticida ad ampio spettro d'azione.

Atlas® è un insetticida piretroide fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed efficace sui diversi stadi di sviluppo degli insetti.
Agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione. Possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo.

COMPOSIZIONE	GRUPPO IRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Lambda-cialotrina pura 9,4 (100 g/l)	3A	Sospensione di capsule (CS)	 ***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 15433 del 22/06/2012



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE		N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
		ml/hl	ml/ha		
PESCO, NETTARINE	Afidi (foglie non accartocciate)	10-15	100-150	1	7
	Mosca della frutta	15-17,5	150-175	2 Ogni 14 gg	
ALBICOCCO	Afidi (foglie non accartocciate)	15-25	150-250	1	
	Mosca della frutta				
MELO, PERO	Afidi (foglie non accartocciate)	15	150	1	
	Carpocapsa			1-2 Ogni 14 gg	
	Psilla del pero				
NOCCIOLO	Balanino	20-25	200-250	1	
VITE DA VINO	Tignola e Tignoletta	25-30	250-300	1	21
	Cicaline	15-25	150-250	1	
VITE DA TAVOLA	Cicaline	15	150	1	
AVENA, FRUMENTO, ORZO	Afidi	15-20	150-200	1	30
MAIS	Piralide	20-25	200-250	1	28
	Afidi	15-20	150-200	1	
	Nottue	10-12,5	100-125	1	
ZUCCHINO	Afidi	10-15	100-150	1	3
POMODORO (campo)	Lepidotteri	15-20	150-200	1-2 Ogni 14 gg	3
	Afidi	10-15	100-150		
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125		
PATATA	Dorifora	15-20	150-200	1-2 Ogni 14 gg	15
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1	
CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO	Lepidotteri	15-20	150-200	1	7
	Afidi	10-15	100-150		
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125		
FLOREALI ED ORNAMENTALI	Afidi	10-15	100-150	1	-

VANTAGGI

- La formulazione microincapsulata di **Atlas®** assicura elevata efficacia e persistenza garantendo la massima sicurezza per l'utilizzatore.
- Unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva.

Deltasap®

Insetticida ad ampio spettro d'azione a base di deltametrina.

Deltasap® è dotato di un elevato potere abbattente e di una rapida azione iniziale. Permette di proteggere le colture in modo duraturo e con una grande sicurezza di impiego. Selettivo per la coltura. Breve tempo di carenza su numerose colture.

COMPOSIZIONE	GRUPPO IRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Deltametrina pura 2,8% (25 g/l)	3A	Concentrato Emulsionabile (EC)	 ***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 15042 del 10/05/2012



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE ml/hl	DOSE ml/ha	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
MELO, PERO	Afide verde del melo	30-50	0,3-0,7	3 Ogni 14 gg	7
	Cydia pomonella				
	Afidi della frutta				
	Lepidotteri				
	Coleotteri				
	Psilla	75	1		
PESCO, ALBICOCCO	Afide verde del melo	30-50	0,3-0,7		3
	Cydia pomonella				
	Afidi della frutta				
	Lepidotteri				
	Coleotteri				
	Psilla	75	1		
SUSINO, CILIEGIO	Afide verde del melo	30-50	0,3-0,7		7
	Cydia pomonella				
	Afidi della frutta				
	Lepidotteri				
	Coleotteri				
	Psilla	75	1		
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Tignole	40-60	0,4-0,7		3
	Cicaline	30-50	0,3-0,6		
OLIVO DA OLIO OLIVO DA TAVOLA	Tignola dell'olivo Mosca dell'olivo	40-60	0,4-0,9		7
CAVOLFIORE, BROCCOLO, CAVOLI A TESTA (campo)	Lepidotteri	30-50	0,3-0,5	2 Ogni 14 gg	
	Cavolaia				
	Nottue				
	Afidi	50	0,5		
ZUCCHINO (campo)	Dorifora	15-20	150-200	3 Ogni 14 gg	3
	Lepidotteri	10-12,5	100-125		
	Cavolaia	15-20	150-200		
	Nottue	10-15	100-150		
PATATA (campo)	Dorifora	15-20	150-200		7
	Lepidotteri	10-12,5	100-125		
	Cavolaia	15-20	150-200		
	Nottue	10-15	100-150		
LATTUGHE E INSALATE (*) (campo e serra)	Lepidotteri	30-50	0,3-0,5	3 (campo) - Ogni 14 gg 2 (serra) - Ogni 7 gg	3 (campo) 7 (serra)
	Cavolaia				
	Nottue				
	Afidi	50	0,5		
POMODORO (campo e serra)	Lepidotteri	30-50	0,3-0,5	3 (campo) - Ogni 14 gg 2 (serra) - Ogni 7 gg	3
	Cavolaia				
	Nottue				
	Afidi	50	0,5		
MAIS	Nottue	-	0,3	3 tratt. Primavera-Estate Ogni 14 gg Ogni 14 gg	
	Piralide	-	0,5		
	Diabrotica				
CEREALI (**)	Lepidotteri	-	0,3		30
NOCCIOLO	Afidi	50	0,5	3 Ogni 14 gg	3
ORNAMENTALI (Campo)	Afidi				-

(*) Esclusa scarola e baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia; (**) Escluso riso. Non è miscibile con prodotti a reazione acida/alcalina.

VANTAGGI

- **Deltasap®** è dotato di un elevato potere abbattente e di una rapida azione iniziale.
- Permette di proteggere le colture in modo duraturo e con una grande sicurezza di impiego.
- Selettivo per le colture riportate in etichetta.
- Breve intervallo di carenza su numerose colture.

Expedient® 10 EC

Insetticida specifico per la lotta delle cocciniglie e mosche bianche.

Expedient® 10 EC è un prodotto ovo-larvicida con azione indiretta sugli adulti.
È un prodotto analogo dell'ormone giovanile (JHM) attivo principalmente contro le specie appartenenti all'ordine dei *Rhynchota*.

COMPOSIZIONE	GRUPPO IRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Pyriproxyfen puro 10% (100 g/l)	7C	Concentrato Emulsionabile (EC)	 ***PERICOLO*** Registrazione n°: 16420 del 16/06/2016



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (mL/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
MELO, PERO	Cocciniglia di San Josè *(Quadraspidiotus perniciosus)*	40-50 (max 0,5 l/ha)	Intervenire a inizio primavera in pre-fioritura sulle forme giovanili svernanti	1	-
PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO					-
AGRUMI	Cocciniglie *(Aspidiotus neri, Parlatoria pergandei, Lepidosaphes spp., Saissetia olae, Aonidiella aurantii)*	50-75 (max 1,25 l/ha)	Intervenire alla comparsa delle prime forme larvali, preferibilmente della prima generazione		30
POMODORO (serra)	Mosca bianca *(Bamisia tabaci, traleurourodes vaporarorium)*		Intervenire alla comparsa delle primissime frome adulte	2	30

VANTAGGI

- È caratterizzato da una lunga durata d'azione prolungando l'attività di protezione.
- Svolge un'azione indiretta sugli stadi adulti provocando una riduzione della fertilità.

Nemadate®

Nematodicida liquido soluibile in acqua.

Nemadate® esplica un'azione sistemica ed efficace contro i nematodi galligeni *Meloidogyne* e *Ditylenchus* spp. Utile nel contenimento di altri insetti quali aleurodidi, Lyriomiza e Tuta absoluta.

COMPOSIZIONE	GRUPPO IRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Oxamyl puro g 9,62% (100 g/l)	1A	Liquido Solubile (SL)	 ***PERICOLO*** Registrazione n°: 16088 del 24/12/2015



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L



Tanica: 10 L
Pallet: 500 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
POMODORO (serra)	Nematodi galligeni *Meloidogyne spp* e *Ditylenchus spp*	10		3 Ogni 20 gg	21
PEPERONE (serra)					
MELENZANA (serra)					
CETRIOLO (serra)					
CETRIOLINO (serra)					
ZUCCHINO (serra)					

VANTAGGI

- **Nemadate®** è rispettoso dell'ambiente in quanto non percola nelle acque di falda e non si accumula nel terreno, grazie al fatto che si decompone completamente in anidride carbonica e acqua.
- Non è dannoso per i nematodi entomopatogeni.
- La sua sostanza attiva incentiva il vigorio vegetativo.

NEW

Pireflor®

Insetticida specifico per la lotta delle cocciniglie e mosche bianche.

Pireflor® è un insetticida di contatto a base di piretrine naturali estratte dai capolini fiorali di *Chrysanthemum cinerarifolium*.
Autorizzato su un ampio spettro di colture, può essere impiegato in qualsiasi stagione.

COMPOSIZIONE	GRUPPO IRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Piretrine pure 2% (18,61 g/l)	3 A	Concentrato Emulsionabile (EC)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 10158 del 20/09/1999



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 380 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 480 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE MAX DI IMPIEGO		N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
		l/ha	mL/hl Volume di acqua (l/ha)		
ARANCIO, MANDARINO, LIMONE	Afidi Mosca bianca *(Aleurodidi)*	2,4	160 ml/hl fino a 1500 l/ha	3 Ogni 7 gg	1
MELO, PERO	Afidi *(Aphis pomi)*				
PESCO, PRUGNO, CILIEGIO, ALBICOCCO	Afidi *(Myzus persicae)* Drosophyla suzukii				7
VITE DA VINO* VITE DA TAVOLA*	Tignola *(Clysia ambiguella)* Tignoletta *(Lobesia botrana)* Cicaline *(Scaphoideus titanus, Empoasca vitis)*				1
FRAGOLA (campo)	Tripidi Drosophyla suzukii	1,6	160 ml/hl fino a 1000 l/ha		2
LAMPONE, MIRTILLO, MORA	Drosophyla suzukii	1,28	160 ml/hl fino a 800 l/ha		
RIBES (campo)					
ORTAGGI A FOGLIA ERBE FRESCHE FIORI COMMESTIBILI (campo e serra)**	Afidi				1
PATATA	Dorifora *(Leptinotarsa decemlienata)*	0,96	160 ml/hl fino a 600l/ha		0
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA (campo e serra)	Mosca bianca *(aleurodidi)* Tripidi	1,92	160 ml/hl fino a 1200l/ha		1
ZUCCHINO	Afidi	1,28	160 ml/hl fino a 800 l/ha		
MELONE (campo)					
FLOREALI E ORNAMENTALI (campo e sera)	Afidi Tripidi Mosca bianca *(Aleurodidi)*	1,6	160 ml/hl fino a 1000 l/ha	2 Ogni 7 gg	n.r.

* *In caso di presenza di Flavescenza dorata, valutare se ripetere il trattamento in funzione del monitoraggio di Scaphoideus titanus*

** *Lattughe e insalate (Dolcetta/valerianella/gallinella, Lattughe, Scarola/indivia a foglie larghe, Crescione e altri germogli e gemme, Barbarea, Rucola, Senape juncea, Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), Foglie di spinaci e simili (Spinaci, Portulaca/porcellana, Bietole da foglia e da costa), Foglie di vite e specie simili, Crescione acquatico, Cicoria Witloof/cicoria belga, Erbe fresche e fiori commestibili (Cerfoglio, Erba cipollina, Foglie di sedano, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico e fiori commestibili, Foglie di alloro/lauro, Dragoncello, Altri)"*

VANTAGGI

- Sostanza attiva di derivazione naturale.
- Ampio spettro d'azione.
- Ridotti tempi di carenza.
- **Consentito l'impiego in Agricoltura Biologica ai sensi della normativa vigente.**

Stiker® Flow

Acaricida ovo-larvicida per la lotta contro gli acari.

Sticker® Flow possiede un'azione translaminare e agisce sulle uova e sulle larve nei vari stadi di sviluppo dei Ragnetti rossi (es. *Panonychus citri*, *Tetranychus urticae*) e di quelli gialli (es. *Eotetranychus carpini*).
Riduce la capacità riproduttiva delle femmine evitando l'insorgenza di nuove popolazioni.

COMPOSIZIONE	GRUPPO IRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Exitiazox puro 24% (258,7 g/l)	10A	Sospensione Concentrata (SC)	Registrazione n°: 16083 del 21/05/2014



Flaconcino: 0,25 L
Cartone: 24x0,25 L
Pallet: 480 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (ml/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
POMELO, TANGELO, POMPELMO, UGLI, ARANCIO, BERGAMOTTO, ARANCIO AMARO, CHINOTTO, LIMONE, LIMETTA, MANDARINO, CLEMENTINA, TANGERINO, MINEOLA	Ragnetto rosso *(Tetranychus urticae, Panonychus citri)* Ragnetto giallo *(Eotetranychus carpini)*	4-6 (max 40-150 ml/ha)	Intervenire all'inizio dell'infestazione	1	14
VITE DA VINO	Ragnetto rosso (Tetranychus urticae)	20-30 (max 100-300 ml/ha)			21
VITE DA TAVOLA					
MELO, PERO, NASHI, COTOGNO, NESPOLO		20-30 (max 160-300 ml/ha)			28
FLOREALI E ORNAMENTALI (campo e serra)		20 (max 100-200 ml/ha)			-

VANTAGGI

- Lunga persistenza d'azione.
- Selettivo nei confronti degli insetti utili.

Vasco®

Insetticida-acaricida liquido a base di Abamectina autorizzato su un ampio spettro di colture.

Vasco® è un insetticida-acaricida di derivazione naturale che agisce per contatto e ingestione. Penetra rapidamente con movimento translaminare formando una riserva attiva il cui deposito superficiale (prodotto non assorbito) si degrada alla luce solare quindi non interferisce con gli insetti utili. Persiste all'interno della vegetazione prolungando il periodo utile di attività.
Controlla i parassiti su entrambe le pagine fogliari ed è attivo contro acari, eriofidi, minatrici, psilla.

COMPOSIZIONE	GRUPPO IRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Abamectina pura 1,89% (18 g/l)	3 A	Concentrato Emulsionabile (EC)	 ***PERICOLO*** Registrazione n°: 16492 del 24/11/2015



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE ml/hl	DOSE l/ha	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
ARANCIO, MANDARINO, CLEMENTINO, LIMONE	Minatrice serpentina *(Phyllocnistis citrella)*	40	0,3-0,8	Alla comparsa delle prime mine sui getti nuovi in formazione	1-3 Ogni 7 gg	10
	Ragnetti rossi *(Tetranychus urticae, Panonychus citri, Aceria sheldoni)*		0,4-0,8	Alla comparsa delle prime forme mobili dall'allegagione all'ingrossamento del frutto		
MELO	Ragnetti rossi *(Tetranychus urticae, Panonychus ulmi)*	80	0,6-0,96	Da fine caduta dei fitofagi	1-2 Ogni 15 gg	3
PERO	Psylla *(Psylla spp.)*	50-100	0,375-1,2	A fine caduta petali o nelle generazioni successive alla comparsa delle prime neanidi.		
	Ragnetti rossi *(Tetranychus urticae, Panonychus ulmi)*	80	0,6-0,96			
PESCO	Ragnetti rossi *(Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Bryobia rubricolus)*	50-100	0,5-1,2	A fine caduta petali alla comparsa delle prime forme mobili	-	14
VITE DA VINO	Ragnetti rossi *(Tetranychus urticae)*		0,25-1	Alla comparsa delle prime forme mobili	Non trattare durante la fioritura	10
VITE DA TAVOLA			0,5-1,2			
POMODORO (campo e serra)	Ragnetti rossi *(Tetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus)*		0,15-1		1-3 Ogni 7 gg	3
	Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)*			Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione		
POMODORO (serra)	Eriofide *(Aculus lycopersici)*			Alla comparsa delle prime forme mobili		
MELANZANA (campo e serra)	Ragnetto rosso *(Tetranychus urticae)*	50-80	0,15-0,8			
MELONE, ZUCCA, COCOMERO* (campo e serra) CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO* (serra)	Ragnetto rosso *(Tetranychus urticae)*	50-100	0,15-1		1-2 Ogni 7 gg	3 serra 5 campo
	Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)*			Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione		3
FRAGOLA* (serra)	Ragnetti rossi e gialli *(Tetranychus urticae, Phytonemus pallidus)*			Alla comparsa delle prime forme mobili		3
	Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)*			Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione		
LATTUGHE e INSALATE** (pieno campo) JUNCEA	Ragnetti rossi *(Tetranychus spp., Polyphagotarsonemus latus)*			Alla comparsa delle prime forme mobili	1-3 Ogni 7 gg	7
	Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)*			Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione		
MAIS	Ragnetti rossi *(Panonychus ulmi, Tetranychus urticae)*	100	0,3-0,4	Alla comparsa delle prime forme mobili fino alla fase di 6° foglia distesa	1	-

** Non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio*
*** Escluse Crescione ed altri germogli e gemme, Barbarea, Rucola, Senape juncea*

VANTAGGI

- Ampio spettro d'azione
- Nessuna resistenza incrociata con altri insetticidi e acricidi
- Compatibile con altri prodotti in miscela.
- Rispetta insetti pronubi, antocoridi e fitoseidi.
- Ridotti tempi di carenza su pero, melo , melanzana, fragola, lattughe, vite e pomodoro.


COADIUVANTI

Pottok® 90

Pottok®

Coaudivante per l'applicazione di erbicidi.

Pottok® è un coaudivante specificatamente indicato per l'impiego in associazione con erbicidi solfonilureici. Sviluppato e testato insieme all'erbicida **Plaza®** ne potenzia l'effetto mantenendo un ampia selettività.

COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Alcool grasso alcossilato 99,8%	Liquido Solubile (SL)	*ATTENZIONE* Registrazione n°: 16131 del 15/09/2016



Flacone: 0,4 L
Cartone: 12x0,44 L
Pallet: 408L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
MAIS	Come coaudivante di Plaza®	0,2	-	-	-
PATATA					
POMODORO					

VANTAGGI

- **Pottok®** incrementa l'adesività del prodotto e l'assorbimento del prodotto all'interno delle infestanti, incrementandone l'efficacia erbicida.


blexia®
BioProtection by ASCENZA

blexia®
BioProtection by ASCENZA

TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA blexia® SONO AUTORIZZATI IN BIO

Carpet®	94
Doctrin® NEW	96
Equiset®	98
PREV-AM® PLUS NEW	100
Prevatec®	104
Valesco®	106

Carpet®

Idrogeno carbonato di sodio per il controllo dell'oidio della vite e delle orticole.

Carpet® è una sostanza di base autorizzata ai sensi dell'art.23 del Reg. (CE) 1107/2009. Quando entra a contatto con le ife e le spore dei funghi patogeni ne provoca il disseccamento per azione osmotica, impedendone la crescita e limitando l'infezione sulla pianta. Inoltre, per il suo carattere alcalino, provoca un cambiamento di pH sulla superficie della pianta che blocca lo sviluppo di funghi.

COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE
Idrogeno Carbonato di sodio 990 g/Kg	Polvere Solubile (SP)



Sacco: 5 kg
Cartone: 4x5 kg
Pallet: 1.000 kg

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (g/hl)	VOLUME ACQUA (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
ORTICOLE (campo e serra)	Oidio *(Oidium spp., Sphaerotheca spp)*	333-1000 (max 5 Kg/ha)	300-600	BBCH 12 - 89	1 - 8 applicazioni fogliari* ogni 10 gg	1
PICCOLI FRUTTI (Fragole, frutti di bosco e altri piccoli frutti e bacche) (campo e serra)						
ORNAMENTALI (campo e serra)						
VITE	Oidio *(Uncinula necator)*	420-2000 (max 5 Kg/ha)	200-600			
MELO	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis)*	500-1000 (Max 5 kg/ha)	500-1000	BBCH 10 - 85		
ARANCIO, CILIEGIO, MELO, PAPAYA (campo e serra)	Muffa azzurra *(Penicillium italicum)* e muffa verde *(Penicillium digitatum)*	1 - 4 kg/hl	-	Sul raccolto	Trattamento per immersione o superficiale. 1 o 2 applicazioni ogni 10 giorni	

* *Applicazioni su larga scala: Concentrazioni superiori all'1%-2% possono causare sintomi di fitotossicità. Ciascuna colura può manifestare una sensibilità diversa. Si consiglia di effettuare saggi preliminari prima di trattare l'intera superficie.*

VANTAGGI

- **CARPET®** crea un ambiente alcalino sfavorevole allo sviluppo dei funghi patogeni.
- Non penetra nella cuticola vegetale e non lascia residui.
- Può essere impiegato da solo o in strategia e/o in miscela con i tradizionali fungicidi.
- Ammesso in agricoltura biologica ed integrata
- Nessuna fitotossicità.

NEW

Doctrin®

Insetticida biologico a base di *Bacillus Thuringiensis* var. *Kurstaki*.

Doctrin® è un insetticida che agisce sulle larve dei lepidotteri. Poche ore dopo l'ingestione del prodotto, gli individui interrompono l'attività trofica.
Per una efficace azione si raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

COMPOSIZIONE	GRUPPO IRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Bacillus thuringiensis var. kurstaki ceppi PB-54 16%	11A	Polvere Bagnabile	NC Registrazione n°: 13256 del 30/04/2006



Sacco: 1 kg
Cartone: 20x1 kg
Pallet: 500 kg

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE g/hl	DOSE Kg/ha	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
AGRUMI	Tignola degli agrumi (*Prays citri*) Tortricidi ricamatori (*Cacoecia rosana*)	35-125		2 Ogni 7-14 gg	
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	*Lobesia Botrna* *Eupocilia ambiguella*	50-200		3 Ogni 7-14 gg	
POMODORO (campo e serra)	Nottuidi (*Helicoverpa* spp., *Plusia* spp., *Spodoptera* spp) Tignola del pomodoro (*Tuta absoluta*)				
PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO ZUCCHINO (in campo e serra) LATTUGHE ED ALTRE INSALATE (INCLUSE LE BRASSICACEE) CARCIOFO SPINACI E SIMILI (campo)	Nottuidi (*Helicoverpa* spp., *Plusia* spp., *Spodoptera* spp.)				
CAVOLI	Cavolaia (*Pieris brassicae*) Tignola (*Plutella xylostella*) Nottuidi (*Helicoverpa* spp., *Plusia* spp., *Spodoptera* spp.)		0,5-1		
ACTINIDIA	Eulia (*Argyrotaenia pulchellana*)			2 Ogni 7-14 gg	3
OLIVO DA OLIO OLIVO DA TAVOLA	Tignola dell'olivo (*Prays oleae*)	35-125			
DRUPACEE	Cidia (*Cydia molesta*) Tignola (*Hyponomeuta malinellus*) Lepidotteri defogliatori (*Malacosoma neustria, Anarsia lineatella, Orgya* spp., etc.) Tortricidi (*Archips rosanus*)				
POMACEE	Carpocapsa (*Carpocapsa pomonella*) Tignola (*Hyponomeuta malinellus*) Lepidotteri defogliatori (*Malacosoma neustria, Orgya* spp., etc.) Tortricidi (*Archips rosanus, Archips podanus*)				
FRAGOLA (campo e serra)	Nottuidi (*Helicoverpa* spp., *Plusia* spp., *Spodoptera* spp.)	50-200			
FRUTTIFERI A GUSCIO	Tignola (*Anarsia lineatella*) Tortricidi (*Archips rosanus, Archips podanus*) *Aglaope infausta*	35-125			
COTONE	Nottuidi (*Helicoverpa armigera, Plusia* spp.) Verme rosso del cotone (*Pectinophora gossypiella*)	50-200			
FORESTALI	Lepidotteri defogliatori	35-125		3 ogni 7-14 gg	
FLOREALI E ORNAMENTALI		50-200			

VANTAGGI

- **Doctrin®** è selettivo nei confronti degli insetti utili.
- **Consentito l'impiego in Agricoltura Biologica ai sensi della normativa vigente.**

Equiset®

Estratto di Equiseto per il controllo della peronospora della vite e delle orticole

Equiset®, è una sostanza di base autorizzata ai sensi dell'art.23 del Reg. (CE) 1107/2009. Possiede effetto elicitore che stimola le difese naturali della pianta ed interviene nel controllo degli agenti patogeni.

COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE
Equisetum arvense 0,2%	Concentrato Dispersibile (DC)



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 792 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 1000 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (ml/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
MELO, PESCO	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis)*	300-500	Applicazioni estive Dalla comparsa dei mazzetti fiorali alla caduta dei fiori (BBCH 53-67)	2-6 applicazioni fogliari Ogni 7 giorni	Non previsto
	Oidio *(Podosphaera leucotricha)*				
	Bolla *(Taphrina deformans)*				
VITE	Peronospora *(Plasmopara viticola)*		Applicazioni primaverili-estive Dal primo sviluppo fogliare fino al completo sviluppo delle infiorescenze (BBCH 10-77)		
	Oidio *(Erysiphe necator)*				
CETRIOLO	Oidio *(Podosphaera xanthii)*		Da stadio di 9 foglie sullo stelo principale fino a 9 o più germogli laterali visibili (BBCH 19-49)	2 applicazioni fogliari Ogni 3-4 giorni	15
	Funghi del suolo *(Pythium spp.)*				
POMODORO	Alternaria *(Alternaria solani)*		Applicazioni estive durante l'emergenza fiorale (BBCH 51-59)	2 applicazioni fogliari Ogni 14 giorni	
	Septoria *(Septoria lycopersici)*				
FRAGOLA, LAMPONE	Botrite *(Botrytis cinerea)* Oidio *(Podosphaera aphanis)* Peronospora *(Phytophthora fragariae)* altri funghi come Colletotrichum acuatum		Applicazioni primaverili-estive Dalla ripresa dello sviluppo vegetativo (BBCH 1) fino alla maturazione dei frutti (BBCH 89)	4-8 applicazioni fogliari ogni 5-14 giorni	Non previsto
PATATA	Peronospora *(Phytophthora infestans)*		BBCH 10-90	4-8 applicazioni fogliari ogni 5-14 giorni	
	Marciume nero *(Alternaria solani)*				
	Oidio *(Erysiphe cichoracearum)*				

* *Scegliere l'appropriato volume di distribuzione per applicare il prodotto in modo uniforme sull'intera superficie fogliare. In caso di basso volume di impiego utilizzare l'equivalente di prodotto per un volume di 1000 l/ha.*

VANTAGGI

- Contribuisce al controllo della peronospora se inserito in miscela e/o in strategia a prodotti fitosanitari specifi.
- Impiego autorizzato in agricoltura integrata e biologica.
- In strategia con il rame ne migliora le performance e permette il rispetto delle dosi autorizzate anno/ettaro.

PREV-AM
PLUS

Insetticida-Fungicida- Acaricida polivalente multi colture.

PREV-AM®PLUS è un insetticida-fungicida-acaricidache agisce per contatto con un modo d'azione fisico. Provoca il disseccamento della cuticola degli insetti con esoscheletro molle, durante le fasi sia giovanili che adulte, quali mosche bianche, tripidi, cicaline ed inoltre delle pareti cellulari degli organi esterni (micelio, conidi, cleistoteci, ecc.) delle malattie fungine.

COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Olio essenziale di arancio dolce 5,88% (60 g/l)	Liquido Solubile (SL)	***ATTENZIONE*** Registrazione n°: 16379 del 12/05/2015

PREV-AM è un marchio registrato **Oro Agri International Ltd.**


Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L


Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L


Tanica: 10 L
Pallet: 600 L

Visita la pagina prodotto!

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE l/ha	DOSE (mL/hl)	VOLUME ACQUA (l/ha)	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Oidio (*Uncinula necator*)	1,6	800	200	-	3
	Peronospora con sporulazione in atto (*Plasmopara viticola*) Tripidi (*Drepanothrips reuteri*) Cicaline (*Empoasca vitis,Scaphoideus titanus* ecc.)					
	Erinosi (*Colomerus vitis*)	2	1000	200	2	
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE (campo e serra)	Aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*)	2	400	500	6	
	Tripidi (*Thrips spp.* ecc.)	4	800	500		
CAROTA (campo e serra)	Oidio (*Erysiphe heraclei*)	2,4	600	400		
CETRIOLO (campo e serra)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*) Tripidi (*Thrips spp.* ecc.)	8	800	1000	3	
	Aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum* ecc.)	4	400	1000		
ZUCCHINO (campo e serra)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerothecafuliginea*)	4	800	500		
	Aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum* ecc.)	2	400	500		

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE l/ha	DOSE (mL/hl)	VOLUME ACQUA (l/ha)	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
CETRIOLINO (campo e serra)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerothecafuliginea*)	4	800	500	6	3
	Aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum* ecc.)	2	400	500		
MELONE (campo e serra)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*) Tripidi (*Thrips spp.* ecc)	8	800	1000	3	
	Aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum* ecc.)	2	400	500		
LATTUGA (campo e serra)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum*) Peronospora(*Bremia lactucae*)	3	600	500		
	Aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*)	2	400	500		
PORRO	*Tripidi (Thrips tabaci)*	6,4	800	800	4	
CAVOLI A INFIORESCENZA CAVOLI A TESTA CAVOLO RAPA (campo e serra)	*Aleurodidi (Aleyrodes brassicae, Aleyrodes proletella, ecc.)*	2	400	500	6	
	Tripidi (*Thrips spp.* ecc.)	4	800	500		
CAVOLI A FOGLIA	Ruggine bianca (Albugo candida	2	500	400		
FAGIOLO, PISELLO, CECE, LENTICCHIA, FAVA	Tripidi (*Thrips spp.* ecc.)	4	800	500	6	
CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO	Tripidi (*Thrips tabaci* ecc.)	3,2	800	400		
VALERIANELLA, PREZZEMOLO (campo e serra)	Oidio (*Erysiphe sp.*)	1,8	600	300		
SCAROLA RICCIA (campo e serra)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum*)	3	600	500		
SCORZONERA BARBA DI BECCO	*Oidio (Erysiphe cichoracearum)*	3	600	500		
RAVANELLO	Peronospora (*Peronospora parasiticae*)	3,2	400	800		
TABACCO	Oidio (*Erysiphe spp.*) Peronospora (Peronospora tabacina)	3	600	500		
	Aleurodidi (*Bemisia tabaci*)	2	400	500		
	Tripidi (*Thrips tabaci* ecc.)	3,2	800	400		
RIBES, LAMPONE	Oidio (*Sphaerotheca spp.*) Cicaline (*Metcalfa pruinosa* ecc.) Psilla e Cercopidi	2,4	800	300	-	
	Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae* ecc.) ed Eriofidi	2	1000	200	2	

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE l/ha	DOSE (ml/hl)	VOLUME ACQUA (l/ha)	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
MORA, UVA SPINA	Oidio (*Sphaerotheca spp.*) Cicaline (*Metcalfa pruinosa* ecc.) Psilla e Cercopidi	2,4	800	300	6	3
	Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae* ecc.) ed Eriofidi	2	1000	200		
FRAGOLA	Oidio (*Sphaerotheca spp.*)	3	600	500		
	Tripidi (*Frankliniella occidentalis* ecc.)	4	800	500		
MELO, PERO, COTOGNO	Psille del melo (*Cacopsylla mali*) Cicaline e Cercopidi	4	800	500		
	Psilla del pero (*Psylla pyri* ecc.) Oidio (*Podosphaera leucotricha*)	2,8	400	700		
	Ticchiolatura (*Venturia inaeaqualis, Venturia pyrina*)	3	250/300	1000		
PESCO	Cicaline (*Empoasca spp., Metcalfa pruinosa*) Cercopidi (*Cercopis spp.*)	6	600	1000	4	
ACTINIDIA	Cicaline (*Empoasca spp., Metcalfa pruinosa*) Cercopidi (*Cercopis spp.*)	8	800	1000	3	
AGRUMI (arancio, limone, pompelmo, mandarino, clementino, cedro, bergamotto, chinotto, kumquat, limetta, lime)	Cicaline (*Empoasca spp.*, ecc.), Cercopidi (*Cercopis spp.*), Psilla (*Psylla citrus*), Cocciniglie (*Aonidiella auranti* ecc.), Aleurodidi (*Aleurocantus spinferus*), Tripidi (*Heliothrips spp.*)	8	800	100	3	
	Acari (*Panonychus citri, Tetranychus urticae* ecc.)	6	600	1000		
ANANAS	Cocciniglie (*Diaspis bromelia* ecc.)	8	800	1000	6	
AVOCADO	Cocciniglie, Aleurododi, Tripidi	0,8	800	100		
	Tigre (*Pseudacysta perseae*)	1	1000	100		
BANANO	Aleurodidi, Cocciniglie, Tripidi	2	800	250		
FRUTTO della PASSIONE	Acari, Cocciniglie, Tripidi	8	800	1000		
GUAIAVE	Aleurodidi	8	800	1000		
MANGO	Aleurodidi, Cocciniglie, Oidio, Tripidi	8	800	1000		
PALME alimentari	Aleurododi	8	800	1000		
PAPAYA	Acari, Cocciniglie, Oidio	8	800	1000		
LUPPOLO	Oidio	6	600	1000		
PIANTE OFFICINALI da INFUSIONE	Malattie fungine	3	600	500		
CRISANTEMO	Ruggine bianca (*Puccinia oriana*)	10	1000	1000	3	
FLOREALI ed ORNAMENTALI	Oidio	6	600	1000	4	
	Tripidi	6,4	800	800		
	Aleurodidi	4	400	1000		

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE		VOLUME ACQUA	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
		l/ha	(mL/hl)	(l/ha)		
ROSA	Oidio (*Sphaerotheca pannosa*)	6	600	1000	4	3
	Aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*)	4	400	1000		
	Tripidi	8	800	1000		
ALBERI ed ARBUSTI ornamentali	Oidio (*Sphaerotheca pannosa*)	6	600	1000	6	
	Tripidi (*Thrips spp.*)	6,4	800	800		
	Cicaline, Psille, Cimici	8	800	1000		
GENZIANA, DRAGONCELLO	Oidio (*Sphaerothecapannosa*)	3	600	500		

VANTAGGI

- **Ammesso in agricoltura biologica ai sensi della normativa vigente.**
- Rapido ed efficace in tutte le condizioni.
- Ideale per le strategie integrate e anti-resistenza.



Prevatect®

Chitosano cloroidrato per il controllo della Botrite della vite e delle orticole.

Prevatect®, è una sostanza di base autorizzata ai sensi dell'art.23 del Reg. (CE) 1107/2009.
Il preparato è una soluzione acquosa a base di Chitosano cloridrato (50 g/L), sostanza ottenuta dalla chitina dell'esoscheletro di crostacei e molluschi.
Il Chitosano cloroidrato possiede è un elicitore naturale che stimola i meccanismi naturali di difesa della pianta nei confronti di funghi e batteri patogeni.

COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE
Chitosano cloroidrato 50 g/l	Concentrato solubile (SL)



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 792 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 1000 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/ha)	TIPO DI APPLICAZIONE	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE, FRAGOLA, FRUTTI DI BOSCO E ALTRE BACCHE E PICCOLI FRUTTI	Batteri e funghi patogeni	2-4	Applicazioni spray a basso-medio volume	Dallo sviluppo fogliare (1-7 foglie sul germoglio principale) allo sviluppo del frutto	4 – 8 ogni 14 gg	0
ORTICOLE						
CEREALI						
SPEZIE						
FORAGGERE						
CEREALI - TRATTAMENTO DELLE SEMENTI		1-2	Applicazioni spray a basso volume	Pre semina	1	
PATATE - TRATTAMENTO DELLE SEMENTI			Applicazioni spray a basso volume/dipping			
BARBABIETOLA - TRATTAMENTO DELLE SEMENTI		1-4	Applicazioni spray a basso dipping/drencing			
ORNAMENALI A BULBO		2-4	Applicazioni spray a basso-medio volume	Germinazione (BBCH 00-01)	1	
COLTIVAZIONI DI BARBABIETOLE			Applicazioni spray a basso-medio volume	Sviluppo Vegetativo - Senescenza (BBCH 10-92)	1-8 ogni 5-7 gg	

VANTAGGI

- **Ammesso in agricoltura biologica ai sensi della normativa vigente.**

Valesco®

Estratto di ortica per il controllo di afidi e acari su frutticole e orticole.

Valesco®, è una sostanza di base autorizzata ai sensi dell'art.23 del Reg. (CE) 1107/2009.
La formulazione commerciale è un Concentrato Dispersibile (DC) a base di estratto di ortica (15 g/L).
Rappresenta una soluzione ottimale per il controllo afidi e acari di diverse colture di interesse.

COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE
15 g/l Urtica spp	Concentrato Dispersibile (DC)



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 792 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 1000 L

Visita la pagina prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

CONTROLLO DI INSETTI (pieno campo)					
COLTURA	AVVERSITÀ	Dose (ml/l)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
MELO PRUGNO PESCO NOCE CILIEGIO RIBES	Afide verde *(Myzus persicae, Macrosiphum rosae)* Afide del melo *(Eriosoma Lanigerum)* Afide del ribes *(Cryptomyzus ribis)* Afide del noce *(Callaphis juglandis)* Afide nero del ciliegio *(Myzus cerasi)*	4-5	Dalla primavera fino a maturazione dei frutti (BBCH 87)"	1-5 applicazioni fogliari ogni 7-15 gg	7
FAGIOLI	Afide del fagiolo nero *(Aphis fabae)*		Dalla primavera fino alla completa maturazione (BBCH 89)"		
PATATA	Afide verde *(Myzus persicae)*		Dalla primavera fino alla completa formazione tuberi (BBCH 49)		
LATTUGA, CAVOLO	Afidi, ad esempio: Afide del cavolo *(Brevicoryne brassicae, Nazonovia ribisnigri)*		Primavera-estate		
SAMBUCO	Afide del sambuco *(Aphis sambuci)*				
ROSA	Afide della rosa *(Macrosyphum rosae)*				
SPIRAEA SP.	Aphis spiraephaga				
CAVOLO, COLZA, RAVANELLO	*(Phyllotreta nemorum)*		Dalla primavera fino allo stadio di 9 o più foglie vere (BBCH 19)	1-6 applicazioni fogliari ogni di 7-15 giorni	
	Falena del cavolo *(Plutella xylostella)*		Dalla primavera fino a massa fogliare tipica raggiunta (BBCH 49)		
MELO, PERO	Carpocapsa del melo *(Cydia pomonella)*		2 trattamenti ad aprile 1 trattamento a maggio	3 applicazioni fogliari ogni 15 giorni	

CONTROLLO DI ACARI (pieno campo)					
COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (ml/l)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
FAGIOLI	Ragnetto rosso *(Tetranychus urticae)*	4-5	Dalla primavera fino a completa maturazione (BBCH 89)	1-6 applicazioni fogliari (normalmente 3) ogni 7-21 giorni, normalmente 2-3 settimane	7
VITE	Ragnetto rosso *(Tetranychus urticae, Tetranychus telarius)*		Dalla primavera fino a maturazione dei frutti (BBCH 89)	1-6 applicazioni fogliari (3 prima della fioritura e 3 dopo la fioritura) ogni 7-21 giorni, normalmente 2-3 settimane	

** Scegliere l'appropriato volume di distribuzione per applicare la sostanza in modo uniforme sull'intera superficie fogliare. In caso di basso volume di impiego utilizzare l'equivalente di estratto d'ortica per un volume di 1000 l/ha.*

CONTROLLO DI FUNGHI (pieno campo)					
COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (ml/l)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
BRASSICACEAE (BRASSICA SP., SINAPIS SP., RAVANELLO)	Alternaria sp.	4-5	Dalla primavera fino a massa fogliare tipica raggiunta (BBCH 49)	1-6 Ogni 7-15 gg	7
CETRIOLO	Oidio *(Erysiphe polygoni)*, Alternaria alternata f. sp.cucurbitae		Fino a completa maturazione dei frutti (BBCH 89)		
FRUTTIFERI: MELO, SUSINO, PESCO, CILIEGIO	Macchie nelle foglie *(Alternaria alternata)*, Marciume del castagno/ marciume fiorale *(Monilinia laxa, Botrytis Cinerea)* Muffa nera *(Rhizopus stolonifer)*		Dalla primavera fino alla maturazione dei frutti (BBCH 87)		
VITE	Peronospora *(Plasmopara viticola)*		Dalla primavera fino a maturazione del grappolo (BBCH 89)		
PATATA	Peronospora della patata		Dalla primavera fino alla completa formazione tuberi (BBCH 49)		

** Scegliere l'appropriato volume di distribuzione per applicare la sostanza in modo uniforme sull'intera superficie fogliare. In caso di basso volume di impiego utilizzare l'equivalente di estratto d'ortica per un volume di 1000 l/ha.*

VANTAGGI

- **Ammesso in agricoltura biologica ai sensi della normativa vigente.**
- Rappresenta un partner efficace all'interno di programmi di difesa biologica e integrata.
- Applicato nell'ambito delle diverse strategie permette di amplificare e migliorare la performance prodotti fitosanitari utilizzati in campo, agendo direttamente sul patogeno e indirettamente stimolando le difese naturali della pianta.

INFO UTILI



Centri antiveleni 110
Stop agli agrofarmaci illegali 111
Indicazioni di pericolo per prodotto 112
Indice per coltura 118
Indice per principio attivo 132

CONSULTA L' ELENCO DEI CENTRI ANTIVELENI ATTIVI 24 ORE AL GIORNO

In caso di probabili o sospette esposizioni pericolose, rivolgersi ai Centri Antiveleni tenendo a portata di mano, se possibile, la confezione del prodotto o almeno riferire il marchio, il nome commerciale e il volume della confezione!

CAV "OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ" – ROMA | TEL. (+39) 06.6859.3726

CAV POLICLINICO "UMBERTO I" – ROMA | TEL. (+39) 06.4997.8000

CAV POLICLINICO "A. GEMELLI" – ROMA | TEL. (+39) 06.305.4343

CAV "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITÀ DI FOGGIA" – FOGGIA | TEL. 800.183.459

CAV "AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI" – NAPOLI | TEL. (+39) 081.545.3333

CAV AZIENDA OSPEDALIERA "CAREGGI" U.O. TOSSICOLOGIA MEDICA – FIRENZE | TEL. (+39) 055.794.7819

CAV CENTRO NAZIONALE DI INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA – PAVIA | TEL. (+39) 0382.24.444

CAV OSPEDALE NIGUARDA – MILANO | TEL. (+39) 02.66.1010.29

CAV AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII – BERGAMO | TEL. 800.88.33.00

CAV CENTRO ANTIVELENI VENETO – VERONA | TEL. 800.011.858



DIFFIDATE DELLE IMITAZIONI:

STOP AGLI AGROFARMACI ILLEGALI

"Stop agli agrofarmaci illegali" è la campagna lanciata nel 2005 da Agrofarma per sensibilizzare gli utenti al rischio legato al commercio e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari contraffatti, realizzati senza seguire le regolari procedure di sicurezza stabilite dalla legge, rubati o introdotti illegalmente nel nostro Paese.

Per contrastare questo fenomeno criminoso, diventa importante il contributo di ciascuno. Pertanto:

- **ASSICURATI** di acquistare agrofarmaci solo da operatori in possesso dei requisiti necessari per la vendita degli stessi;
- **DIFFIDA** della vendita di prodotti a prezzi significativamente più bassi della media;
- **SEGNALA** tempestivamente alle autorità competenti coloro che propongono l'acquisto di agrofarmaci al di fuori dei canali certificati;
- **RICORDATI** che chi vende e chi compra agrofarmaci rubati, importati illegalmente o contraffatti è perseguibile dalla legge.

Numero Verde

800 91 30 83

INDICAZIONI DI PERICOLO PER PRODOTTO

PRODOTTO	CODICE	FRASE H
Actlet C	H302	Nocivo se ingerito
	H318	Provoca gravi lesioni oculari
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
	EUH208	Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica
Actlet F	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H319	Provoca grave irritazione oculare
	H332	Nocivo se inalato
	H351	Sospettato di provocare il cancro
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Actlet EVO	H251	Autoriscaldante: può infiammarsi
	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H319	Provoca grave irritazione oculare
	H332	Nocivo se inalato
	H351	Sospettato di provocare il cancro
	H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Almada F	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H319	Provoca grave irritazione oculare
	H332	Nocivo se inalato
	H351	Sospettato di provocare il cancro
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Almada 50 SC	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH208	Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Almada Hydro	H302	Nocivo peer ingestione
	H318	Provoca gravi lesioni oculari
	H332	Nocivo se inalato
	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH208	Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Almada Trio	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H351	Sospettato di provocare il cancro
	H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Azox 25 SC	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Azupec 80 WG	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Back 100 SC	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
	EUH208	Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica
Broker	H319	Provoca grave irritazione oculare
	H355	Può irritare le vie respiratorie
	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

PRODOTTO	CODICE	FRASE H
Cardinal 50 WG	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
	EUH208	Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica
Coimbra	H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH208	Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Douro 10 WG	H361d	Sospettato di nuocere al feto
	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Douro 100 EC	H315	Provoca irritazione cutanea
	H318	Provoca gravi lesioni oculari
	H361d	Sospettato di nuocere al feto
	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Drum	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H319	Provoca grave irritazione oculare
	H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
	H373	Può provocare danni agli organi (sangue e timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Erune 40 SC	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH208	Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Folpec 50 SC	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H319	Provoca grave irritazione oculare
	H332	Nocivo se inalato
	H351	Sospettato di provocare il cancro
	H400	Molto tossico per gli organismi acquatici
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Folpec 80 WG Advance	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H332	Nocivo se inalato
	H351	Sospettato di provocare il cancro
	H400	Molto tossico per gli organismi acquatici
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Kresostar	H319	Provoca grave irritazione oculare
	H351	Sospettato di provocare il cancro
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Medeiro 80 WG Advance	H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Ossiram 70 Flow	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Shardif 250 EC	H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
	H319	Provoca grave irritazione oculare
	H336	Può provocare sonnolenza o vertigini
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

INDICAZIONI DI PERICOLO PER PRODOTTO

PRODOTTO	CODICE	FRASE H
Shardif 250 EC	EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Tokra	H319	Provoca grave irritazione oculare
	H351	Sospettato di provocare il cancro
	H361d	Sospettato di nuocere al feto
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Tribasic Flow New	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Bentador	H302	Nocivo per ingestione
	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Callicore	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H318	Provoca gravi lesioni oculari
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Drone	H412	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Exstensor OD	H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
	H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH208	Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Grims 10	H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H318	Provoca gravi lesioni oculari
	H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
	EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle
Grims Duo	H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Hereu	H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
	H336	Può provocare sonnolenza e vertigini
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
	EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle
Hereu SC	H318	Provoca gravi lesioni oculari
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
High Top	H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H319	Provoca grave irritazione oculare
	H335	Può irritare le vie respiratorie

PRODOTTO	CODICE	FRASE H
High Top	H400	Molto tossico per gli organismi acquatici
	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Joystick	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Mohican 500 SC	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Nicozea OD	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Nirvana	H319	Provoca grave irritazione oculare
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Orbiter	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH208	Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Pendi 40	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH208	Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Plaza	H319	Provoca grave irritazione oculare
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Stonic	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH208	Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Sudoku Ultra OD	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H361d	Sospettato di nuocere al feto
	H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Taisen 800 EC	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle
	EUH208	Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica
	EUH210	Scheda sicurezza disponibile su richiesta
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Atlas	H302	Nocivo se ingerito
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Deltasap	H226	Liquido e vapori infiammabili
	H302+H332	Nocivo se ingerito o inalato.
	H315	Provoca irritazione cutanea
	H318	Provoca gravi lesioni oculari
	H335	Può irritare le vie respiratorie
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

INDICAZIONI DI PERICOLO PER PRODOTTO

PRODOTTO	CODICE	FRASE H
Expedient 10 EC	H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
	H315	Provoca irritazione cutanea
	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H318	Provoca gravi lesioni oculari
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Pireflor	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Stiker Flow	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
	EUH208	Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica
Toreador	H335	Può irritare le vie respiratorie
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Vasco	H302	Nocivo se ingerito
	H318	Provoca gravi lesioni oculari
	H304	Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione delle vie respiratorie
	H336	Può provocare sonnolenza o vertigini
	H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Nematade	H300	Letale se ingerito
	H330	Letale se inalato
	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
	EUH208	Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica
Pottok	H319	Provoca grave irritazione oculare
	H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
PREV-AM PLUS	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
	H319	Provoca grave irritazione oculare
	H332	Nocivo se inalato
	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso



INDICE PER COLTURA

COLTURA	SOTTOGRUPPO	GRUPPO	PRODOTTO
Actinidia/Kiwi	Altre Frutticole	Frutticole	Doctrin
			PREV-AM PLUS
			Tribasic Flow New
Aglio	Ortaggi a bulbo	Orticole	Drum
			PREV-AM PLUS
Agrumi	Agrumi	Frutticole	Doctrin
			Expedient 10 EC
			Mohican 500 SC
			Ossiram 70 Flow
			Tribasic Flow New
Alberi ed arbusti ornamentali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Floreali, Ornamentali, Forestali	PREV-AM PLUS
Albicocco	Drupacee	Frutticole	Atlas
			Deltasap
			Expedient 10 EC
			Mohican 500 SC
			Pendi 40
			Pireflor
			Tribasic Flow New
Ananas	Altre Frutticole	Frutticole	PREV-AM PLUS
Arachide	Oleaginosee	Erbacee	Pendi 40
Arancio	Agrumi	Frutticole	Carpet
			Hereu
			Hereu SC
			Matsuda 25 WG
			Medeiro 80 WG Advance
			Pireflor
			PREV-AM PLUS
			Stiker Flow
			Vasco
Arancio amaro	Agrumi	Frutticole	Medeiro 80 WG Advance
			Stiker Flow
Aree incolte e sedi ferroviarie	Extra-agricolo	Extra-agricolo	Hereu SC
Aree non coltivate	Extra-agricolo	Extra-agricolo	Matsuda 25 WG
Aree urbane	Extra-agricolo	Extra-agricolo	Matsuda 25 WG
Asparago	Ortaggi a stelo	Orticole	Pendi 40
			Shardif 50 EC
			Tribasic Flow New
Avena	Cereali	Erbacee	Atlas
Avocado	Altre Frutticole	Frutticole	PREV-AM PLUS
Bacche	Piccoli frutti e bacche	Frutticole	Prevatect
Banano	Altre Frutticole	Frutticole	PREV-AM PLUS
Barba di becco	Altre Orticole	Orticole	PREV-AM PLUS
Barbabietola	Altre Orticole	Orticole	Prevatect
			High Top
Barbabietola trattamento dalle sementi	Altre Orticole	Orticole	Prevatect
Barbabietola da zucchero	Piante da zucchero	Erbacee	High Top
		Erbacee	Shardif 50 EC

COLTURA	SOTTOGRUPPO	GRUPPO	PRODOTTO
Basilico	Erbe aromatiche ed erbe fresche	Orticole	PREV-AM PLUS
			Almada 50 SC
Bergamotto	Agrumi	Frutticole	Matsuda 25 WG
			Medeiro 80 WG Advance
			PREV-AM PLUS
			Stiker Flow
Brassicacee	Brassicacee	Orticole	Valesco
Carciofo	Ortaggi a stelo	Orticole	Doctrin
			Drum
			Hereu
			Hereu SC
			Tribasic Flow New
Carota	Ortaggi a radice e tubero	Orticole	Pendi 40
			PREV-AM PLUS
			Shardif 50 EC
Castagno	Frutta a guscio	Frutticole	Tribasic Flow New
Cavolfiore	Cavoli	Orticole	Atlas
			Deltasap
			Pendi 40
			Shardif 50 EC
Cavoli a foglia	Cavoli	Orticole	PREV-AM PLUS
Cavoli a testa	Cavoli	Orticole	Deltasap
			PREV-AM PLUS
Cavoli ad infiorescenza	Cavoli	Orticole	PREV-AM PLUS
			Tribasic Flow New
Cavolo	Cavoli	Orticole	Doctrin
			Valesco
Cavolo Broccolo	Cavoli	Orticole	Atlas
			Deltasap
Cavolo rapa	Cavoli	Orticole	PREV-AM PLUS
Cece	Leguminose	Orticole	High Top
			Pendi 40
			PREV-AM PLUS
Cedro	Agrumi	Frutticole	Matsuda 25 WG
			Medeiro 80 WG Advance
			PREV-AM PLUS
Cereali	Cereali	Erbacee	Deltasap
			Prevatect
Cereali - trattamento dalle sementi	Cereali	Erbacee	Prevatect
Cetriolino	Cucurbitacee	Orticole	Azox 25 SC
			Doctrin
			Nemadate
			PREV-AM PLUS
			Vasco
Cetriolo	Cucurbitacee	Orticole	Azox 25 SC
			Doctrin
			Douro 10 WG
			Douro 100 EC

INDICE PER COLTURA

COLTURA	SOTTOGRUPPO	GRUPPO	PRODOTTO
Cetriolo	Cucurbitacee	Orticole	Drum
			Equiset
			Nemadate
			PREV-AM PLUS
			Shardif 50 EC
			Valesco
			Vasco
Chinotto	Agrumi	Frutticole	Matsuda 25 WG
			Medeiro 80 WG Advance
			PREV-AM PLUS
			Stiker Flow
Cicoria	Ortaggi a foglia	Orticole	Almada 50 SC
Ciliegio	Drupacee	Frutticole	Carpet
			Deltasap
			Expedient 10 EC
			Mohican 500 SC
			Pireflor
			Tribasic Flow New
			Valesco
Cipolla	Ortaggi a bulbo	Orticole	Drum
			PREV-AM PLUS
Cipresso	Forestali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Tribasic Flow New
Clementino	Agrumi	Frutticole	Matsuda 25 WG
			Medeiro 80 WG Advance
			PREV-AM PLUS
			Stiker Flow
			Vasco
Cocomero	Cucurbitacee	Orticole	Azox 25 SC
			Vasco
Colture floreali	Floreali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Tribasic Flow New
Colture floreali e ornamentali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Douro 10 WG
			Douro 100 EC
			Stiker Flow
Colza	Oleaginosee	Erbacee	High Top
			Valesco
			Stonic
Cotogno	Pomacee	Frutticole	PREV-AM PLUS
			Stiker Flow
			Tribasic Flow New
Cotone	Industriali	Erbacee	Doctrin
			High Top
Crescione	Ortaggi a foglia	Orticole	Almada 50 SC
Cucurbitacee a buccia commestibile	Cucurbitacee	Orticole	Tribasic Flow New
Cucurbitacee a buccia non commestibile	Cucurbitacee	Orticole	Tribasic Flow New
Dente di leone	Ortaggi a foglia	Orticole	Almada 50 SC

COLTURA	SOTTOGRUPPO	GRUPPO	PRODOTTO
Dolcetta	Altre Orticole	Orticole	Almada 50 SC
Dragoncello	Altre Orticole	Orticole	PREV-AM PLUS
Drupacee	Drupacee	Frutticole	Cardinal 50 WG
			Doctrin
			Hereu
			Hereu SC
			Ossiram 70 Flow
Erba medica	Foraggere	Erbacee	High Top
Erbe aromatiche	Erbe aromatiche ed erbe fresche	Orticole	High Top
Erbe fresche	Erbe aromatiche ed erbe fresche	Orticole	Almada 50 SC
			Pireflor
Fagiolino	Leguminose	Orticole	Pendi 40
			Tribasic Flow New
Fagiolo	Leguminose	Orticole	High Top
			Pendi 40
			PREV-AM PLUS
			Tribasic Flow New
			Valesco
Fava	Leguminose	Orticole	Pendi 40
			PREV-AM PLUS
Favino	Leguminose	Orticole	Pendi 40
Fiori commestibili	Fiori commestibili	Orticole	Pireflor
Floreali e Ornamentali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Atlas
			Doctrin
			Pireflor
			PREV-AM PLUS
			Stiker Flow
Foraggere	Foraggere	Erbacee	Prevatect
Forestali	Forestali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Doctrin
			High Top
Fragola	Altre Orticole	Orticole	Doctrin
			Equiset
			High Top
			Pireflor
			PREV-AM PLUS
			Prevatect
			Tribasic Flow New
			Vasco
Frumento duro	Cereali	Erbacee	Atlas
			Azox 25 SC
			Broker
			Gat Tessla 25 WG
			Grims 10
			Grims Duo
			Joystick
			Mohican 500 SC
			Orbiter
			Taisen 800 EC

INDICE PER COLTURA

COLTURA	SOTTOGRUPPO	GRUPPO	PRODOTTO
Frumento tenero	Cereali	Erbacee	Atlas
			Azox 25 SC
			Broker
			Gat Tessla 25 WG
			Grims 10
			Grims Duo
			Joystick
			Mohican 500 SC
			Orbiter
			Taisen 800 EC
Frutta a guscio	Frutta a guscio	Frutticole	Doctrin
Frutto della passione	Altre Frutticole	Frutticole	PREV-AM PLUS
Garofano	Floreali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Shardif 50 EC
Girasole	Oleaginosee	Erbacee	High Top
			Pendi 40
			Hereu
			Hereu SC
Guaiave	Altre Frutticole	Frutticole	PREV-AM PLUS
Indivia	Ortaggi a foglia	Orticole	Almada 50 SC
Insalate	Ortaggi a foglia	Orticole	Doctrin
			Deltasap
Insalate Baby leaf	Ortaggi a foglia	Orticole	Almada 50 SC
Kumquat	Agrumi	Frutticole	PREV-AM PLUS
Lampone	Piccoli frutti e bacche	Frutticole	Equiset
			High Top
			Pireflor
			PREV-AM PLUS
Lattuga	Ortaggi a foglia	Orticole	Coimbra
			Drum
			High Top
			PREV-AM PLUS
			Valesco
Lattughe ed altre insalate	Ortaggi a foglia	Orticole	Almada 50 SC
			Vasco
			Pendi 40
			Deltasap
			Doctrin
Lenticchia	Leguminose	Orticole	High Top
			PREV-AM PLUS
			Tribasic Flow New
Lime	Agrumi	Frutticole	PREV-AM PLUS
Limetta	Agrumi	Frutticole	Matsuda 25 WG
			Medeiro 80 WG Advance
			PREV-AM PLUS
			Stiker Flow
Limone	Agrumi	Frutticole	Hereu
			Hereu SC
			Matsuda 25 WG

COLTURA	SOTTOGRUPPO	GRUPPO	PRODOTTO
Limone	Agrumi	Frutticole	Medeiro 80 WG Advance
			Pireflor
			PREV-AM PLUS
			Vasco
			Stiker Flow
Lino	Industriali	Erbacee	High Top
Luppolo	altre erbacee	Erbacee	PREV-AM PLUS
Mais	Cereali		Atlas
			Bentador
			Callicore
			Deltasap
			Drone
			Nicozea OD
			Pendi 40
			Pottok
			Vasco
			Extensor OD
			Plaza
			Nirvana
			Sudoku Ultra OD
Mais dolce	Cereali	Erbacee	Sudoku Ultra OD
Mandarino	Agrumi	Frutticole	Matsuda 25 WG
			Medeiro 80 WG Advance
			Pireflor
			PREV-AM PLUS
			Stiker Flow
			Vasco
Mandorlo	Frutta a guscio	Frutticole	Hereu SC
			Mohican 500 SC
			Tribasic Flow New
Mango	Altre Frutticole	Frutticole	PREV-AM PLUS
Mapo	Agrumi	Frutticole	Matsuda 25 WG
			Medeiro 80 WG Advance
Melanzana	Solanacee	Orticole	Actlet C
			High Top
			Nemadate
			PREV-AM PLUS
			Tribasic Flow New
			Vasco
			Pireflor
Melo	Pomacee	Frutticole	Atlas
			Carpet
			Deltasap
			Douro 10 WG
			Douro 100 EC
			Equiset
			Expedient 10 EC
			High Top

INDICE PER COLTURA

COLTURA	SOTTOGRUPPO	GRUPPO	PRODOTTO
Melo	Pomacee	Frutticole	Mohican 500 SC
			Pendi 40
			Pireflor
			PREV-AM PLUS
			Shardif 50 EC
			Stiker Flow
			Tribasic Flow New
			Valesco
			Vasco
			Vegas 50 WG
Melone	Cucurbitacee	Orticole	Azox 25 SC
			Douro 10 WG
			Douro 100 EC
			Drum
			Gat Tessla 25 WG
			Pireflor
			PREV-AM PLUS
			Vasco
Mineola	Pomacee	Frutticole	Stiker Flow
Mirtillo	Piccoli frutti e bacche	Frutticole	High Top
			Pireflor
Mora	Piccoli frutti e bacche	Frutticole	Pireflor
			PREV-AM PLUS
Nashi	Pomacee	Frutticole	Stiker Flow
Nespolo	Pomacee	Frutticole	Stiker Flow
			Tribasic Flow New
Nettarine	Drupacee	Frutticole	Atlas
			Expedient 10 EC
			Mohican 500 SC
			Pendi 40
Nocciolo	Frutta a guscio	Frutticole	Atlas
			Deltasap
			Hereu SC
			Tribasic Flow New
Noce	Frutta a guscio	Frutticole	Tribasic Flow New
			Valesco
Olivo da olio	Olivo	Frutticole	Deltasap
			Doctrin
			Hereu SC
			Kresostar
			Matsuda 25 WG
			Mohican 500 SC
			Ossiram 70 Flow
			Tribasic Flow New
			Vegas 50 WG
Olivo da tavola	Olivo	Frutticole	Deltasap
			Doctrin
			Hereu SC

COLTURA	SOTTOGRUPPO	GRUPPO	PRODOTTO
Olivo da tavola	Olivo	Frutticole	Kresostar
			Matsuda 25 WG
			Mohican 500 SC
			Ossiram 70 Flow
			Tribasic Flow New
			Vegas 50 WG
Ornamentali a bulbo	Ornamentali	Orticole	Prevatect
Ortaggi a bulbo	Ortaggi a bulbo	Orticole	Tribasic Flow New
Ortaggi a foglia	Ortaggi a foglia	Orticole	Pireflor
Orticole	Orticole	Orticole	Carpet
			Prevatect
Orzo	Cereali	Erbacee	Atlas
			Azox 25 SC
			Broker
			Gat Tessla 25 WG
			Joystick
			Mohican 500 SC
			Orbiter
			Taisen 800 EC
Papaya	Altre Frutticole	Frutticole	PREV-AM PLUS
			Carpet
Patata	Solanacee	Orticole	Actlet C
			Almada 50 SC
			Atlas
			Back 100 SC
			Coimbra
			Deltasap
			Drum
			Equiset
			High Top
			Ossiram 70 Flow
			Pendi 40
			Pireflor
			Pottok
			Shardif 50 EC
			Stonic
			Tribasic Flow New
			Valesco
			Plaza
Patata trattamento dalle sementi (da seme)	Solanacee	Orticole	Prevatect
Peperone	Pomacee	Orticole	Pireflor
			Doctrin
			Douro 10 WG
			Douro 100 EC
			Gat Tessla 25 WG
			Nemadate
			Pendi 40
			PREV-AM PLUS

INDICE PER COLTURA

COLTURA	SOTTOGRUPPO	GRUPPO	PRODOTTO
Pero	Pomacee	Frutticole	Stiker Flow
			Atlas
			Deltasap
			Douro 10 WG
			Douro 100 EC
			Expedient 10 EC
			High Top
			Mohican 500 SC
			Pendi 40
			Pireflor
			PREV-AM PLUS
			Shardif 50 EC
			Tribasic Flow New
			Valesco
			Vasco
			Vegas 50 WG
Pesco	Drupacee	Frutticole	Atlas
			Deltasap
			Douro 10 WG
			Douro 100 EC
			Equiset
			Expedient 10 EC
			High Top
			Mohican 500 SC
			Pendi 40
			Pireflor
			PREV-AM PLUS
			Shardif 50 EC
			Tribasic Flow New
			Valesco
			Vasco
Piante Ornamentali	Ornamentali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Carpet
			Deltasap
			High Top
			Pendi 40
Piccoli frutti e bacche	Piccoli frutti e bacche	Frutticole	Carpet
			Prevatect
			Tribasic Flow New
Pioppo	Forestali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Pendi 40
Pisello	Leguminose	Orticole	Drum
			High Top
			Pendi 40
			PREV-AM PLUS
			Tribasic Flow New
Pisello mangiatutto	Leguminose	Orticole	Tribasic Flow New
Pomacee	Pomacee	Frutticole	Cardinal 50 WG
			Doctrin
			Hereu

COLTURA	SOTTOGRUPPO	GRUPPO	PRODOTTO
Pomacee	Pomacee	Frutticole	Hereu SC
			Kresostar
			Medeiro 80 WG Advance
			Ossiram 70 Flow
Pomelo	Agrumi	Frutticole	Matsuda 25 WG
			Medeiro 80 WG Advance
			Stiker Flow
Pomodoro	Solanacee	Orticole	Actlet C
			Almada F
			Atlas
			Azox 25 SC
			Azupec 80 WG
Pomodoro	Solanacee	Orticole	Back 100 SC
			Deltasap
			Doctrin
			Douro 10 WG
			Douro 100 EC
			Drum
			Equiset
			Expedient 10 EC
			Folpec 50 SC
			Folpec 80 WG Advance
			High Top
			Nemadate
			Ossiram 70 Flow
			Pireflor
			Plaza
			Pottok
			Shardif 50 EC
			Tribasic Flow New
			Vasco
Pompelmo	Agrumi	Frutticole	Hereu
			Hereu SC
			Matsuda 25 WG
			Medeiro 80 WG Advance
			PREV-AM PLUS
			Stiker Flow
Porro	Ortaggi a bulbo	Orticole	Drum
			PREV-AM PLUS
Prezzemolo	Erbe aromatiche ed erbe fresche	Orticole	PREV-AM PLUS
Prugno	Drupacee	Frutticole	Pireflor
			Valesco
Radicchio	Ortaggi a foglia	Orticole	Almada 50 SC
			High Top
Ravanello	Ortaggi a radice e tubero	Orticole	Valesco
			PREV-AM PLUS
Ribes	Piccoli frutti e bacche	Frutticole	High Top
			Pireflor

INDICE PER COLTURA

COLTURA	SOTTOGRUPPO	GRUPPO	PRODOTTO
Ribes	Piccoli frutti e bacche	Frutticole	PREV-AM PLUS
			Valesco
Riso	Cereali	Erbacee	Azox 25 SC
			Stonic
Rosa	Floreali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Drum
			Shardif 50 EC
			PREV-AM PLUS
			Valesco
Sambuco	Ornamentali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Valesco
Scalogno	Ortaggi a bulbo	Orticole	PREV-AM PLUS
Scarola	Ortaggi a foglia	Orticole	Almada 50 SC
			High Top
Scarola riccia	Ortaggi a foglia	Orticole	PREV-AM PLUS
Scorzanera	Altre Orticole	Orticole	PREV-AM PLUS
Sedano	Ortaggi a foglia	Orticole	Shardif 50 EC
Segale	Cereali	Erbacee	Grims 10
			Joystick
			Mohican 500 SC
Soia	Oleaginosee	Erbacee	Pendi 40
			High Top
Sorgo	Cereali	Erbacee	Sudoku Ultra OD
Spezie	Spezie	Spezie	Prevatect
Spinacio	Ortaggi a foglia	Orticole	Doctrin
			Drum
			High Top
Spiraea	Ornamentali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Valesco
Susino	Drupacee	Frutticole	Deltasap
			Expedient 10 EC
			Gat Tessla 25 WG
			Mohican 500 SC
			Tribasic Flow New
			Valesco
Tabacco	Industriali	Erbacee	Douro 10 WG
			Douro 100 EC
			Drum
			High Top
			Pendi 40
			PREV-AM PLUS
Tangelo	Agrumi	Frutticole	Medeiro 80 WG Advance
			Stiker Flow
Tangerino	Agrumi	Frutticole	Medeiro 80 WG Advance
	Vite	Frutticole	Stiker Flow
Tappeti erbosi	Floreali, Ornamentali, Forestali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Pendi 40
Trifoglio	Foraggere	Erbacee	High Top
Triticale	Cereali	Erbacee	Grims 10
			Joystick
			Mohican 500 SC
			Orbiter

COLTURA	SOTTOGRUPPO	GRUPPO	PRODOTTO
Ugli	Agrumi	Frutticole	Stiker Flow
Uva spina	Piccoli frutti e bacche	Frutticole	PREV-AM PLUS
Valerianella	Ortaggi a foglia	Orticole	Almada 50 SC
			PREV-AM PLUS
Vite da tavola	Vite	Frutticole	Actlet C
			Actlet EVO
			Actlet F
			Almada 50 SC
			Almada Hydro
Vite da tavola	Vite	Frutticole	Atlas
			Azupec 80 WG
			Back 100 SC
			Cardinal 50 WG
			Carpet
			Deltasap
			Doctrin
			Douro 10 WG
			Douro 100 EC
			Drum
			Equiset
			Gat Tessla 25 WG
			Hereu
			Hereu SC
			High Top
			Matsuda 25 WG
			Mohican 500 SC
			Ossiram 70 Flow
			Pendi 40
			Pireflor
			PREV-AM PLUS
			Prevatect
			Stiker Flow
			Tokra
			Tribasic Flow New
			Valesco
			Vasco
			Vegas 50 WG
Vite da vino	Vite	Frutticole	Actlet C
			Actlet EVO
			Actlet F
			Almada 50 SC
			Almada F
			Almada Hydro
			Almada Trio
			Atlas
			Azupec 80 WG
			Back 100 SC
			Cardinal 50 WG

INDICE PER COLTURA

COLTURA	SOTTOGRUPPO	GRUPPO	PRODOTTO
Vite da vino	Vite	Frutticole	Carpet
			Deltasap
			Doctrin
			Douro 10 WG
			Douro 100 EC
			Drum
			Equiset
			Folpec 50 SC
			Folpec 80 WG Advance
			Gat Tessla 25 WG
			Hereu
			Hereu SC
			High Top
			Matsuda 25 WG
			Medeiro 80 WG Advance
			Mohican 500 SC
			Ossiram 70 Flow
			Pendi 40
			Pireflor
			PREV-AM PLUS
			Prevatect
			Stiker Flow
			Tokra
			Tribasic Flow New
			Valesco
			Vasco
			Vegas 50 WG
Vivai	Vivai	Floreali, Ornamentali, Forestali	High Top
Vivai Forestali ed ornamentali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Floreali, Ornamentali, Forestali	Hereu
			Hereu SC
Zucca	Cucurbitacee	Orticole	Azox 25 SC
			Douro 10 WG
			Douro 100 EC
			Vasco
Zucchino	Cucurbitacee	Orticole	Atlas
			Azox 25 SC
			Deltasap
			Doctrin
			Douro 10 WG
			Douro 100 EC
			Drum
			Gat Tessla 25 WG
			Nemadate
			Pireflor
			PREV-AM PLUS
			Vasco



INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO

PRINCIPIO ATTIVO 1	PRODOTTO	COLTURA
Abamectina	**Vasco**	Arancio
		Cetriolino
		Cetriolo
		Clementino
		Cocomero
		Fragola
		Lattuga e altre insalate
		Limone
		Mais
		Mandarino
		Melanzana
		Melo
		Melone
		Pero
		Pesco
		Pomodoro
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Zucca
		Zucchino
Alcool grasso alcossilato	**Pottok**	Mais
		Patata
		Pomodoro
Azoxystrobin	**Azox 25 SC**	Cetriolino
		Cetriolo
		Cocomero
		Frumento duro
		Frumento tenero
		Melone
		Orzo
		Pomodoro
		Riso
		Zucca
		Zucchino
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki, ceppo PB-54	**Doctrin**	Actinidia/Kiwi
		Agrumi
		Carciofo
		Cavoli
		Cetriolino
		Cetriolo
		Cotone
		Drupacee
		Olivo da tavola
		Floreali e Ornamentali
		Peperone
		Forestali
		Pomacee
		Fragola

PRINCIPIO ATTIVO 1	PRODOTTO	COLTURA
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki, ceppo PB-54	**Doctrin**	Pomodoro
		Frutta a guscio
		Lattuga e altre insalate
		Olivo da olio
		Spinaci
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Zucchino
Bentazone	**Bentador**	Mais
Cimoxanil	**Drum**	Aglio
		Carciofo
		Cetriolo
		Cipolla
		Lattuga
		Melone
		Patata
		Pisello
		Pomodoro
		Porro
		Rosa
		Spinacio
		Tabacco
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Zucchino
Clodinafop propargyl + Cloquintocet metyl	**Grims 10**	Frumento duro
		Frumento tenero
		Orzo
		Segale
		Triticale
Clodinafop propargyl + Cloquintocet metyl + Diclofop-methyl	**Grims Duo**	Frumento duro
		Frumento tenero
Clomazone	**Stonic**	Colza
		Patata
		Riso
Cloridrato chitosano	**Prevatect**	Bacche
		Barbabietola
		Barbabietola - trattamento dalle sementi
		Cereali
		Cereali - trattamento dalle sementi
		Foraggere
		Fragola
		Ornamentali a bulbo
		Orticole
		Patata - trattamento dalle sementi (da seme)
		Piccoli Frutti
		Spezie
		Vite da tavola
		Vite da vino

INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO

PRINCIPIO ATTIVO 1	PRODOTTO	COLTURA
Cyazofamid	**Back 100 SC**	Patata
		Pomodoro
		Vite da tavola
		Vite da vino
Cyprodinil	**Cardinal 50 WG**	Drupacee
		Pomacee
		Vite da tavola
		Vite da vino
Deltametrina	**Deltasap**	Albicocco
		Cavolfiore
		Cavoli a testa
		Cavolo broccolo
		Cereali
		Ciliegio
		Insalate
		Lattuga e altre insalate
		Mais
		Melo
		Nocciolo
		Olivo da olio
		Olivo da tavola
		Patata
		Pero
		Pesco
		Piante Ornamentali
		Pomodoro
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Zucchino
Dicamba	**Drone**	Mais
Dicamba + Nicosulfuron + Rimsulfuron	**Nirvana**	Mais
Difenoconazolo	**Shardif 50 EC**	Asparago
		Barbabietola da zucchero
		Carota
		Cavolfiore
		Cetriolo
		Garofano
		Melo
		Patata
		Pero
		Pesco
		Pomodoro
		Rosa
		Sedano
Difenoconazolo + Kresoxym-metile	**Kresostar**	Melo
		Olivo da olio
		Olivo da tavola
		Pero
		Pomacee

PRINCIPIO ATTIVO 1	PRODOTTO	COLTURA
Diflufenican	**Mohican 500 SC**	Agrumi
		Albicocco
		Arancio
		Bergamotto
		Cedro
		Chinotto
		Ciliegio
		Clementino
		Frumento duro
		Frumento tenero
		Limone
		Mandarino
		Mandorlo
		Mapo
		Melo
		Nettarine
		Olivo da olio
		Olivo da tavola
		Orzo
		Pero
		Pesco
		Segale
		Susino
		Triticale
		Vite da tavola
		Vite da vino
Diflufenican + Florasulam + Iodosulfuron	**Joystick**	Frumento duro
		Frumento tenero
		Orzo
		Segale
		Triticale
Dimetomorf	**Almada 50 SC**	Basilico
		Cicoria
		Crescione
		Dente di leone
		Dolcetta
		Erbe fresche
		Indivia
		Insalate Baby leaf
		Lattuga e altre insalate
		Patata
		Radicchio
		Scarola
		Valerianella
		Vite da tavola
		Vite da vino
Dimetomorf + Propamocarb cloridrato	**Coimbra**	Lattuga
		Patata

INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO

PRINCIPIO ATTIVO 1	PRODOTTO	COLTURA
Dimetomorf + Folpet	**Almada F**	Pomodoro
		Vite da vino
Dimetomorf + Folpet + Fosetil alluminio	**Almada Trio**	Vite da vino
Dimetomorf + Idrossido di rame	**Almada Hydro**	Vite da tavola
		Vite da vino
Equisetum arvense	**Equiset**	Cetriolo
		Fragola
		Lampone
		Melo
		Patata
		Pesco
		Pomodoro
		Vite da tavola
		Vite da vino
Exitiazon	**Stiker Flow**	Arancio
		Arancio amaro
		Bergamotto
		Chinotto
		Clementino
		Colture floreali e ornamentali
		Cotogno
		Limetta
		Limone
		Mandarino
		Melo
		Mineola
		Nashi
		Nespolo
		Pero
		Pomelo
		Pompelmo
		Tangelo
		Tangerino
		Ugli
		Vite da tavola
		Vite da vino
Flazasulfuron	**Matsuda 25 WG**	Arancio
		Aree non coltivate
		Bergamotto
		Cedro
		Chinotto
		Clementino
		Limone
		Mandarino
		Mapo
		Olivo da olio
		Olivo da tavola
		Vite da tavola
		Vite da vino

PRINCIPIO ATTIVO 1	PRODOTTO	COLTURA
Florasulam	**Orbiter**	Frumento duro
		Frumento tenero
		Orzo
		Triticale
Folpet	**Folpec 50 SC**	Pomodoro
		Vite da vino
Folpet	**Folpec 80 WG Advance**	Pomodoro
		Vite da vino
Fosetil alluminio	**Medeiro 80 WG Advance**	Arancio
		Arancio amaro
		Bergamotto
		Cedro
		Chinotto
		Clementino
		Limetta
		Limone
		Mandarino
		Mapo
		Melo
		Pero
		Pomacee
		Pomelo
		Pompelmo
		Tangelo
		Tangerino
		Vite da vino
Idrogenocarbonato di sodio	**Carpet**	Arancio
		Ciliegio
		Melo
		Ornamentali
		Orticole
		Papaya
		Bacche
		Vite da tavola
		Vite da vino
Kresoxim-metile	**Vegas 50 WG**	Melo
		Olivo da olio
		Olivo da tavola
		Pero
		Vite da tavola
		Vite da vino
Kresoxym-metile + Penconazolo	**Tokra**	Vite da tavola
		Vite da vino
Lambda-cialotrina	**Atlas**	Albicocco
		Avena
		Cavolfiore
		Cavolo Broccolo
		Floreali e Ornamentali
		Frumento duro

INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO

PRINCIPIO ATTIVO 1	PRODOTTO	COLTURA
Lambda-cialotrina	**Atlas**	Frumento tenero
		Mais
		Melo
		Nettarine
		Nocciolo
		Orzo
		Patata
		Pero
		Pesco
		Pomodoro
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Zucchino
Mesotrione	**Callicore**	Mais
Metalaxyl-M + Folpet	**Actlet F**	Vite da tavola
		Vite da vino
Metalaxyl-M + Folpet + Cimoxanil	**Actlet EVO**	Vite da tavola
		Vite da vino
Metalaxyl-M + Idrossido di rame	**Actlet C**	Melanzana
		Patata
		Pomodoro
		Vite da tavola
		Vite da vino
Nicosulfuron	**Nicozea OD**	Mais
Nicosulfuron + Sulcotrione	**Extensor OD**	
Olio essenziale di arancio dolce	**PREV-AM PLUS**	Actinidia/Kiwi
		Aglio
		Alberi e arbusti ornamentali
		Ananas
		Arancio
		Avocado
		Banano
		Barba di becco
		Bergamotto
		Carota
		Cavoli a foglia
		Cavoli a testa
		Cavoli ad infiorescenza
		Cavolo rapa
		Cece
		Cedro
		Cetriolino
		Cetriolo
		Chinotto
		Cipolla
		Clementino
		Cotogno
		Dragoncello
		Fagiolo

PRINCIPIO ATTIVO 1	PRODOTTO	COLTURA
Olio essenziale di arancio dolce	**PREV-AM PLUS**	Fava
		Fragola
		Guaiave
		Kumquat
		Lampone
		Lattuga
		Lenticchia
		Lime
		Limetta
		Limone
		Luppolo
		Mandarino
		Mango
		Melanzana
		Melo
		Melone
		Mora
		Papaya
		Peperone
		Pero
		Pesco
		Pisello
		Pompelmo
		Porro
		Prezzemolo
		Ravanello
		Ribes
		Rosa
		Scalogno
		Scarola riccia
		Tabacco
		Uva spina
		Valerianella
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Zucchino
Ossicloruro di rame	**Ossiram 70 Flow**	Agrumi
		Drupacee
		Olivo da olio
		Olivo da tavola
		Patata
		Pomacee
		Pomodoro
		Vite da tavola
		Vite da vino
Oxamil	**Nemadate**	Cetriolino
		Cetriolo
		Melanzana

INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO

PRINCIPIO ATTIVO 1	PRODOTTO	COLTURA
Oxamil	**Nemadate**	Peperone
		Pomodoro
		Zucchino
Oxyfluorfen	**Hereu**	Arancio
		Carciofo
		Ciliegio
		Drupacee
		Girasole
		Limone
		Pomacee
		Pompelmo
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Vivai Forestali ed ornamentali
	Hereu SC	Arancio
		Aree incolte e sedi ferroviarie
		Carciofo
		Drupacee
		Girasole
		Limone
		Mandorlo
		Nocciolo
		Olivo da olio
		Olivo da tavola
		Pomacee
		Pompelmo
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Vivai Forestali ed ornamentali
Penconazolo	**Douro 10 WG**	Cetriolo
		Colture floreali e ornamentali
		Melo
		Melone
		Nettarine
		Peperone
		Pero
		Pesco
		Pomodoro
		Tabacco
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Zucca
		Zucchino
	Douro 100 EC	Cetriolo
		Colture floreali e ornamentali
		Melo
		Melone
		Peperone
		Pero

PRINCIPIO ATTIVO 1	PRODOTTO	COLTURA
Penconazolo	**Douro 100 EC**	Pesco
		Pomodoro
		Tabacco
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Zucca
		Zucchino
Pendimethalin	**Pendi 40**	Albicocco
		Arachide
		Asparago
		Carota
		Cavolfiore
		Cece
		Fagioli
		Fagiolini
		Fava
		Favino
		Girasole
		Lattuga e altre insalate
		Mais
		Melo
		Nettarine
		Patata
		Peperone
		Pero
		Pesco
		Piante Ornamentali
		Pioppo
		Pisello
		Soia
		Tabacco
		Tappeti erbosi
		Vite da tavola
		Vite da vino
Piretrine	**Pireflor**	Albicocco
		Arancio
		Ciliegio
		Erbe fresche
		Fiori commestibili
		Floreali e Ornamentali
		Fragola
		Lampone
		Limone
		Mandarino
		Melenzana
		Melo
		Melone
		Mirtillo
		Mora

INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO

PRINCIPIO ATTIVO 1	PRODOTTO	COLTURA
Piretrine	**Pireflor**	Ortaggi a foglia
		Patata
		Peperone
		Pero
		Pesco
		Pomodoro
		Prugno
		Prugno
		Ribes
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Zucchino
Prosulfocarb	**Taisen 800 EC**	Frumento duro
		Frumento tenero
		Orzo
Protioconazolo	**Broker**	Frumento duro
		Frumento tenero
		Orzo
Pyriproxyfen	**Expedient 10 EC**	Agrumi
		Albicocco
		Ciliegio
		Melo
		Nettarine
		Pero
		Pesco
		Pomodoro
		Susino
Quizalofop-p-ethyl	**High Top**	Barbabietola
		Barbabietola da zucchero
		Cece
		Colza
		Cotone
		Erba medica
		Erbe aromatiche
		Fagioli
		Forestali
		Fragola
		Girasole
		Lampone
		Lattuga
		Lenticchia
		Lino
		Melanzana
		Melo
		Mirtillo
		Ornamentali
		Patata
		Pero
		Pesco

PRINCIPIO ATTIVO 1	PRODOTTO	COLTURA
Quizalofop-p-ethyl	**High Top**	Pisello
		Pomodoro
		Radicchio
		Ribes
		Scarola
		Soia
		Spinacio
		Tabacco
		Trifoglio
		Vite da tavola
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Vite da vino
		Vivai
Rimsulfuron	**Plaza**	Mais
		Patata
		Pomodoro
Solfato di Rame tribasico	**Tribasic Flow New**	Actinidia/Kiwi
		Aglio
		Agrumi
		Albicocco
		Arancio
		Asparago
		Carciofo
		Castagno
		Cavoli ad infiorescenza
		Cavolo broccolo
		Cetriolino
		Cetriolo
		Ciliegio
		Cipolla
		Cipresso
		Clementino
		Cocomero
		Colture floreali
		Cotogno
		Cucurbitacee a buccia commestibile
		Cucurbitacee a buccia non commestibile
		Fagiolino
		Fagiolo
		Fragola
		Lenticchia
		Limone
		Mandarino
		Melanzana
		Melo
		Melone
		Nespolo
		Nocciolo

INDICE PER PRINCIPIO ATTIVO

PRINCIPIO ATTIVO 1	PRODOTTO	COLTURA
Solfato di Rame tribasico	**Tribasic Flow New**	Noce
		Olivo da olio
		Olivo da tavola
		Ortaggi a bulbo
		Patata
		Pero
		Pesco
		Piccoli Frutti
		Pisello
		Pisello mangiatutto
		Pomodoro
		Susino
		Vite da tavola
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Vite da vino
		Zucca
		Zucchino
Sulcotrione	**Sudoku Ultra OD**	Mais
		Mais dolce
		Sorgo
Tebuconazolo	**Gat Tessla 25 WG**	Carciofo
		Frumento duro
		Frumento tenero
		Melone
		Orzo
		Peperone
		Susino
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Zucchino
Urtica spp.	**Valesco**	Brassicacee
		Cavolo
		Cetriolo
		Ciliegio
		Colza
		Fagiolo
		Lattuga
		Melo
		Noce
		Patata
		Pero
		Pesco
		Prugno
		Ravanello
		Ribes
		Rosa
		Sambuco
		Spiraea

PRINCIPIO ATTIVO 1	PRODOTTO	COLTURA
Urtica spp.	**Valesco**	Susino
		Vite da tavola
		Vite da vino
		Sambuco
		Spiraea
		Susino
		Vite da tavola
Zolfo	**Azupec 80 WG**	Vite da vino
		Vite da tavola
		Vite da vino

NOTE

ASCENZA®

INFO UTILI

ASCENZA®

— FARMING YOUR FUTURE —

Salvo errori e omissioni, i dati riportati in questo catalogo fanno riferimento a quanto in vigore al momento della conclusione del progetto grafico.
16 novembre 2021



Via Varese, 25/G - 21047 Saronno (VA) - Italia
Phone +39 02 8494 4669
Fax +39 02 9621 685

www.ascenza.it