

Equiset[®]

Estratto di Equiseto per il controllo della peronospora della vite e delle orticole.

Equiset[®], è una sostanza di base autorizzata ai sensi dell'art.23 del Reg. (CE) 1107/2009. Possiede effetto elicitore che stimola le difese naturali della pianta ed interviene nel controllo degli agenti patogeni.

| COMPOSIZIONE | FORMULAZIONE |
|------------------------|-------------------------------|
| Equisetum arvense 0,2% | Concentrato Dispersibile (DC) |



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 792 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 1000 L



Accedi al
Volantino



Accedi alla
SDS



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

| COLTURA | AVVERSITÀ | DOSE (ml/ha) | EPOCA D'IMPIEGO | N. TRATTAMENTI | PHI (gg) |
|---------------------|--|---|---|--|-----------------|
| MELO, PESCO | Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>) | 300-500 | Applicazioni estive Dalla comparsa dei mazzetti fiorali alla caduta dei fiori (BBCH 53-67) | 2-6 applicazioni fogliari Ogni 7 giorni | Non previsto |
| | Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>) | | | | |
| | Bolla (<i>Taphrina deformans</i>) | | | | |
| VITE | Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>) | | Applicazioni primaverili-estive Dal primo sviluppo fogliare fino al completo sviluppo delle infiorescenze (BBCH 10-77) | | |
| | Oidio (<i>Erysiphe necator</i>) | | | | |
| CETRIOLO | Oidio (<i>Podosphaera xanthii</i>) | | Da stadio di 9 foglie sullo stelo principale fino a 9 o più germogli laterali visibili (BBCH 19-49) | 2 applicazioni fogliari / Irrigazione a goccia Ogni 3-4 giorni | |
| | Funghi del suolo (<i>Pythium spp.</i>) | | | | |
| POMODORO | Alternaria (<i>Alternaria solani</i>) | Applicazioni estive durante l'emergenza fiorale (BBCH 51-59) | 2 applicazioni fogliari Ogni 14 giorni | | |
| | Septoria (<i>Septoria lycopersici</i>) | | | | |
| FRAGOLA, LAMPONE | Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>) Oidio (<i>Podosphaera aphanis</i>) Peronospora (<i>Phytophthora fragariae</i>) altri funghi come <i>Colletotrichum acutatum</i> | Applicazioni primaverili-estive Dalla ripresa dello sviluppo vegetativo (BBCH 1) fino alla maturazione dei frutti (BBCH 89) | 4-8 applicazioni fogliari ogni 5-14 giorni | Non previsto | |
| PATATA | Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>) | BBCH 10-90 | 4-8 applicazioni fogliari ogni 5-14 giorni | | |
| | Marciume nero (<i>Alternaria solani</i>) | | | | |
| | Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) | | | | |

* Scegliere l'appropriato volume di distribuzione per applicare il prodotto in modo uniforme sull'intera superficie fogliare.
In caso di basso volume di impiego utilizzare l'equivalente di prodotto per un volume di 1000 l/ha.

VANTAGGI

- Contribuisce al controllo della peronospora se inserito in miscela e/o in strategia a prodotti fitosanitari specifici.
- Impiego autorizzato in agricoltura integrata e biologica.
- In strategia con il rame ne migliora le performance e permette il rispetto delle dosi autorizzate anno/ettaro.