

TOKRA®

Miscela fungicida antioidica sistemica e di contatto
Classificazione FRAC: 3 – Penconazolo; 11- Kresoxym metile
Tipo di formulazione: Microgranuli Idrodispersibili

TOKRA®

Autorizzazione Ministero della Salute n. 16310 del 23/10/2018

Composizione

Kresoxym-metile puro	g	25
Penconazolo puro	g	8,75
Coformulanti q.b. a	g	100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 – Provoca grave irritazione oculare. H351 – Sospettato di provocare il cancro. H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 210 – Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P270 – Non mangiare né bere né fumare durante l'uso. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P305+351+338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+313 - In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ASCENZA ITALIA S.r.l.

Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA)
Tel: 02 84944669

Stabilimento di produzione:

ASCENZA AGRO S.A. – Herdade das Praias – 2910-440 Setubal (Portogallo)

STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – via E. Torricelli, 2 Cotignola (RA)

Stabilimento di ri-etichettatura:

Arco Logistica S.r.l. Via Antonio Battistella, 22 - 44123 – Ferrara

Taglia: 50 – 200 - 400 g 600 g; 1 - 5 kg

Partita n° vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali. Indossare guanti durenti le operazioni di miscelazione e caricamento. Per l'applicazione usare guanti, indumenti adatti, stivali rigidi e protezione per occhi/viso. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non risulta completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi

Kresoxim metile: -----.

Penconazolo – Ingestione: disturbi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, mal di testa, febbre, anoressia, depressione del sistema nervoso centrale. **Inalazione:** tosse, dispnea, riniti, aumento della secrezione di muco; **Contatto:** irritazione di occhi, cute e mucose, lacrimazione oculare, congiuntiviti, dermatiti da contatto.

Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

TOKRA® è una innovativa miscela fungicida a base di Penconazolo e Kresoxym-metile dotato di attività sistemica e di contatto specifico per il controllo dell'oidio o mal bianco e del marciume nero o Black-rot della Vite. In virtù dei meccanismi di azione dei due principi attivi, fra di loro assai differenti, TOKRA® non presenta alcun rischio di resistenza incrociata e pertanto si pone come una importante soluzione in chiave anti-resistenza laddove si siano verificate riduzioni di efficacia a carico dei tradizionali fungicidi triazolici.

Una volta applicato il prodotto agisce bloccando lo sviluppo delle malattie sia dall'esterno che dall'interno della pianta. Il Kresoxym-metile forma una barriera alla germinazione delle spore e alla penetrazione dei miceli, mentre il Penconazolo si ridistribuisce all'interno della foglia

ove esercita una protezione endoterapica nei confronti del fungo che si estende ai tralci e alla giovane vegetazione in via di formazione. TOKRA® consente una protezione prolungata, anche in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli.

CAMPI DI IMPIEGO

Vite (uve da vino e da tavola): contro Oidio (*Uncinula necator*) e Black-rot (*Guignardia bidwellii*) impiegare il prodotto alla dose di 0,3-0,4 kg/ha con un volume di acqua compreso tra 200 e 1000 l/ha. Si raccomanda comunque di impiegare un volume d'acqua tale da garantire una completa bagnatura di tutta la vegetazione trattata, in modo particolare in presenza di forme di allevamento molto espanse e voluminose. TOKRA® si può impiegare dalla fase di sviluppo vegetativo (dalle 4 – 5 foglie sviluppate) fino a inizio maturazione (BBCH 15-85), con interventi medi ogni 12 – 14 giorni. Il prodotto presenta una ottima resistenza al dilavamento e permette una protezione della vegetazione del grappolo prolungata.

Sono ammessi al massimo 2 interventi per ciclo vegetativo su vite per uve da vino e 3 su vite per uve da tavola.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, mantenendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la preparazione che l'applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO