

MEDEIRO® 80 WG

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili .

Composizione: Fosetyl alluminio 80%

FRAC: P07

Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)

CLP: H412 - EUH401

Registrazione: n° 15363 del 15/03/2012

Sacchetto: 1 kg
Cartone: 10x1 kg
Pallet: 500 kg



Sacco: 10 kg
Pallet: 500 kg



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Medeiro® 80 WG è dotato di sistemica acropeta e basipeta, in grado di garantire una protezione sia della vegetazione esistente che di quella in via di formazione.
- ✓ Una volta assorbito esercita una attività preventiva e di stimolo delle difese naturali della pianta con la produzione di Fitoalessine, sostanze in grado di potenziare la capacità di reazione contro le malattie fungine.
- ✓ Particolarmente efficace nei confronti dei Ficomietti, Peronospora e Fitofora (marciumi radicali). Importante effetto collaterale su batteriosi delle frutticole.

VANTAGGI

- ✓ Medeiro® 80 WG è il partner ideale per numerose miscele in virtù della sinergia con numerosi principi attivi sia di contatto che citotropico-translaminari.
- ✓ È Inserito in tutti i disciplinari di produzione integrata delle colture in etichetta.
- ✓ Microgranulo dotato di elevata solubilità e ridotta emissione di polveri.
- ✓ È particolarmente indicato in combinazione con prodotti a sito di azione specifico in chiave di strategia antiresistenza.

® Marchio registrato.



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (g/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
VITE (da vino)	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	250-300	Intervenire dalla fase di pre-fioritura. Ogni 10-14 gg.	4	28
POMACEE	Fitoftora (<i>Phytophthora spp.</i>)	250-300	1° applicazione: aprile 2° applicazione: luglio 3° applicazione: settembre-ottobre	3	15
AGRUMI	Fitoftora (<i>Phytophthora spp.</i>)	250-300	1° applicazione: inizio fioritura 2° applicazione: luglio 3° applicazione: ottobre-novembre	3	15

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Il prodotto non è compatibile con ossicloruri e idrossidi rameici.
- ✓ Non miscelare a olii, concimi fogliari, fitostimolanti e fitoregolatori
- ✓ Eventuali miscele con prodotti in sospensione concentrata potrebbero determinare fenomeni di precipitazione, per cui è raccomandato evitare combinazioni complesse con tali tipologie di prodotti.

