

Tecnica ed
innovazione si
uniscono a favore
dell'olivicoltura.











Linea Olivo



ASCENZA®
— FARMING YOUR FUTURE —



I fungicidi ASCENZA per il controllo dell'Occhio di pavone dell'Olivo

									
					Kresostar®				
	Ossiram® 70 FLOW						Ossiram® 70 FLOW		
Tribasic® Flow New							Tribasic® Flow New		Tribasic® Flow New
			Vegas® 50 WG						

Ossiram® 70 FLOW

Soluzione ideale a triplice funzione:

- ✓ protegge le foglie non ancora infette;
- ✓ svolge un'azione defogliante sulla vegetazione già colpita;
- ✓ disinfetta i tagli di potatura post-raccolta.

Kresostar®

- ✓ Protegge la nuova vegetazione in condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno.
- ✓ Svolge un'azione bloccante nei confronti della malattia in atto.

Tribasic® Flow New

- ✓ Agisce direttamente sul patogeno alla comparsa dei primi sintomi favorendo la caduta delle foglie e la riduzione dell'inoculo.
- ✓ Prodotto ideale nelle miscele con gli insetticidi.

||||| Kresostar® & Vegas® 50 WG

Le soluzioni ASCENZA per il controllo dell'Occhio di Pavone dell'Olivo.


Due formulazioni a base di Kresoxym caratterizzate da un'ottima persistenza d'azione che garantiscono una protezione completa, efficace e prolungata e nel tempo.

Kresostar® e Vegas® 50 WG rappresentano una valida alternativa alle strategie di controllo tradizionali.

CONDIZIONI DI IMPIEGO SU OLIVO

	DOSE (kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
Kresostar®	0,25-0,30	Dalla differenziazione dei grappoli fiorali fino alla fase di apertura delle corolle (BBCH 50-59).	2 Ogni 14 gg	14
Vegas® 50 WG	0,2	Dall'inizio dei bottoni floreali alla mignolatura.	2 Ogni 14 gg	Non effettuare la raccolta prima dello stadio di piena maturazione.

Gli Erbicidi ASCENZA per l'Olivo



- Hereu® SC
- Matsuda® 25 WG
- Mohican® SC
- Pendi® 40

Matsuda® 25 WG

Erbicida selettivo per il diserbo di vite, agrumi, olivo e aree non coltivate.

L'applicazione di **Matsuda® 25 WG** (Flazasulfuron 25%), da solo o in miscela con il partner, garantisce la massima pulizia del sottofila delle principali colture arboree, quali vigneto, ed un controllo duraturo delle infestanti difficili come **Malva**, **Conyza** e **Lolium**.

EFFICACIA SULLE PRINCIPALI INFESTANTI

INFESTANTE	EFFICACIA
Amaranto (<i>Amaranthus spp.</i>)	●
Farinello (<i>Chenopodium album</i>)	●
Conyza (<i>Conyza canadensis</i>)	●
Rucola selvatica (<i>Diplotaxis eruroides</i>)	●
Loiessa (<i>Lolium multiflorum</i>)	●
Malva (<i>Malva spp.</i>)	●
Portulaca (<i>Portulaca oleracea</i>)	●
Senecione (<i>Senecio vulgaris</i>)	●
Geranio selvatico (<i>Geranium dissectum</i>)	●

LEGENDA ● Elevata efficacia ● Efficace

MODALITA' DI IMPIEGO

Applicare fra fine inverno e inizio primavera, su un tappeto erboso alto 10-15 cm.

IL PERCORSO VIRTUOSO

La combinazione di diverse modalità d'azione (sistemica, contatto, residuale) permette all'agricoltore di disporre di una soluzione flessibile nell'impiego, un controllo diretto sul tappeto erboso esistente e la possibilità di cominciare un percorso virtuoso di gestione delle infestanti, soprattutto quelle resistenti.

La combinazione di diversi mezzi di controllo del sottofila permetteranno, attraverso l'azione diretta e mirata sulla banca del seme presente, di ottenere un contenimento immediato e nel corso della stagione i cui benefici si rifletteranno negli anni a venire.

Le proposte ASCENZA per la Difesa dell'Olivo

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	TARGET E DOSE D'IMPIEGO	PHI (gg)	FORMULAZIONE	REGISTRAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP	CONFEZIONI
Kresostar®	Difenoconazolo 12,5% Kresoxym metile 25%	Occhio di pavone: 0,25-0,3 Kg/ha	-	WG	N° 16301 del 23/10/2018	PERICOLO	0,6 Kg
Ossiram® 70 Flow	Rame Ossicloruro g 36,7 (= 700 g/l)	Occhio di pavone: 2,5 L/ha	15	SC	N°9420 del 05/11/1997	ATTENZIONE	1-5 L
Tribasic® Flow New	Rame Solfato tribasico g 15,2 (=190 g/l)	Occhio di pavone, Fumaggine, Rogna: 4-4,5 L/ha	14	SC	N°17479 del 19/09/2019	ATTENZIONE	10 L
Vegas® 50 WG	Kresoxym metile 50%	Occhio di pavone: 0,2 Kg/ha	Non effettuare la raccolta prima dello stadio di piena maturazione	WG	N° 15986 del 30/11/2018	ATTENZIONE	0,6 Kg
Deltasap®	Deltametrina g 2,8 (=25 g/l)	Tignole: 0,4-0,7 l/ha Cicaline: 0,3-0,6 l/ha	3	EC	N°15042 del 10/05/2012	ATTENZIONE	1 L
Hereu® SC	Oxyfluoren g 42,9 (=500 g/l)	Infestanti Dicotiledoni e Graminacee: 0,9 L/ha	7	SC	N° 16033 del 04/06/2014	PERICOLO	0,5-1 L
Matsuda® 25 WG	Flazasulfuron 25%	Infestanti Dicotiledoni e Graminacee: 60-200 g/ha	45	WG	N° 17306 del 05/09/2018	ATTENZIONE	0,1 Kg
Mohican® 500 SC	Diflufenican g 42 (=500 g/l)	Infestanti dicotiledoni: 0,5-0,6 L/ha	35	SC	N° 16395 del 18/02/2016	ATTENZIONE	1 L
Pendi® 40	Pendimetalin g 38 (=400 g/l)	Infestanti Mono e dicotiledoni: 3,3 L/ha	-	SC	N° 17203 del 12/04/2018	ATTENZIONE	1 L



Via Varese, 25/G - 21047 Saronno (VA) - Italia
 Phone +39 02 8494 4669
 Fax +39 02 9621 685

Seguici su:

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute.
 Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
 Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

ASCENZA®