



Taisen® 800 EC

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce per il controllo delle infestanti che danneggiano frumento e orzo.

Composizione: Gruppo HRAC:
Prosulfocarb puro g 78,9 (=800 g/l) N

Formulazione: Concentrato emulsionabile (EC)

Classificazione CLP:



Registrazione n°: 17624 del 21/07/2020



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 880 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Taisen® 800 EC è un erbicida con ampia flessibilità d'impiego e caratterizzato da una spiccata attività nei confronti di *Galium aparine* (attaccamani) ed altre malerbe che infestano i cereali.
- ✓ Distribuito in pre-emergenza od in post-emergenza precoce della coltura, Taisen® 800 EC viene assorbito dalle radici e dall'apice vegetativo delle infestanti in germinazione o delle plantule; la sua azione si manifesta a livello del meristema apicale, determinando un arresto della crescita ed, in seguito, la morte dei tessuti.

VANTAGGI:

1. Taisen® 800 EC applicato in pre-emergenza o in post-emergenza precoce, rappresenta la soluzione ideale per il controllo di infestanti difficili come *Lolium spp* e *Galium aparine*, soprattutto in zone dove sono presenti fenomeni di resistenza. L'utilizzo da solo o in miscela con diflufenican dipende dal tipo di infestanti da controllare.

© Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Monocotiledoni:

Lolium sp. (loglio), *Poa annua* (fienarola annuale), *Poa trivialis* (fienarola comune).

Dicotiledoni:

Galium aparine (attaccamani), *Capsella bursa-pastoris* (borsa del pastore), *Fumaria officinalis* (feccia), *Buglossoides arvensis* (erba-perla comune), *Descurainia sophia* (erba sofia), *Hypocoum procumbens* (cornacchina comune), *Papaver rhoeas* (papavero) *Veronica hederifolia* (veronica a foglia d'edera), *Veronica persica* (veronica comune).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	(DOSE l/ha)
FRUMENTO DURO	Monocotiledoni: <i>Lolium sp.</i> (Loglio), <i>Poa annua</i> (fienarola annuale), <i>Poa trivialis</i> (fienarola comune).	4-5
FRUMENTO TENERO	Dicotiledoni: <i>Galium aparine</i> (attaccamani), <i>Capsella bursa-pastoris</i> (borsa del pasto-re), <i>Fumaria officinalis</i> (feccia), <i>Buglossoides arvensis</i> (erba-perla co-mune), <i>Descurainia sophia</i> (erba sofia), <i>Hypocoum procumbens</i> (cornacchina comune), <i>Papaver rhoeas</i> (papavero) <i>Veronica hederifolia</i> (veronica a foglia d'edera), <i>Veronica persica</i> (veronica comune).	
ORZO		

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Su letti di semina zollosi o compattati.
- ✓ Su terreni fortemente sabbiosi o ricchi di scheletro.
- ✓ In tutti quei casi (es. semina diretta) in cui non è possibile assicurare un'adeguata protezione del terreno ai germinelli della coltura.
- ✓ In caso di interruzione della coltivazione con perdita di raccolto, si raccomanda di ripiantare solo patata, orzo o grano.

