


|||| Nicozea® OD

Erbicida sistemico di post-emergenza selettivo per il mais.

Nicozea® OD è un erbicida a base di Nicosulfuron in gradi di controllare un ampio spettro di infestanti Graminacee e Dicotiledoni, inclusa la sorghetta da seme e da rizoma. Agisce in modo sistemico portando al disseccamento delle infestanti dopo alcuni giorni dal trattamento.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Nicosulfuron puro 4, 18% (40 g/l)	B	Dispersione Oleosa (OD)	 ATTENZIONE Registrazione n°: 13741 del 27/04/2010



Flacone: 1 L
 Cartone: 12x1 L
 Pallet: 600 L



Tanica: 5 L
 Cartone: 4x5 L
 Pallet: 800 L



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)	
MAIS	<p>Infestanti sensibili</p> <p>Graminacee: Giavone comune <i>(Echinochloa crus-galli)</i> Pani-castrella <i>(Setaria spp)</i> Sorghetta da seme e da rizoma <i>(Sorghum halepense)</i></p> <p>Dicotiledoni: Amaranto <i>(Amaranthus spp)</i> Crespigno <i>(Sonchus oleraceus)</i> Fumaria <i>(Fumaria officinalis)</i></p>	<p>Infestanti mediamente sensibili:</p> <p>Graminacee: Panico <i>(Panicum spp)</i> Sanguinella <i>(Digitaria sanguinalis)</i></p> <p>Dicotiledoni: Camomilla <i>(Matricaria camomilla)</i> Centocchio <i>(Stellaria media)</i> Erba morella <i>(Solanum nigrum)</i> Mercuriella <i>(Mercurialis annua)</i> Persicaria <i>(Polygonum persicaria)</i> Persicaria maggiore <i>(Polygonum lapathifolium)</i> Stramonio <i>(Datura stramonium)</i></p>	Applicare in post-emergenza del mais e delle infestanti: - mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie sviluppate - infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie - infestanti graminacee: da 2 foglie ed inizio accestimento	Trattamento unico: 1-1,5 l/ha Trattamento frazionato: 1+0,5 l/ha	-

VANTAGGI

- La speciale formulazione OD permette il rapido e completo assorbimento del Nicosulfuron da parte della pianta, garantendo una grande efficacia e selettività del prodotti senza l'aggiunta di bagnanti o additivi.