



Pendi® 40

Diserbante per il controllo di mono e dicotiledoni.

Composizione:

Pendimethalin puro g 38 (= 400 g/L)

Gruppo HRAC:

K1

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Registrazione n°: 17203 del 12/04/2018



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Pendi® 40 è un diserbante che agisce nei confronti della germinazione dei semi delle comuni infestanti mono e dicotiledoni.

VANTAGGI:

1. Controllo delle nascite scalari dei giovani.
2. Ampia finestra applicativa.
3. Perfetta selettività della coltura.

® Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

INFESTANTI CONTROLLATE

Monocotiledoni:

Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Setaria spp.* (Pabbio), *Sorghum halepense* (Sorghetta), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano).

Dicotiledoni:

Amaranthus spp. (Amaranto), *Atriplex spp.* (Atriplice), *Heliotropium europaeum* (Ellotropio selvatico), *Cardaminehirsuta* (Dentaria), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Fumaria spp.* (Fumaria), *Myosotis arvensis*, *Mercurialis annua* (Mercorella), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Portulaca oleracea* (Erba cipollina), *Polygonum spp.* (Poligono), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Thlaspi arvenses* (Erba storna), *Urtica urens* (Ortica comune), *Veronica spp.* (Veronica).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI
MAIS	Applicare in pre-emergenza.	4,4	-
GIRASOLE			
FAGIOLI E FAGIOLINI		3,3	
FAVA E FAVINO			
PISELLO		3,3 - 4,1	
CECE			
CAROTA		3,3	28
ASPARAGO	Applicare durante la fase di riposo vegetativo.		
PATATA	Applicare in pre-emergenza.	4,4	-
PEPERONE	Applicare alla fase di pre emergenza o pre trapianto.	3,3	
CAVOLFORE	Applicare alla fase di pre-trapianto.	3-3,3	
SOIA	Applicare in pre-emergenza o pre trapianto.	3	
LATTUGHE E SIMILI (eccetto Rucola)			75
VITE	Applicare il prodotto lungo l'interfila durante il riposo vegetativo.	3,3	-
MELO, PERO	Applicare il prodotto lungo l'interfila tra il periodo della raccolta e la formazione dei nuovi frutti.		
ALBICOCCO, NETTARINA, PESCO	Applicare il prodotto lungo l'interfilatra tra periodo della raccolta e la formazione dei nuovi frutti.		
ARACHIDE	Applicare in pre-emergenza.		
PIANTE ORNAMENTALI ANCHE IN VIVAIO	Applicare in post- trapianto.	3-3,3	
PIOPPO	Applicare il prodotto lungo l'interfila durante la fase di post-trapianto.	2,3-3	
TABACCO	Applicare alla fase di pre-trapianto.	4,4	
TAPPETI ERBOSI	Applicare durante il periodo autunnale o primaverile, in post-emergenza.	2,6-3,3	

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Effettuare il trattamento su terreno ben livellato e lavorato. In assenza di pioggia dopo 7-10 giorni dal trattamento irrigare in modo da favorire la penetrazione del prodotto nei primi strati superficiali del terreno.
- ✓ Seminare in modo uniforme ad una profondità di 3-4 cm, evitando che alcuni semi rimangano scoperti in superficie.

