



Ossiram® 70 Flow

Fungicida multisito a base di ossicloruro di rame liquido.

Composizione: Ossicloruro di rame g 36,7 (= 700 g/l) Codice Frac: M 01

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 9420 del 05/11/1997



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Ossiram® 70 Flow è l'ossicloruro di rame liquido più concentrato in commercio.
- ✓ Ha una formulazione colloidale e finissima.
- ✓ Disciolto in acqua forma una sospensione uniforme che facilita la preparazione della miscela.

VANTAGGI:

1. Ossiram® 70 Flow grazie alla sua formulazione garantisce una copertura uniforme e completa.
2. Manifesta una alta adesività utile.
3. E' resistente ai dilavamenti.
4. L'alto contenuto in principio attivo per litro permette la movimentazione di minori quantitativi di prodotto.
5. Ha un'ampia etichetta su tutti i fruttiferi.
6. Consentito l'impiego in Agricoltura Biologica Reg. 834/07/CE.



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 680 L

© Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE (ml/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI (gg)
AGRUMI	Peronospora (<i>Phytophthora spp.</i>)	75 (max 0,75 l/ha)	Applicare durante la fase di maturazione dei frutti. Ogni 14-21 giorni.	2	15
	Fumaggine e altri	125 (max 1,25 l/ha)			
VITE	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	100-150 (max 1,5 l/ha)	Applicare ogni 7-10 giorni.	4	
OLIVO	Occhio di pavone (<i>Cycloconium oleaginum</i>)	150-250 (max 2,5 l/ha)	Applicare in primavera e/o autunno.	2	
POMACEE	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>)	150-250 (max 2,5 l/ha)	Applicare alla caduta delle foglie. Ogni 14 giorni.	3	-
PATATA	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	100-150 (max 1,5 l/ha)	Applicare ogni 7-10 giorni.	3	15
DRUPACEE	Bolla (<i>Taphrina deformans</i>) Monilia (<i>Monilia fructigena</i>)	200 (max 2 l/ha)	Applicare alla caduta delle foglie e all'ingrossamento delle gemme.	2	-
POMODORO	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 (max 2 l/ha)	Applicare ogni 7-10 giorni.	3	3 (in serra) 10 (in pieno campo)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Non trattare durante la fioritura.
- ✓ Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame ad ettaro nell'arco di 7 anni.

